

平成26年10月2日

特定保健用食品の許可について

消費者庁では、本日、健康増進法第26条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは、別紙の12件（うち規格基準型特保10件、再許可等特保2件）です。

（参考）

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、<http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf> を御覧ください。

（担当）消費者庁食品表示企画課 松原、中尾

TEL : 03-3507-9222（直通）

FAX : 03-3507-9292

消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため※1、消費者庁で審査を行い許可とする再許可等特定保健用食品(11件)

通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	おなか活カプロフェック	株式会社 明治	錠菓	プロピオン酸菌による乳清発酵物(DHNAとして)	プロピオン酸菌による乳清発酵物の働きにより、あなたのおなかの中のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整えることにより、お通じを良好に保ちます。	開封後はお早めにお召しあがりください。	1日3粒を目安にお召しあがりください。	再許可等特保	26.10.2	1483
2	食物繊維入りそば	株式会社ローソン	ゆでそば	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けている方は事前に医師などの専門家にご相談の上、召し上がってください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。塩分が気になる方は、つゆを残して召し上がり下さい。	1日1回、1食を目安に召し上がり下さい。	規格基準型特保	26.10.2	1484
3	特食パン	山崎製パン株式会社	パン	難消化性再結晶アミロース(α -1,4グルカン会合体として)	本品は消化吸収されにくい炭水化物である難消化性再結晶アミロースを含んでおり、食後の血糖値が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当りの摂取目安量をお守りください。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家にご相談のうえご使用ください。食べ過ぎにより、おなかゆるくなる場合があります。	1回2枚(140g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	26.10.2	1485
4	ゼリーdeゼロSPECIAL みかん風味	マルハニチロ株式会社	洋生菓子	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているので、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して、適量を摂取してください。	1個(290g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	26.10.2	1486
5	ゼリーdeゼロSPECIAL ぶどう風味	マルハニチロ株式会社	洋生菓子	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているので、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して、適量を摂取してください。	1個(290g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	26.10.2	1487
6	ゼリーdeゼロSPECIAL マンゴー風味	マルハニチロ株式会社	洋生菓子	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているので、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して、適量を摂取してください。	1個(290g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	26.10.2	1488
7	食後の血糖値が気になる方のお茶	株式会社 東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	食事とともに1日1回1袋(5.6g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	26.10.2	1489
8	食物繊維たっぷり玄米茶風味	株式会社 東洋新薬	粉末清涼飲料	ポリデキストロース(食物繊維として)	ポリデキストロースが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	1日2袋(11.4g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	26.10.2	1490
9	烏龍茶生活	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	26.10.2	1491
10	まろやか緑茶	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	26.10.2	1492
11	日々の烏龍茶	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	26.10.2	1493
12	からだケア烏龍茶	株式会社 東洋新薬	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	お食事の際に、1日1回500mlを目安にお飲みください。	規格基準型特保	26.10.2	1494

※1 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。