

参考資料2-11

消食基第420号
令和7年6月27日

食品衛生基準審議会
会長 曽根 智史 殿

内閣総理大臣 石破 茂
(公印省略)

諮問書

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第13条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。

記

次に掲げる農薬の食品中の残留基準の設定について

農薬イソチアニル
農薬グルホシネート
農薬クロフェンテジン
農薬シクロピラニル
農薬チオベンカルブ

以上

令和7年6月27日

農薬・動物用医薬品部会
部会長 堤 智昭 殿

食品衛生基準審議会
会長 曽根 智史

農薬の食品中の残留基準の設定について（付議）

標記について、下記のとおり内閣総理大臣から諮問があったので、食品衛生基準審議会規程第6条の規定に基づき、貴部会において審議方願いたい。

記

令和7年6月27日付け消食基第420号

次に掲げる農薬の食品中の残留基準の設定について

農薬イソチアニル
農薬グルホシネート
農薬クロフェンテジン
農薬シクロピラニル
農薬チオベンカルブ

以上

グルホシネート

今般の残留基準の検討については、農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく農薬登録申請（新規製剤の登録申請）及び適用拡大申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省からなされたこと並びに関連企業から「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」に基づく残留基準の設定要請がなされたことに伴い、食品安全委員会において内閣総理大臣からの依頼に伴う食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。

1. 概要

(1) 品目名：グルホシネート [Glufosinate (ISO)]

グルホシネートアンモニウム塩 [Glufosinate-ammonium (ISO)]

グルホシネートPナトリウム塩 [Glufosinate-P sodium salt (ISO)]

グルホシネートには光学異性体（R体及びS体）が存在し、S体が活性を有する。グルホシネート（ラセミ体）がグルホシネートアンモニウム塩として、グルホシネートP（S体を選択的に含有）がグルホシネートPナトリウム塩として、それぞれ製剤化されている。

(2) 分類：農薬

(3) 用途：除草剤

アミノ酸系除草剤である。グルタミン合成酵素阻害によりアンモニアが蓄積し、植物の生理機能を阻害して殺草活性を示すと考えられている。

(4) 化学名及びCAS番号

グルホシネート

[(3RS)-3-Amino-3-carboxypropyl]methylphosphinic acid (IUPAC)

Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-

(CAS : No. 51276-47-2)

グルホシネートP

[(3S)-3-Amino-3-carboxypropyl]methylphosphinic acid (IUPAC)

Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, (2S)-

(CAS : No. 35597-44-5)

グルホシネートアンモニウム塩

Ammonium [(3RS)-3-amino-3-carboxypropyl]methylphosphinate (IUPAC)


Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, ammonium salt
(CAS : No. 77182-82-2)

グルホシネートPナトリウム塩

Sodium [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylphosphinate (IUPAC)

Butanoic acid, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, sodium salt
(CAS : No. 70033-13-5)


(5) 構造式及び物性



グルホシネート

(ラセミ体 R体 : S体 = 1 : 1)
(図はS体を示す)


分子式 C₅H₁₂NO₄P
分子量 181.13



グルホシネートP

(S体 : 99.9%以上)


分子式 C₅H₁₂NO₄P
分子量 181.13



グルホシネートアンモニウム塩

(ラセミ体 *R*体 : *S*体 = 1 : 1)
(図は*S*体を示す)

分子式	C ₅ H ₁₅ N ₂ O ₄ P
分子量	198. 16
水溶解度	>5. 0 × 10 ² g/L (20°C)
分配係数	log ₁₀ Pow = -4. 20 (20°C, pH 5. 2)



グルホシネートPナトリウム塩

(*S*体 : 99. 9%以上)

分子式	C ₅ H ₁₁ NO ₄ PNa
分子量	203. 11
水溶解度	>5. 0 × 10 ² g/L (20°C)
分配係数	log ₁₀ Pow = -2. 73 (25°C)

2. 適用の範囲及び使用方法

本剤の国内における適用の範囲及び使用方法は別紙1-1及び1-2、海外における適用の範囲及び使用方法は別紙1-3のとおり。

3. 代謝試験

(1) 植物代謝試験

① グルホシネートアンモニウム塩

植物代謝試験が、非遺伝子組換え作物において、水稻、とうもろこし、だいだい、キヤベツ、レタス、トマト及びりんごで、また、遺伝子組換え作物において、とうもろ

こし、だいす、てんさい及びなたねで実施された。非遺伝子組換え作物ではキャベツ及びトマトにおいて可食部で親化合物の残留が認められ、10%TRR^{注)}以上認められた代謝物は代謝物B（水稻、とうもろこし、キャベツ、トマト、レタス及びりんご）であった。遺伝子組換え作物では、すべての作物の可食部で親化合物の残留が認められ、10%TRR以上認められた代謝物は代謝物B（とうもろこし、だいす及びなたね）及び代謝物Z（だいす、てんさい（根及び茎葉部）及びなたね）であった。

注) %TRR : 総放射性残留物 (TRR : Total Radioactive Residues) 濃度に対する比率 (%)

② グルホシネートPナトリウム塩

植物代謝試験が、水稻、キャベツ及びトマトで実施されており、キャベツ（茎葉処理）において可食部で親化合物の残留が認められ、可食部で10%TRR以上認められた代謝物は、すべての作物の可食部で代謝物Bであった。


(2) 家畜代謝試験

① グルホシネートアンモニウム塩


家畜代謝試験が、泌乳山羊及び産卵鶏で実施されており、乳又は卵で親化合物の残留が認められている。10%TRR以上認められた代謝物は、代謝物B（泌乳山羊の肝臓及び腎臓並びに産卵鶏の肝臓）であった。なお、代謝物Zを用いた家畜代謝試験が、泌乳山羊及び産卵鶏で実施されており、10%TRR以上認められたのはグルホシネート（泌乳山羊の肝臓、腎臓及び乳並びに産卵鶏の肝臓及び卵白）、代謝物B（泌乳山羊の肝臓、腎臓及び乳並びに産卵鶏の肝臓）及び代謝物Z（泌乳山羊の肝臓及び腎臓並びに産卵鶏の肝臓及び卵黄）であった。

【代謝物略称一覧】

略称	JMPR評価書の略称	化学名
B	MPP	3-[ヒドロキシ(メチル)ホスフィノイル]プロピオニ酸 (3-メチルホスフィニコプロピオニ酸)
Z	NAG	2-アセトアミド-4-[ヒドロキシ(メチル)ホスフィノイル]酪酸 (N-アセチル-グルホシネート)



代謝物B



代謝物Z

注) 残留試験の分析対象、残留の規制対象及び暴露評価対象となっている代謝物について構造式を明記した。

4. 作物残留試験

(1) 分析の概要

【国内】

① 分析対象物質

- ・グルホシネート (代謝物Zを含む。) ^{注)}
- ・グルホシネート
- ・グルホシネートP (代謝物Zを含む。) ^{注)}
- ・代謝物B

注) 代謝物Zが残留する場合にグルホシネートとして測定される。

② 分析法の概要

i) グルホシネート (代謝物Zを含む。) 及び代謝物B

試料から水、水及びクロロホルム次いで水、飽和酢酸鉛溶液を加えて水、または水を加えて膨潤後、水及びメタノール・水 (1:1) 混液で抽出する。または、試料から水及びジクロロメタンで抽出し、飽和酢酸鉛溶液を加えて処理した後に水で抽出する。若しくは水で抽出しアセトンを加えて静置後ろ別する。必要に応じてトリメチルプロピルシリル化シリカゲル (SAX) カラム、オクタデシルシリル化シリカゲル (C₁₈) カラム、強塩基性陰イオン交換樹脂カラム、スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラム、ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲル(SCX) カラム又はSCX・SAX連結カラムを用いて精製した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化 (アミノ基をアセチル化、水酸基及びカルボキシ基をメチル化) する。シリカゲルカラム又はアミノプロピルシリル化シリカゲル (NH₂)・連結カラムを用いて精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計 (LC-MS/MS) 又は炎光光度型検出器 (リン用干渉フィルター) 付きガスクロマトグラフ (GC-FPD(P)) で定量する。

または、試料から水及びジクロロメタンで抽出する。水層を必要に応じてカーボングラファイトカラムで精製し、SAXカラム又は強塩基性陰イオン交換樹脂カラムで精製した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化（アミノ基をアセチル化、水酸基及びカルボキシ基をメチル化）する。 NH_2 ・シリカゲル連結カラム、C₁₈カラム、シリカゲルカラム又はポリアミドカラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、LC-MS/MS又はGC-FPD(P)で定量する。

または、試料から透析膜を用いて水で抽出する。必要に応じてC₁₈カラムで精製し、強塩基性陰イオン交換樹脂カラムを用いてグルホシネート及び代謝物Bを分離精製した後、各画分に酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化する。シリカゲルカラム又はポリアミドカラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。

または、試料から水及びクロロホルム、次いで水で抽出し、必要に応じて水層にアセトンを加えて静置後ろ別する。SAXカラム又はSCX・SAX連結カラムを用いて精製した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化する。エチレンジアミン-N-プロピルシリル化シリカゲル(PSA)・シリカゲル連結カラム又はPSA・SCX連結カラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。

あるいは、試料から水で抽出し、必要に応じて飽和酢酸鉛溶液を加えて静置後ろ別し、ジクロロメタンで洗浄する。強塩基性陰イオン交換樹脂カラムを用いて精製した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化する。シリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。

なお、代謝物Bの分析値は、換算係数1.191を用いてグルホシネート濃度に換算した値として示した。

定量限界：グルホシネート（代謝物Zを含む。）	0.004～0.091 mg/kg
代謝物B	0.004～0.119 mg/kg
(グルホシネート換算濃度)	

ii) グルホシネート及び代謝物B

試料から水又はメタノール・水(9:1)混液で抽出し、SAXカラム又はグラファイトカーボンカラムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。

なお、代謝物Bの分析値は、換算係数1.191を用いてグルホシネート濃度に換算した値として示した。

定量限界：グルホシネート	0.009 mg/kg
代謝物B	0.006 mg/kg (グルホシネート換算濃度)

iii) グルホシネートP（代謝物Zを含む。）及び代謝物B

試料から水、飽和酢酸鉛溶液を加えて水で抽出する。強塩基性陰イオン交換樹脂

カラムでグルホシネートPと代謝物Bに分画した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化する。シリカゲルカラム、NH₂・シリカゲル連結カラム又はグラファイトカーボンカラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。

または、試料から水で抽出し、強塩基性陰イオン交換樹脂カラム、C₁₈カラム、SAXカラム、SCXカラム及びSAXカラム、スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラム又はジルコニアコート化シリカゲルカラムを用いて精製した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化する。NH₂・シリカゲル連結カラム、PSA・シリカゲル連結カラム、シリカゲルカラム又はPSAカラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)又はLC-MS/MSで定量する。

または試料から水で抽出し、アセトン又はメタノールを加えてタンパク質を除去する。SAXカラムで精製した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化する。SCXカラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。

あるいは、試料から水又は1.3%トリクロロ酢酸溶液及びクロロホルムで抽出し、水層をSAXカラム又はSCXカラムを用いて精製した後、酢酸及びオルト酢酸トリメチルを加えて加熱し、誘導体化する。PSA・シリカゲル連結カラム又はPSA・SCX連結カラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。

なお、代謝物Bの分析値は、換算係数1.191を用いてグルホシネート濃度に換算した値として示した。

定量限界：グルホシネートP（代謝物Zを含む。）	0.005～0.02 mg/kg
代謝物B	0.006～0.024 mg/kg
(グルホシネート換算濃度)	

【海外】

① 分析対象物質

- ・グルホシネート
- ・代謝物B
- ・代謝物Z

② 分析法の概要

i) グルホシネート、代謝物Z及び代謝物B

試料から水・イソプロパノール（4:1）混液で抽出し、遠心分離により残渣を除去し、SAXカラムで精製し、LC-MS/MSで定量する。

または、試料から水で抽出し遠心分離により残渣を除去した上澄液に4.5 mmol/Lとなるよう水酸化ナトリウム溶液を加え、水・メタノール（9:1）混液で希釈し、SAXカラムを用いて精製し、LC-MS/MSで定量する。

なお、代謝物B及び代謝物Zの分析値は、それぞれ換算係数1.191及び0.812を用いてグルホシネート濃度に換算した値として示した。

定量限界：グルホシネート	0.009～0.01 mg/kg
代謝物B	0.012 mg/kg (グルホシネート換算濃度)
代謝物Z	0.008 mg/kg (グルホシネート換算濃度)

(2) 作物残留試験結果

国内作物残留試験については、小麦、たまねぎ等（グルホシネートアンモニウム塩）、小麦、大麦等（グルホシネートPナトリウム塩）の試験成績を追加した。試験成績の概要を別紙2-1及び2-2に示す。

海外作物残留試験については、綿実及びホップの試験成績を追加した。試験成績の概要を別紙2-3に示す。

5. 畜産物における推定残留濃度

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定されるところから、飼料中の残留農薬濃度及び動物飼養試験の結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。

(1) 分析の概要

① 分析対象物質

- ・グルホシネート（代謝物Zを含む。）^{注)}
- ・代謝物B

注）代謝物Zが残留する場合にグルホシネートとして測定される。

② 分析法の概要

i) グルホシネート（代謝物Zを含む。）及び代謝物B

試料から水又は透析膜を用いて水で抽出する。陰イオン交換樹脂カラムを用いて精製、またはアセトン若しくはエタノールを加えて沈殿処理する。酢酸及びオルト酢酸トリメチルにより誘導体化し、シリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。

なお、代謝物Bの分析値は、換算係数1.191を用いてグルホシネート濃度に換算した値として示した。

定量限界：グルホシネート（代謝物Zを含む。）	0.02～0.10 mg/kg
代謝物B	0.02～0.10 mg/kg (グルホシネート換算濃度)

(2) 家畜残留試験 (動物飼養試験)

① 乳牛を用いた残留試験

乳牛（ホルスタイン種、3～5.3歳齢、体重472～723 kg（平均体重約600 kg）、3又は4頭/群（3.9 ppm投与群のみ3頭/群））に対して、グルホシネートアンモニウム塩及び代謝物Bを、それぞれ3.0及び1.0、9.0及び3.0並びに30.0及び10.0 ppm（それぞれグルホシネートとして3.9、11.8及び39.3 ppm相当）含む飼料を28日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるグルホシネート（代謝物Zを含む。）及び代謝物Bの濃度をGC-FPD(P)で測定した。乳については、投与開始日から1、2、3、4、5、6、9、13、16、20、23及び27日後に1日2回採取した乳に含まれるグルホシネート（代謝物Zを含む。）及び代謝物Bの濃度をGC-FPD(P)で測定した。結果は表1を参照。

表1. 乳牛の試料中の残留濃度 (mg/kg)

		3.9 ppm投与群	11.8 ppm投与群 ^{注1)}	39.3 ppm投与群 ^{注1)}
筋肉	グルホシネート*	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
	代謝物B	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
	合計	<0.10 (最大) <0.10 (平均)	<0.10 (最大) <0.10 (平均)	<0.10 (最大) <0.10 (平均)
脂肪	グルホシネート*	0.06 (最大) 0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
	代謝物B	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	0.08 (最大) 0.06 (平均)	0.16 (最大) 0.09 (平均)
	合計	0.11 (最大) 0.10 (平均)	0.13 (最大) 0.11 (平均)	0.21 (最大) 0.14 (平均)
肝臓	グルホシネート*	0.13 (最大) 0.11 (平均)	<0.10 (最大) <0.10 (平均)	<0.10 (最大) <0.10 (平均)
	代謝物B	1.50 (最大) 1.14 (平均)	4.20 (最大) 4.00 (平均)	10.70 (最大) 8.93 (平均)
	合計	1.63 (最大) 1.25 (平均)	4.30 (最大) 4.10 (平均)	10.80 (最大) 9.03 (平均)
腎臓	グルホシネート*	<0.10 (最大) <0.10 (平均)	<0.10 (最大) <0.10 (平均)	0.13 (最大) 0.11 (平均)
	代謝物B	0.41 (最大) 0.38 (平均)	2.00 (最大) 1.42 (平均)	7.40 (最大) 5.33 (平均)
	合計	0.51 (最大) 0.48 (平均)	2.10 (最大) 1.52 (平均)	7.53 (最大) 5.44 (平均)

表1. 乳牛の試料中の残留濃度 (mg/kg) (つづき)

		3.9 ppm投与群	11.8 ppm投与群 ^{注1)}	39.3 ppm投与群 ^{注1)}
乳 ^{注2)}	グルホシネート*	<0.02 (平均)	<0.02 (平均) ^{注3)}	<0.02 (平均) ^{注4)}
	代謝物B	<0.02 (平均)	<0.02 (平均)	<0.02 (平均) ^{注4)}
	合計	<0.04 (平均)	<0.04 (平均)	<0.04 (平均)

定量限界：筋肉及び脂肪0.05 mg/kg、肝臓及び腎臓0.10 mg/kg、乳0.02 mg/kg

* 代謝物Zを含む。

注1) 11.8及び39.3 ppm投与群の試料について、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓は3頭から採取し、乳は4頭から採取した。

注2) 投与期間中に採取した乳中の濃度を1頭ずつ算出し、その平均値を求めた。

注3) 投与開始1日後の1頭のみ定量された (0.03 mg/kg)。

注4) 投与開始9日後の1頭のみ定量された (0.02 mg/kg)。

上記の結果に関連して、JMPRは、肉牛及び乳牛の最大飼料由来負荷^{注1)}をそれぞれ4.7及び4.4 ppm、平均的飼料由来負荷^{注2)}をそれぞれ2.4及び2.3 ppmと評価している。

また、米国では、肉牛及び乳牛の最大理論的飼料由来負荷^{注3)}をそれぞれ15.38及び15.22 ppm、More Balanced Diets^{注4)}をそれぞれ1.32及び2.53 ppmと評価している。

なお、国内における飼料作物への使用を仮定し、最大飼料由来負荷を算出したところ、肉牛において0.75 ppm、乳牛において0.57 ppmと推定された。また、平均的飼料由来負荷は、肉牛において0.71 ppm、乳牛において0.49 ppmと推定された。

注1) 最大飼料由来負荷 (Maximum dietary burden) : 飼料の原料に農薬が最大まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる最大濃度。飼料中濃度として表示される。

注2) 平均的飼料由来負荷 (Mean dietary burden) : 飼料の原料に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に (作物残留試験から得られた残留濃度の中央値を試算に用いる)、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる平均濃度。飼料中濃度として表示される。

注3) 最大理論的飼料由来負荷 (Maximum theoretical dietary burden) : 飼料の原料に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる最大濃度。飼料中濃度として表示される。

注4) More Balanced Diets : Guidance Document on Residues in Livestock, 04-SEP-2013 (OECD ENV/JM/MONO(2013)に基づくDietary Burden Calculator PMRA v. 2.8で算出される飼料由来負荷

② 産卵鶏を用いた残留試験

産卵鶏 (Shaver Starcross種、約33週齢、平均体重約1.7 kg、15羽/群) に対して、グルホシネートアンモニウム塩及び代謝物Bを、それぞれ3.5及び1.0、10.5及び3.0並びに35.0及び10.0 ppm (それぞれグルホシネートとして4.4、13.2及び43.9 ppm相当) 含む飼料を28日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるグルホシネート (代謝物Zを含む。) 及び代謝物Bの濃度をGC-FPD(P)で測定した。卵については、毎日採取して、グルホシネート (代謝物Zを含む。) 及び代謝物Bの濃度をGC-FPD(P)で測定した。結果は表2を参照。

表2. 産卵鶏の試料中の残留濃度 (mg/kg) ^{注)}

		4.4 ppm投与群	13.2 ppm投与群	43.9 ppm投与群
筋肉	グルホシネート*	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)
	代謝物B	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)
	合計	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)
脂肪	グルホシネート*	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)
	代謝物B	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)
	合計	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)
肝臓	グルホシネート*	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)
	代謝物B	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)
	合計	<0.20 (平均)	<0.20 (平均)	<0.20 (平均)
腎臓	グルホシネート*	<0.05 (平均)	0.07 (平均)	0.23 (平均)
	代謝物B	0.69 (平均)	2.00 (平均)	7.80 (平均)
	合計	0.74 (平均)	2.07 (平均)	8.03 (平均)
卵	グルホシネート*	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)	0.06 (平均)
	代謝物B	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)	<0.05 (平均)
	合計	<0.10 (平均)	<0.10 (平均)	0.11 (平均)

定量限界：筋肉、脂肪、腎臓及び卵0.05 mg/kg、肝臓0.10 mg/kg

* 代謝物Zを含む。

注) 筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓については10羽から、卵については15羽から試料を採取し、それぞれ投与群ごとに混合して分析試料とした。

上記の結果に関連して、JMPRは、肉用鶏及び産卵鶏の最大飼料由来負荷をいずれも1.4 ppm、平均的飼料由来負荷をそれぞれ1.2及び0.9 ppmと評価している。JMPRは、飼料作物を通じて家きんに残留する可能性がないと評価している。また、米国では、家きんの最大理論的飼料由来負荷を3.33 ppm、More Balanced Dietsを0.08 ppmと評価している。

なお、国内における飼料作物への使用を仮定し、最大飼料由来負荷及び平均的飼料由来負荷を算出したところ、肉用鶏において0.25 ppm、産卵鶏において0.33 ppmと推定された。

(3) 推定残留濃度

牛及び鶏について、飼料由来負荷及び家畜残留試験結果から、畜産物中の推定残留濃度を算出した。推定残留濃度はグルホシネート（代謝物Zを含む。）及び代謝物Bをグルホシネートに換算した濃度の合計濃度で示した。結果は表3-1及び3-2を参照。

表3-1. 畜産物中の推定残留濃度：牛^{注)} (mg/kg)

	筋肉	脂肪	肝臓	腎臓	乳
牛	<0.10 (<0.065)	0.14 (0.067)	5.15 (0.81)	2.81 (0.31)	<0.04 (<0.026)

上段：最大残留濃度 下段括弧内：平均的な残留濃度

注)：最大残留濃度及び平均的な残留濃度は、米国最大理論的飼料由来負荷及びMore Balanced Dietsを用いて算出した。

表3-2. 畜産物中の推定残留濃度：鶏^{注)} (mg/kg)

	筋肉	脂肪	肝臓	腎臓	卵
鶏	<0.076 (<0.027)	<0.076 (<0.027)	<0.15 (<0.055)	0.56 (0.20)	<0.076 (<0.020)

上段：最大残留濃度 下段括弧内：平均的な残留濃度

注)：最大残留濃度及び平均的な残留濃度は、米国最大理論的飼料由来負荷及びJMPRの平均的飼料由来負荷を用いて算出した。

6. 許容一日摂取量 (ADI) 及び急性参考用量 (ARfD) の評価

食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委員会にて意見を求めたグルホシネートに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価されている。

(1) ADI

① グルホシネート

ADI : 0.019 mg/kg 体重/日 (グルホシネートアンモニウム塩として)

(ADI設定根拠資料) 慢性毒性/発がん性併合試験

(動物種) ラット

(期間) 2年6か月間

(投与方法) 混餌

(無毒性量) 1.9 mg/kg 体重/日

(安全係数) 100

なお、食品安全委員会は、発がん性は認められなかつたと評価している。

② グルホシネートP

ADI : 0.0091 mg/kg 体重/日 (グルホシネートPとして)

(ADI設定根拠資料) 繁殖試験

(動物種) ラット

(期間) 2世代

(投与方法) 混餌

(無毒性量) 0.91 mg/kg 体重/日

(安全係数) 100

(2) ARfD

① グルホシネート

ARfD : 0.05 mg/kg体重 (グルホシネートアンモニウム塩として)

(ARfD設定根拠資料) 発生毒性試験

(動物種) ウサギ

(期間) 妊娠6～28日

(投与方法) 強制経口

(無毒性量) 5 mg/kg体重/日

(安全係数) 100

② グルホシネートP

ARfD : 0.01 mg/kg体重 (グルホシネートPとして)

(ARfD設定根拠資料) 発生毒性試験

(動物種) ウサギ

(期間) 妊娠6～27日

(投与方法) 強制経口

(無毒性量) 1 mg/kg体重/日

(安全係数) 100

(3) ADI及びARfDの設定

食品安全委員会は、グルホシネート及びグルホシネートPについて総合評価を行い、S体を選択的に含有し、毒性も強く現れるグルホシネートPに基づく評価を適用するのが適当であると判断し、グルホシネートPで設定したADI及びARfDをグルホシネートのADIとして0.0091 mg/kg体重/日、ARfDとして0.01 mg/kg体重と設定した。

7. 諸外国における状況

JMPRにおける毒性評価が行われ、2012年にADI及びARfDが設定されている。国際基準は大豆、いちご等に設定されている。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国においててんさい、綿実等に、カナダにおいて小麦、りんご等に、EUにおいてばれいしょ、キウイ等に、豪州においてかんきつ類、なたね等に基準値が設定されている。

8. 残留規制

(1) 残留の規制対象

グルホシネート (代謝物Zを含む。) 及び代謝物Bとする。

植物代謝試験及び作物残留試験の結果から、農産物における主要な残留物は、グルホ

シネート、代謝物B及び代謝物Z（主に遺伝子組換え作物）、畜産物における主要な残留物は、グルホシネート及び代謝物Bであるものの、代謝物Zを含む遺伝子組換え作物の飼料が給餌されることも想定されること、基準値設定となる多くの試験成績でグルホシネートと代謝物Zが区別して測定されていないことから、農産物及び畜産物における残留の規制対象をグルホシネート（代謝物Zを含む。）及び代謝物Bとする。

なお、JMPRの評価では、グルホシネート、代謝物B及び代謝物Zを残留の規制対象としている。

（2）基準値案

別紙3のとおりである。

9. 暴露評価

（1）暴露評価対象

グルホシネート（代謝物Zを含む。）及び代謝物Bとする。

植物代謝試験において代謝物B及び代謝物Zが、家畜代謝試験において代謝物Bが可食部で10%TRR以上認められており、植物代謝試験及び家畜代謝試験、作物残留試験及び家畜残留試験の結果から、農産物における主要な残留物は、グルホシネート、代謝物B及び代謝物Z（主に遺伝子組換え作物）、畜産物における主要な残留物は、グルホシネート及び代謝物Bであるものの、代謝物Zを含む遺伝子組換え作物の飼料が給餌されることも想定されること、基準値設定となる多くの試験成績でグルホシネートと代謝物Zが区別して測定されていないことから、農産物及び畜産物における暴露評価対象をグルホシネート（代謝物Zを含む。）及び代謝物Bとする。

なお、JMPRの評価では、グルホシネート、代謝物B及び代謝物Zを暴露評価対象としている。

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質をグルホシネート並びに代謝物B及び代謝物Zとしている。

（2）暴露評価結果

① 長期暴露評価

1日当たり摂取する農薬の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙4参照。

	EDI／ADI(%) ^{注)}
国民全体（1歳以上）	13.7
幼小児（1～6歳）	33.5
妊婦	13.5
高齢者（65歳以上）	14.0

注) 各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

EDI試算法：作物残留試験成績の中央値（STMR）等×各食品の平均摂取量

② 短期（1日経口）暴露評価

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）及び幼小児（1～6歳）のそれにおける摂取量は急性参考用量（ARfD）を超えていない^{注)}。詳細な暴露評価は別紙5-1及び5-2参照。

注) 基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づきESTIを算出した。

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

(別紙1-1)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
水田作物	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	耕起15日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	1回	1回
水田作物 (水田畦畔)	18.5% SL	雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期)	水田畦畔	通常散布100~150 L/10 a 少量散布30~40 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)				
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期)				
水田作物 (水田刈跡)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	雑草生育期	水田刈跡	100~150 L/10 a	1回	1回
水田作物、畑作物 (休耕田)	18.5% SL	雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	雑草生育期	休耕田	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	雑草生育期(草丈50 cm以下)	休耕田	100~150 L/10 a	3回以内	
小麦	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~750 mL/10 a	耕起前・は種前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	1回	4回以内(は種後は3回以内)
		雑草茎葉散布	300~750 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	1回	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種後出芽前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	1回	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期)	圃場の周縁部	100~150 L/10 a	3回以内	
大麦	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	耕起前・は種前・は種後出芽前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	1回	4回以内(は種後は3回以内)
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	1回	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種後出芽前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	1回	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期)	圃場の周縁部	100~150 L/10 a	3回以内	
とうもろこし	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期:は種前又は畦間処理)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
そば	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	耕起前・は種前・は種後出芽前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種後出芽前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	圃場の周縁部	100~150 L/10 a	3回以内	
だいだい	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	耕起前・は種前・は種後出芽前・定植5日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種後出芽前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	定植5日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫28日前まで(畦間処理:本葉5葉期以降雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫28日前まで(株間処理:本葉5葉期以降雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種前(雑草生育期)	—	—	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種後出芽前(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	定植5日前まで(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	—	3回以内	
豆類(種実、ただし、だいだいを除く)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	耕起前・は種前・定植5日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	定植5日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種前(雑草生育期)	—	—	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	定植5日前まで(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	—	3回以内	
ばれいしょ	18.5% SL	雑草茎葉散布	100~200 mL/10 a	雑草生育期耕起前・植付前・植付後萌芽直前	—	100~150 L/10 a	1回	3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内)
		雑草茎葉散布	100~200 mL/10 a	雑草生育期植付前又は植付後萌芽直前	—	100~150 L/10 a	1回	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	—	2回以内	3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内)

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
さといも	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
かんしょ	18.5% SL	雑草茎葉散布	200～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・播種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	200～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期播種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫14日前まで(雑草生育期播種前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
やまのいも	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
こんにゃく	18.5% SL	雑草茎葉散布	200～300 mL/10 a	雑草生育期耕起前・植付前・植付後萌芽前	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	200～300 mL/10 a	雑草生育期植付前又は植付後萌芽前	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期畦間処理)	—	—	3回以内	
さとうきび	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	植付前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	1回	4回以内(植付後は3回以内)
		雑草茎葉散布	500～2000 mL/10 a	植付前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	1回	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期:畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～2000 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期:畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
だいこん	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫45日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
はつかだいこん	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
かぶ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
はくさい	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫45日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
キャベツ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫45日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
プロッコリー	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
たかな	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
なばな	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
なばな類	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
ごぼう	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
レタス	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
非結球レタス	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
ふき	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫120日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫120日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
ふき(ふきのとう)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫75日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫75日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
もりあざみ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
食用ざく	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
たまねぎ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
ねぎ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
にんにく	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
にら	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
アスパラガス	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫打切り後(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
鱗茎類(にらを除く)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:は種・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
ぎぼうし	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫60日前まで(雑草生育期:耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
にんじん	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
バセリ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫3日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫3日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
セルリー	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
みつば	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
セリ科葉菜類(バセリを除く)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期:定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
とうき(葉)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

(別紙1-1)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
トマト	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
ミニトマト	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
ピーマン	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
なす	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
とうがらし類	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
きゅうり	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
かぼちゃ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
ズッキーニ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	3回以内
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	3回以内
しろうり	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	1回	3回以内
すいか	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
メロン	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
うり類(未成熟)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
にがうり	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	3回以内
ほうれんそう	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
たけのこ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	2回以内	2回以内
オクラ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
しょうが	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内	
葉しょうが	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内		

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

(別紙1-1)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
さやえんどう	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種前(雑草生育期)	—	—	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	定植前(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	—	3回以内	
さやいんげん	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種前(雑草生育期)	—	—	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	定植前(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	—	3回以内	
えだまめ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	耕起前・は種前・は種後出芽前・定植5日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種後出芽前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植5日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種前(雑草生育期)	—	—	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種後出芽前(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	定植5日前まで(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫14日前まで(畦間処理:雑草生育期)	—	—	3回以内	
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
未成熟そらまめ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
実えんどう	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	は種前(雑草生育期)	—	—	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	定植前(雑草生育期)	—	—	3回以内	
		雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)	—	—	3回以内	
	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期・耕起前・植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期:植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
さといも(葉柄)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
ほうきぎ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
モロヘイヤ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫3日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
ヤングコーン	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
わらび	18.5% SL	雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期萌芽前)	—	100～150 L/10 a	1回	1回
食用桑(葉)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
みかん	20.0% WP配合剤1	雑草茎葉散布	250～300 g/10 a	春期萌芽前雑草生育期(草丈20 cm以下)(収穫21日前まで)	—	100～150 L/10 a	2回以内	3回以内

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

(別紙1-1)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
かんきつ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	通常散布100~150 L/10 a 少量散布30~40 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	通常散布100~150 L/10 a 少量散布30~40 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
りんご	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	通常散布100~150 L/10 a 少量散布30~40 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	通常散布100~150 L/10 a 少量散布30~40 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
なし	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
びわ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~750 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~750 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
もも	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
ネクタリン	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
とうとう	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
小粒核果類	18.5% SL	雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300~500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500~1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100~150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

(別紙1-1)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
いちご	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	—	3回以内	3回以内
ブルーベリー	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
食用桑(果実)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで(雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
ぶどう	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	通常散布100～150 L/10 a 少量散布30～40 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	通常散布100～150 L/10 a 少量散布30～40 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	20.0% WP 配合剤1	雑草茎葉散布	250～400 g/10 a	春期雑草生育期(草丈20 cm以下)(収穫30日前まで)	—	100～150 L/10 a	2回以内	3回以内
かき	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
キウイフルーツ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～750 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500～750 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
いちじく	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫前日まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内
ひまわり (種子)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期:は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
なたね	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	1回	1回
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期:は種前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	1回	
いちょう(種子)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
くり	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～750 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布	500～750 mL/10 a	収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	3回以内	
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	—	3回以内	3回以内

グルホシネットアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

(別紙1-1)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	適用場所	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
茶	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	摘採7日前まで(雑草生育期畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
	0.10% AL	雑草茎葉散布	100 mL/m ²	摘採7日前まで(雑草生育期畦間処理)	—	—	2回以内	2回以内
ホップ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで(雑草生育期:畦間処理)	—	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
さんしょう(果実)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	500～750 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
		雑草茎葉散布	500～750 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30 cm以下)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
しそ	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
しそ(花穂)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	
みょうが(花穂)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
みょうが(茎葉)	18.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	みょうが(花穂)の収穫7日前まで、ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理)	—	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内

SL: 液剤

AL: 液剤(希釈せず使用)

WP: 顆粒水和剤

配合剤1: 1.3% フラザスルフロン

—: 規定されていない項目

今回基準値設定依頼のあった適用の範囲および使用方法を網掛けで示した。

グルホシネートPナトリウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	散布液量	使用回数	グルホシネートを含む農薬の総使用回数
水田作物	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	耕起前 (雑草生育期)	100～150 L/10 a	1回	1回
水田作物 (水田畦畔)	11.5% SL	雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
水田作物 (水田刈跡)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	雑草生育期	100～150 L/10 a	1回	1回
小麦	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	耕起又は種前 (雑草生育期)	100～150 L/10 a	1回	4回以内 (は種後は3回以内)
		雑草茎葉散布 (圃場内の周縁部)	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
大麦	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	耕起又は種前 (雑草生育期)	100～150 L/10 a	1回	4回以内 (は種後は3回以内)
		雑草茎葉散布 (圃場内の周縁部)	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
そば	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	は種前 (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
豆類(種実)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫28日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
ばれいしょ	11.5% SL	雑草茎葉散布	100～200 mL/10 a	雑草生育期 萌芽前処理	100～150 L/10 a	1回	3回以内 (萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内)
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	
		茎葉散布	100～200 mL/10 a	茎葉黄変期 ただし、収穫3日前まで	100 L/10 a	2回以内	
さといも	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期 植付前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
かんしょ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期 植苗前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
やまのいも	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
さとうきび	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～1000 mL/10 a	耕起又は植付7日前まで (雑草生育期)	100 L/10 a	1回	4回以内 (植付後は3回以内)
		雑草茎葉散布	300～1000 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100 L/10 a	3回以内	
		雑草茎葉散布 (圃場内の周縁部)	300～1000 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期)	100 L/10 a	3回以内	
だいこん	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
はつかだいこん	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
はくさい	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで (雑草生育期は種・定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
キャベツ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
プロッコリー	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
たかな	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
ごぼう	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 は種前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
レタス	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
非結球レタス	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
たまねぎ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
ねぎ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
にんにく	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
にら	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	3回以内
アスパラガス	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	萌芽前 (雑草生育期)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	
		雑草茎葉散布	500 mL/10 a	収穫打切り後 (雑草生育期)	100～150 L/10 a	2回以内	
にんじん	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
トマト	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
ミニトマト	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
ピーマン	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
なす	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内

グルホシネットPナトリウム塩の適用の範囲及び使用方法 (国内)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
とうがらし類	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
きゅうり	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
かぼちゃ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
ズッキーニ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	3回以内
すいか	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
メロン	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
とうがん	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	定植前 (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	
にがうり	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	3回以内
ほうれんそう	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
しょうが	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 植付前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
葉しょうが	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 植付前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
えだまめ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 株間処理(本葉5葉期以降))	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
ぎぼうし	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫90日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
かのこそう	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
さといも(葉柄)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期 植付前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
かんきつ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
りんご	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
びわ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
甘草	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	9回以内 (1年間に3回以内)	9回以内 (1年間に3回以内)
いちご	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
キウイフルーツ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫21日前まで(雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
食用桑(果実)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前及び夏切り後萌芽前)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前及び夏切り後萌芽前)	100～150 L/10 a	3回以内	
果樹類 (かんきつ、りんご、びわ、いちょう(種子)、くり、キウイフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫前日まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
ごま	11.5% SL	雑草茎葉散布	500 mL/10 a	は種又は定植9日前まで (雑草生育期)	100 L/10 a	1回	3回以内 (は種又は定植後は2回以内)
		雑草茎葉散布	500 mL/10 a	収穫21日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100 L/10 a	2回以内	
いちょう(種子)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
くり	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫30日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	3回以内	
茶	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	摘採7日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
茶(幼木)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300 mL/10 a	雑草生育期 畦間・株間処理	100 L/10 a	2回以内	2回以内

グルホシネットPナトリウム塩の適用の範囲及び使用方法（国内）

(別紙1-2)

2025年9月18日時点版

作物名	剤型	使用方法	使用量	使用時期	散布液量	使用回数	グルホシネットを含む農薬の総使用回数
ホップ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫3日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	3回以内	3回以内
さんしょう(果実)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
		雑草茎葉散布	500～1000 mL/10 a	収穫7日前まで (雑草生育期)	100～150 L/10 a	2回以内	
しそ	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
みょうが(花穂)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	収穫14日前まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内
みょうが(茎葉)	11.5% SL	雑草茎葉散布	300～500 mL/10 a	みょうが(花穂)の収穫14日前まで ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花 期終了まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	100～150 L/10 a	2回以内	2回以内

SL:液剤

グルホシネートアンモニウム塩の適用の範囲及び使用方法（米国）

(別紙1-3)

作物名	剤型	使用方法	使用時期	1回当たり使用量	回数	年間の総使用量
綿 (Subgroup 20C)	24.5% SL	散布	播種前～発芽前	29～43 fl ozs/acre (0.53～0.79 lb ai /acre) (594～885 g ai /ha)	2回以内	87 fl ozs/acre (1.59 lbs ai/acre) (1782 g ai /acre)
		茎葉散布 (グルホシネート耐性 遺伝子組換え綿) 畦間雑草散布 (非グルホシネート耐 性遺伝子組換え綿)	収穫70日前まで (初期開花前)	29～43 fl ozs/acre (0.53～0.79 lb ai /acre) (594～885 g ai /acre)	3回以内	
ホップ	24.5% SL	雑草茎葉散布	収穫10日前まで	32～55 fl ozs/acre (0.59～1.00 lb ai /acre) (661～1121g ai /acre)	3回以内	165 fl ozs/acre (3.00 lbs ai/acre) (3362 g ai/ha)

SL : 液剤

fl oz : 液量オンス (米液量オンス 1 fl oz = 0.0000295735 m³)

acre : エーカー (1 acre = 約4,047 m²)

lb : ポンド (1 lb = 0.45359237 kg)

ai : active ingredient (有効成分)

今回基準値設定依頼のあった適用の範囲及び使用方法を網掛けで示した。

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験 圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の 合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート (代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定 の根 拠等		
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数					
稻 (玄米)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (水田刈跡耕起前全面散布)	1	121	圃場A:0.048	圃場A:<0.009/0.039	◎		
					142	圃場B:0.042	圃場B:<0.009/0.033			
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (水田畦畔移植前+移植後散布)	1+2	50	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
					84	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (水田畦畔移植後散布)	2	6	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)			
小麦 (玄麦)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (水田畦畔移植後散布)	2	6, 14, 20	圃場A:<0.021(2回, 6日) (#)	圃場A:<0.009/*<0.012(*2回, 6日) (#)	◎		
					13, 21	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	3	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (水田畦畔移植後散布)	3	7, 14, 21	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
						圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
						圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012			
大麦 (種子)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (耕起前・は種前全面処理)	1	297	圃場A:<0.027	圃場A:<0.009/0.018	◎		
					185	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	2	18.5% SL	750 mL/10 a+750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (出芽前全面処理+周辺部分処理)	1+3	7, 14, 21	圃場A:<0.026(4回, 14日) (#)	圃場A:<0.009/*0.016(*4回, 14日) (#)			
					5, 9, 18	圃場B:<0.032(4回, 9日) (#)	圃場B:<*0.009/*0.023(*4回, 9日) (#)			
					7, 14, 21	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)			
そば (種子)	6	18.5% SL	750 mL/10 a+750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (出芽前全面処理+周辺部分処理)	1+3	7, 13, 21	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	◎		
					7	圃場C:<0.021 (#)	圃場C:<0.009/<0.012 (#)			
						圃場D:<0.021 (#)	圃場D:<0.009/<0.012 (#)			
						圃場E:<0.021 (#)	圃場E:<0.009/<0.012 (#)			
						圃場F:<0.021 (#)	圃場F:<0.009/<0.012 (#)			
未成熟とうもろこし (外皮、ひげ及び芯 を除いた種子)			750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (出芽前全面処理+周辺部分処理)	1+3	7, 14, 22	圃場A:<0.140 (#)	圃場A:<0.069/*0.071 (§) (#)	◎		
					7, 10, 21	圃場B:<0.140 (#)	圃場B:<0.069/*0.071 (§) (#)			
だいだい (種実)	3	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	7, 14, 21	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
						圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	1	139	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)			
					126	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)			
					89	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)			
いんげんまめ (乾燥子実)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前土壌散布)	1+1	70	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	◎		
					27, 34, 41	圃場A:<0.029(3回, 41日)	圃場A:<0.014/*0.015(*3回, 41日)			
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	27, 35, 43	圃場B:<0.057(3回, 27日)	圃場B:<0.039/*0.024(*3回, 27日, **3回, 35日)			
					28, 35, 42	圃場A:<0.175(3回, 35日)	圃場A:<0.117/*0.066(*3回, 35日)			
					27, 34, 40	圃場B:<0.602(3回, 27日)	圃場B:<0.516/*0.086(*3回, 27日)			
らっかせい (子実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	28, 35, 41	圃場A:<0.042	圃場A:<0.018/<0.024	◎		
					28, 35, 42	圃場B:<0.042	圃場B:<0.018/<0.024			
ばれいしょ (塊茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽直前全面土壌処理)	1	7, 14, 20	圃場A:<0.015(3回, 20日) (#)	圃場A:<0.009/<0.006(*3回, 20日) (#)	◎		
					8, 14, 20	圃場B:<0.015(3回, 20日) (#)	圃場B:<0.009/<0.006(*3回, 20日) (#)			
	2	18.5% SL	250 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽直前全面土壌処理)	1	82	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)			
			500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽直前全面土壌処理)		88	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)			
					21, 27, 35	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
かんしょ (塊根)	2	18.5% SL	200+500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽直前全面土壌処理 +畦間処理)	1+2	21, 28, 35	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	◎		
						圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012			
	6	18.5% SL	200+500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付後萌芽直前全面土壌処理 +畦間処理)	1+2	21, 28, 35	圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012			
					21	圃場E:<0.021	圃場E:<0.009/<0.012			
						圃場F:<0.021	圃場F:<0.009/<0.012			
さといも (球茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面土壌混和+畦間処理)	1+2	31	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
			500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面土壌処理+畦間処理)		30	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)			
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面土壌処理+畦間処理)	1+1	83	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
					88	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
					21, 29, 35	圃場A:<0.009(2回, 21日)	圃場A:<0.005/*0.005(2回, 21日)			
かんしょ (塊根)	2	18.5% SL	300 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	21, 28, 35	圃場B:<0.009(2回, 21日)	圃場B:<0.005/*0.005(2回, 21日)	◎		
						14, 21, 27	圃場A:<0.018			
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	14, 21, 28	圃場B:<0.018	圃場B:<0.009/<0.009			
						13, 19, 28	圃場A:<0.021(2回, 13日)			
						14, 21, 28	圃場B:<0.030(2回, 21日)			
	6	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	14, 21, 28	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012			
						13, 21, 30	圃場D:<0.021(2回, 13日)			
						14, 20, 28	圃場E:<0.021			
						14, 21, 28	圃場F:<0.021			

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート (代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定の根拠等
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数			
やまのいも (塊根)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+2	36	圃場A:0.027	圃場A:<0.009/0.018	◎
					28	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
こんにゃくいも (球茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	26	圃場A:0.027 (#)	圃場A:<0.009/0.018 (#)	◎
					29	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	
さとうきび (茎)	3	18.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+3	14, 21, 29	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012 圃場C:<0.009/<0.012	◎
					42	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/0.012 (#)	
					40	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
だいこん (根部)	6	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	2	38, 45, 52	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					38, 45, 52	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	
					圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012		
					圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012		
					圃場E:<0.021	圃場E:<0.009/<0.012		
					圃場F:<0.021	圃場F:<0.009/<0.012		
だいこん (葉部)	6	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	42	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/0.012 (#)	
					40	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
					38, 45, 52	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					38, 45, 52	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	
					圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012		
					圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012		
はつかだいこん (根部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	3, 7, 17	圃場A:<0.017	圃場A:<0.009/<0.008	◎
					7, 14, 21	圃場B:<0.054	圃場B:<0.046/<0.008	
はつかだいこん (葉部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	3, 7, 17	圃場A:<0.017	圃場A:<0.009/<0.008	◎
					7, 14, 21	圃場B:<0.059	圃場B:<0.050/<0.008	
かぶ (根部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畝間処理)	2	21, 28, 35	圃場A:<0.015	圃場A:<0.009/<0.006	◎
かぶ (葉部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畝間処理)	2	21, 28, 35	圃場B:<0.015	圃場B:<0.009/<0.006	
はくさい (茎葉)	6	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種定植前+畦間処理)	1+1	41	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)	
					40	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
					38, 45, 51	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					38, 43, 52	圃場B:<0.021 (2回, 43日)	圃場B:<*0.009/*<0.012 (*2回, 43日)	
					45	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012	
					44	圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012	
キャベツ (葉球)	6	18.5% SL	500 mL/10 a 定植前・雑草茎葉散布 (定植前処理+畦間処理)	2	45	圃場E:<0.021	圃場E:<0.009/<0.012	◎
					37	圃場F:<0.021	圃場F:<0.009/<0.012	
					42	圃場A:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
					38, 45, 52	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					38, 43, 51	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	
					45	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012	
プロッコリー (花蕾)	3	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畝間処理)	2	1, 3, 7	圃場A:<0.020	圃場A:<0.009/<0.010 (\$)	◎
					1	圃場B:<0.020	圃場B:<0.009/<0.010 (\$)	
					圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012		
たかな (かつおな) (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畝間処理)	2	7, 14, 21	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	◎
なばな (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	14, 21, 28	圃場A:<0.042	圃場A:<0.018/<0.024	
					21, 28, 35	圃場B:<0.042	圃場B:<0.018/<0.024	
ごぼう (根部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	1, 3, 7	圃場A:<0.032	圃場A:<0.014/<0.018 (\$)	◎
					33	圃場B:<0.032	圃場B:<0.014/<0.018 (\$)	
結球レタス (茎葉)	6	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	14	圃場A:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
					23, 30, 37	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	
					30	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012	
					29	圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012	
					30	圃場E:<0.021	圃場E:<0.009/<0.012	
					29	圃場F:<0.021	圃場F:<0.009/<0.012	
ふき (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽前ほ場全面処理)	2	106, 113, 120	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					117, 124, 133	圃場B:<0.045 (2回, 124日)	圃場B:<*0.009/*<0.036 (*2回, 117日, **2回, 124日)	
ふき (ふきのとう)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽前ほ場全面処理)	2	43, 50, 57	圃場A:<0.021 (2回, 57日) (#)	圃場A:<0.009/*<0.012 (*2回, 57日) (#)	
					75, 82, 89	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート (代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定の根拠等	
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数				
食用ざく (花全体)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	2	14	圃場A:<0.105 圃場B:<0.105	圃場A:<0.046/<0.060 圃場B:<0.046/<0.060	◎	
もりあざみ (根部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	3	30, 37, 44	圃場A:<0.042 圃場B:<0.042	圃場A:<0.018/<0.024 圃場B:<0.018/<0.024		
たまねぎ (鱗茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面散布+畳間処理)	1+1	85	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012		
					84	圃場A:<0.044 圃場B:<0.016	圃場A:<0.037/<0.007 (§) 圃場B:<0.009/<0.007 (§)		
	10	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	2	1, 3, 7	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015 圃場C:<0.015 圃場D:<0.015 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021 圃場J:<0.021	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006 圃場C:<0.009/<0.006 圃場D:<0.009/<0.006 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012 圃場G:<0.009/<0.012 圃場H:<0.009/<0.012 圃場I:<0.009/<0.012 圃場J:<0.009/<0.012	◎	
					1, 3, 7	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015 圃場C:<0.015 圃場D:<0.015 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021 圃場J:<0.021	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006 圃場C:<0.009/<0.006 圃場D:<0.009/<0.006 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012 圃場G:<0.009/<0.012 圃場H:<0.009/<0.012 圃場I:<0.009/<0.012 圃場J:<0.009/<0.012		
					1, 2, 5	圃場A:<0.016 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021 圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021 圃場J:<0.021	圃場A:<0.009/<0.007 (§) 圃場B:<0.009/<0.007 (§)		
					1	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015 圃場C:<0.015 圃場D:<0.015 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021 圃場J:<0.021	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006 圃場C:<0.009/<0.006 圃場D:<0.009/<0.006 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012 圃場G:<0.009/<0.012 圃場H:<0.009/<0.012 圃場I:<0.009/<0.012 圃場J:<0.009/<0.012		
ねぎ (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面散布+畳間処理)	1+1	55	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/0.012 圃場B:<0.009/<0.012		
					59	圃場A:<0.016	圃場A:<0.009/<0.007 (§)		
	9	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	2	1, 3, 7	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015 圃場C:<0.015 圃場D:<0.015 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006 圃場C:<0.009/<0.006 圃場D:<0.009/<0.006 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012 圃場G:<0.009/<0.012 圃場H:<0.009/<0.012 圃場I:<0.009/<0.012	◎	
					1, 3, 7	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015 圃場C:<0.015 圃場D:<0.015 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006 圃場C:<0.009/<0.006 圃場D:<0.009/<0.006 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012 圃場G:<0.009/<0.012 圃場H:<0.009/<0.012 圃場I:<0.009/<0.012		
					1	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015 圃場C:<0.015 圃場D:<0.015 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006 圃場C:<0.009/<0.006 圃場D:<0.009/<0.006 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012 圃場G:<0.009/<0.012 圃場H:<0.009/<0.012 圃場I:<0.009/<0.012		
					1, 3, 8	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015 圃場C:<0.015 圃場D:<0.015 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021 圃場G:<0.021 圃場H:<0.021 圃場I:<0.021	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006 圃場C:<0.009/<0.006 圃場D:<0.009/<0.006 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012 圃場G:<0.009/<0.012 圃場H:<0.009/<0.012 圃場I:<0.009/<0.012		
葉ねぎ (茎葉)	1	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	2	1, 3, 7	圃場A:<0.016	圃場A:<0.009/<0.007 (§)	◎	
	1	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	2	1, 3, 7	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012		
にんにく (鱗茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	2	1	圃場A:<0.089 圃場B:<0.089	圃場A:<0.046/<0.043 圃場B:<0.046/<0.043	◎	
にら (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	3	1	圃場A:<0.018 圃場B:<0.018	圃場A:<0.009/<0.009 (§) 圃場B:<0.009/<0.009 (§)	◎	
アスパラガス (若茎)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽前全面散布)	1	45	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)		
					20	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
	2	18.5% SL		2	31	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)		
					20	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
ぎぼうし (うるい)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	2	1	圃場A:<0.036 圃場B:<0.036	圃場A:<0.018/<0.018 圃場B:<0.018/<0.018		
にんじん (根部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畳間処理)	1+1	59, 75, 90	圃場A:<0.011 (3回, 59日)	圃場A:<0.005/*<0.006 (*3回, 59日)		
					60, 75, 90	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005/<0.006		
	2	18.5% SL		3	32	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012		
					30	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012		
パセリ (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間散布)	2	1, 3, 7	圃場A:<0.016 圃場B:<0.016	圃場A:<0.009/<0.007 (§) 圃場B:<0.009/<0.007 (§)	◎	
	2	18.5% SL		3	59, 75, 90	圃場A:<0.21 圃場B:<0.21	圃場A:<0.091/<0.12 圃場B:<0.091/<0.12	◎	
					60, 75, 90	圃場C:<0.018	圃場C:<0.009/<0.009 (§)		
	2	18.5% SL		3	7, 14, 21	圃場A:<0.023 圃場B:<0.021	圃場A:<0.014/<0.009 (§) 圃場B:<0.014/<0.009 (§)	◎	
					7, 14, 21	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012		
みつば (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間散布)	3	7, 14, 21	圃場A:<0.016 ^{注3)} 圃場B:<0.027 ^{注3)}	圃場A:<0.009 ^{注3)} /<0.006 圃場B:<0.019 ^{注3)} /<0.009	◎	
	1	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間散布)	3	7, 14, 21	圃場C:<0.050	圃場C:<0.044/<0.006		
とうき (葉部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間散布)	3	7, 14, 21	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012	◎	
トマト (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前+雑草茎葉散布)	1+3	1	圃場A:<0.021 (#) 圃場B:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#) 圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畳間処理)	3	1	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012	◎	

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート (代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定の根拠等		
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数					
ミニトマト (果実)	4	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	2			1+2	1	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012			
					1	圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012			
ピーマン (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前+雑草茎葉散布)	1+2	1	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	4			3	1, 3, 7	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
なす (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前+雑草茎葉散布)	1+2	1	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	6			3	1, 3, 7	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
きゅうり (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面散布+雑草茎葉散布)	1+2	1	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
	10			3	1, 3, 7	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/0.012			
					1	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012			
					1	圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012			
					1	圃場E:<0.021	圃場E:<0.009/<0.012			
					1	圃場F:<0.021	圃場F:<0.009/<0.012			
					1	圃場G:<0.021	圃場G:<0.009/<0.012			
					1	圃場H:<0.021	圃場H:<0.009/<0.012			
かぼちゃ (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面散布+雑草茎葉散布)	1+2	19	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)	◎		
					31	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/0.012 (#)			
ズッキーニ (果実)	3	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006	◎		
					1, 3, 6	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005/<0.006			
					1	圃場C:<0.011	圃場C:<0.005/<0.006			
しろうり (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	1	21, 28, 35	圃場A:<0.063	圃場A:<0.027/<0.036	◎		
すいか (果肉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	48	圃場A:<0.024	圃場A:<0.009/<0.015 (§)	◎		
					62	圃場B:<0.024	圃場B:<0.009/<0.015 (§)			
	2			2	1, 3	圃場A:<0.017 (2回, 3日)	圃場A:<0.009/*0.008 (*2回, 3日) (§)			
メロン (果肉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+畦間処理)	1+1	1, 3, 7	圃場B:<0.016	圃場B:<0.009/<0.007 (§)	◎		
					30	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012			
					26	圃場B:<0.060	圃場B:<0.009/0.051			
にがうり (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	1, 3, 7	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
					2	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
ほうれんそう (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理)	1	62	圃場A:<0.015 ^{注3)}	圃場A:<0.009 ^{注3)} /<0.007 (§)	◎		
					84	圃場B:<0.015 ^{注3)}	圃場B:<0.009 ^{注3)} /<0.007 (§)			
	2		500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	7, 14, 21	圃場A:<0.015 ^{注3)}	圃場A:<0.009 ^{注3)} /<0.007 (§)	◎		
					7	圃場B:<0.015 ^{注3)}	圃場B:<0.009 ^{注3)} /<0.007 (§)			
	6	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	7, 14, 21	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
					7	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
					7	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012			
					7	圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012			
					7	圃場E:<0.021	圃場E:<0.009/<0.012			
たけのこ (幼茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽前は全面処理)	2	30, 45, 59	圃場A:<0.042	圃場A:<0.018/<0.024	◎		
					30, 32, 43	圃場B:<0.042	圃場B:<0.018/<0.024			
オクラ (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畠間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.015	圃場A:<0.009/0.006	◎		
					4	圃場B:<0.016 (4回, 3日) (#)	圃場B:<0.009/*0.007 (*4回, 3日) (#)			
じょうが (塊茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 4, 7	圃場A:<0.020	圃場A:<0.009/<0.010 (§)	◎		
					1, 3, 7	圃場B:<0.078 (3回, 3日)	圃場B:<0.057/*0.021 (*3回, 3日)			
葉じょうが (塊茎)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽直前~萌芽初期は全面処理 +畦間処理)	1+1	14, 21, 28	圃場A:<0.042	圃場A:<0.004/0.038	◎		
					14, 21, 28	圃場B:<0.033	圃場B:<0.004/<0.029			
さやえんどう (さや)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎		
					1	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012			
さやえんどう (さや)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006	◎		
					1, 3, 7	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005/<0.006			

グルホシネットアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験 圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の 合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネット (代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定 の根 拠等
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数			
さやいんげん	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1	圃場A:<0.008 圃場B:<0.008	圃場A:<0.005/<0.003 (§) 圃場B:<0.005/<0.003 (§)	◎
	4	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.008 圃場B:<0.011 圃場C:<0.011 圃場D:<0.011	圃場A:<0.005/<0.004 圃場B:<0.005/<0.006 圃場C:<0.005/<0.006 圃場D:<0.005/<0.006	
えだまめ (さや)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面土壤散布)	1	104 94	圃場A:0.021 (#) 圃場B:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/0.012 (#)	
		18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面土壤散布+畦間処理)	1+1	54 38	圃場A:0.030 (#) 圃場B:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/0.021 (#) 圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	7, 13, 20 10, 18, 26	圃場A:0.018 (3回, 13日) 圃場B:<0.021 (3回, 26日)	圃場A:<0.009/*0.009 (*3回, 13日) 圃場B:<0.009/**0.012 (*3回, 18日、**3回, 26日)	
	3	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011 圃場C:0.016 (3回, 3日)	圃場A:<0.005/<0.006 圃場B:<0.005/<0.006 圃場C:<0.009/0.007 (*3回, 3日)	
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	14, 21, 28	圃場A:<0.021 圃場B:0.033 圃場C:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/0.024 圃場C:<0.009/<0.012	
未成熟そらまめ	3	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:0.013 圃場B:0.012 圃場C:<0.011	圃場A:<0.005/0.008 圃場B:<0.005/0.007 圃場C:<0.005/<0.006	
食用桑 (葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (夏切後萌芽前全面処理)	3	37, 45, 52	圃場A:0.011 圃場B:<0.008	圃場A:0.008/<0.004 圃場B:<0.005/<0.004	
食用桑 (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (春期萌芽前全面処理)	3	37, 44, 51 47, 45, 52	圃場A:<0.021 (3回, 44日) 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 (*3回, 44日) 圃場B:<0.009/<0.012	
たらのき (新芽)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	36	圃場A:<0.084 (#) 圃場B:<0.084 (#)	圃場A:<0.037/<0.048 (#) 圃場B:<0.037/<0.048 (#)	
ほうきぎ (胞果)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植後処理)	3	21, 28, 35 20, 28, 35	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 (3回, 20日)	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012 (*3回, 20日)	
さといも (葉柄)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 14, 21	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006 圃場B:<0.005/<0.006	◎
モロヘイヤ (茎葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	1, 3, 7	圃場A:0.066 圃場B:0.042 (2回, 7日)	圃場A:<0.018/0.048 圃場B:<0.018/*0.024 (*2回, 7日)	
ヤングコーン (雌穂(幼果))	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012	
わらび (若芽)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽前全面処理)	1	14, 21, 28	圃場A:0.033 圃場B:0.045	圃場A:<0.009/0.024 圃場B:<0.009/0.036	
温州みかん (果肉)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	72 67	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	17, 27 20, 30	圃場A:<0.021 (3回, 17日) (#) 圃場B:<0.021 (3回, 20日)	圃場A:<0.009/*<0.012 (*3回, 17日) (#) 圃場B:<0.009/*<0.012 (*3回, 20日)	
	6	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	14, 21, 28	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021 圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012 圃場C:<0.009/<0.012 圃場D:<0.009/<0.012 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012	
					21			
	2	20.0% WP (配合剤1)	500 g/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	21	圃場A:<0.021 (#) 圃場B:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#) 圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
温州みかん (果皮)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	72 67	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	17, 27 20, 30	圃場A:<0.021 (3回, 17日) (#) 圃場B:<0.021 (3回, 20日)	圃場A:<0.009/*<0.012 (*3回, 17日) (#) 圃場B:<0.009/*<0.012 (*3回, 20日)	
	6	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	14, 21, 28	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021 圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012 圃場C:<0.009/<0.012 圃場D:<0.009/<0.012 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012	
					21			
	2	20.0% WP (配合剤1)	500 g/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	21	圃場A:<0.021 (#) 圃場B:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#) 圃場B:<0.009/<0.012 (#)	

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート(代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定の根拠等
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数			
温州みかん (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	72 67	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 ^{注4)} 圃場B:<0.009/<0.012 ^{注4)}	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	17, 27 20, 30	圃場A:<0.021(3回, 17日)(#) 圃場B:<0.021(3回, 20日)	圃場A:<0.009/*<0.012(*3回, 17日)(#) 圃場B:<0.009/*<0.012(*3回, 20日) ^{注5)}	
	6	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	14, 21, 28	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 ^{注5)} 圃場B:<0.009/*<0.012 ^{注5)} 圃場C:<0.009/*<0.012 ^{注5)}	
					21	圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場D:<0.009/*<0.012 ^{注5)} 圃場E:<0.009/*<0.012 ^{注5)} 圃場F:<0.009/*<0.012 ^{注5)}	
				2	21	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012(#) 圃場B:<0.009/*<0.012(#) ^{注5)}	
サマーフレッシュ (果実)	1	20.0% WP (配合剤1)	770 g/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	21	圃場A:<0.021(#)	圃場A:<0.009/*<0.012 (#)	
河内晩柑 (果実)	1	20.0% WP (配合剤1)	770 g/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	21	圃場A:<0.021(#)	圃場A:<0.009/*<0.012 (#)	
レモン (果実)	1	20.0% WP (配合剤1)	770 g/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	20	圃場A:<0.021(#)	圃場A:<0.009/*<0.012 (#)	
かぼす (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	14, 21, 28 21	圃場A:<0.021 圃場B:<0.027	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*0.018	
ゆず (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	14, 21, 28	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012	
すだち (果実)	1	20.0% WP (配合剤1)	770 g/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	21	圃場A:<0.021(#)	圃場A:<0.009/*<0.012 (#)	
りんご (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	22 30	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	20 21	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012	
	6	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	14, 21, 28	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012 圃場C:<0.009/*<0.012	
					21	圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場D:<0.009/*<0.012 圃場E:<0.009/*<0.012 圃場F:<0.009/*<0.012	
				3	14, 21, 28 21	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021 圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012 圃場C:<0.009/*<0.012 圃場D:<0.009/*<0.012 圃場E:<0.009/*<0.012 圃場F:<0.009/*<0.012	
なし (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	19 16	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015	圃場A:<0.009/*<0.006 圃場B:<0.009/*<0.006	
	6	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012 圃場C:<0.009/*<0.012	
					1	圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場D:<0.009/*<0.012 圃場E:<0.009/*<0.012 圃場F:<0.009/*<0.012	
				3				
ひわ (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	21 25	圃場A:<0.021(#) 圃場B:<0.021(#)	圃場A:<0.009/*<0.012 (#) 圃場B:<0.009/*<0.012 (#)	
もも (果肉)	2	18.5% SL	750, 1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	20 19	圃場A:<0.042 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/*0.033 圃場B:<0.009/*<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1	圃場A:<0.026 圃場B:<0.026	圃場A:<0.014/*<0.012 (\$) 圃場B:<0.014/*<0.012 (\$)	
	3	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012 圃場C:<0.009/*<0.012	
					1	圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場D:<0.009/*<0.012 圃場E:<0.009/*<0.012 圃場F:<0.009/*<0.012	
もも (果皮)	2	18.5% SL	750, 1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	20 19	圃場A:<0.042 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/*0.033 圃場B:<0.009/*<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1	圃場A:<0.026 圃場B:<0.026	圃場A:<0.014/*<0.012 (\$) 圃場B:<0.014/*<0.012 (\$)	
もも (種子を除去し果皮を含む)	3	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 圃場C:<0.021	圃場A:<0.009/*<0.012 圃場B:<0.009/*<0.012 圃場C:<0.009/*<0.012	
	2	18.5% SL	750, 1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	20 19	圃場A:<0.038 圃場B:<0.020	圃場A:<0.009/*0.030 ^{注6)} 圃場B:<0.008/*<0.012 ^{注6)}	
もも (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1	圃場A:<0.014 圃場B:<0.014	圃場A:<0.008/*<0.006 ^{注6)} 圃場B:<0.008/*<0.006 ^{注6)}	
	3	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.020 圃場B:<0.020 圃場C:<0.020	圃場A:<0.009/*<0.011 ^{注7)} 圃場B:<0.009/*<0.011 ^{注7)} 圃場C:<0.009/*<0.011 ^{注7)}	
					1	圃場D:<0.020	圃場D:<0.009/*<0.011 ^{注7)}	
ネクタリン (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/*0.006 圃場B:<0.005/*0.006	
					1	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005/*0.006	

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート (代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定の根拠等
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数			
すもも (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:0.014 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/0.009 圃場B:<0.005/<0.006	
うめ (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	19	圃場A:<0.024	圃場A:<0.009/<0.015 (§)	
					22	圃場B:<0.024	圃場B:<0.009/<0.015 (§)	
おうとう (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.009 圃場B:0.045(3回, 3日)	圃場A:<0.005/<0.004 (§) 圃場B:<0.005/*0.041(*3回, 3日)	
					22	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	◎
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	19	圃場B:<0.072	圃場B:<0.009/0.063	
					1	圃場A:<0.015 圃場B:0.015	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006	
いちご (果実)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (親株床畦間処理 +子株床定食前全面土壤処理)	1+1	178	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					163	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	
	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.017 圃場B:0.093(3回, 3日)	圃場A:<0.009/<0.008 圃場B:/*0.085/*0.011(*3回, 3日、**3回, 7日)	◎
ブルーベリー (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (雑草生育期処理)	3	1, 3, 7	圃場A:0.019(3回, 3日) 圃場B:0.021	圃場A:<0.009/*0.009(*3回, 3日) 圃場B:<0.009/0.012	
ぶどう (果実)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	17	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					20	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.015 圃場B:<0.015	圃場A:<0.009/<0.006 圃場B:<0.009/<0.006	
	3	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021 1	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012 圃場C:<0.021	
					21	圃場A:<0.021(#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)	
かき (果実)	2	18.5% SL	500 g/10 a 雑草茎葉散布 (春季樹冠下処理)	2	21	圃場B:<0.021(#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
					31	圃場A:<0.021(#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)	
	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	20	圃場A:<0.015	圃場A:<0.009/<0.006	
					53	圃場B:<0.015	圃場B:<0.009/<0.006	
	1	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	20	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	4	1, 3, 5	圃場A:<0.021(#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)	
					3	1, 3, 7	圃場B:<0.015	圃場B:<0.009/<0.006
	6	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1, 3, 7	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012	
					1	圃場C:<0.021 圃場D:<0.021 圃場E:<0.021 圃場F:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012 圃場D:<0.009/<0.012 圃場E:<0.009/<0.012 圃場F:<0.009/<0.012	
キウイフルーツ (果肉)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	19 21	圃場A:<0.021 圃場B:<0.027	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/0.018	
キウイフルーツ (果皮)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	19 21	圃場A:<0.021 圃場B:<0.033	圃場A:<0.009/0.012 圃場B:<0.009/0.024	
キウイフルーツ (果実)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	19 21	圃場A:0.016 圃場B:0.017	圃場A:<0.009/0.007 ^{注5)} 圃場B:<0.009/0.008 ^{注5)}	
いちじく (可食部)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (土壤全面散布)	3	1	圃場A:<0.021 圃場B:0.033	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/0.024	
ひまわり (種子)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	30, 45, 60	圃場A:<0.011 圃場B:<0.013(3回, 45日)	圃場A:<0.005/<0.006 圃場B:<0.005/*0.008(*3回, 45日)	◎
なたね (種子)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	1	32, 47, 62 32, 49, 64	圃場A:<0.093(1回, 32日) 圃場B:<0.093(1回, 32日)	圃場A:<0.009/<0.083(*1回, 32日) 圃場B:<0.009/<0.083(*1回, 32日)	
いちょう (種子)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	11 14	圃場A:<0.017(#) 圃場B:<0.017	圃場A:<0.009/<0.008 (#) 圃場B:<0.009/<0.008	
くり (果実)	2	18.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	19 31	圃場A:<0.021(#) 圃場B:<0.021(#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#) 圃場B:<0.009/<0.012 (#)	
茶 (荒茶)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	6 7	圃場A:0.069 (#) 圃場B:<0.021(#)	圃場A:0.057/<0.012 (#) 圃場B:<0.009/<0.012 (#)	○
茶 (浸出液)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	6 7	圃場A:0.069 (#) 圃場B:<0.021(#)	圃場A:0.057/<0.012 (#) 圃場B:<0.009/<0.012 (#)	△
ホップ (乾花)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	1, 4, 8 1, 3, 7	圃場A:0.021 圃場B:<0.021	圃場A:0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012	
さんしょう (果実)	2	18.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	2	1, 14, 21, 35 1, 14, 21	圃場A:0.159(2回, 21日) 圃場B:0.028(2回, 21日)	圃場A:<0.009/*0.149(*2回, 21日) 圃場B:<0.009/*0.018(*2回, 21日)	◎
しそ (花穂)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	14	圃場A:<0.105 圃場B:<0.105	圃場A:<0.046/<0.060 圃場B:<0.046/<0.060	◎
しそ (葉)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	1, 14, 21	圃場A:0.019 圃場B:<0.011	圃場A:0.013/<0.006 圃場B:<0.005/<0.006	

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験 圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の 合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート (代謝物Zを含む。) /代謝物B】	設定 の根 拠等
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数			
みょうが (花穂)	2	18.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽前全面土壤散布+畦間処理)	1+1	7, 14, 21	圃場A:<0.011 圃場B:0.020(2回, 14日)	圃場A:<0.005/<0.006 圃場B:0.006/*0.014(*2回, 14日)	

SL : 液剤

WP : 顆粒水和剤 (配合剤1 : 1.3% フラザスルフロン)

(注)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

(\$ 同一圃場から採取された1つのサンプルを2つの分析機関に分けて測定されており、結果を平均値として示したため、実際の定量限界とは異なる。

今回、新たに提出された作物残留試験成績を網掛けで示した。

基準値の設定の根拠に○、曝露評価に使用されているものに△、基準値の設定根拠及び曝露評価にも使用されているものに◎で示した。

注1) グルホシネート (代謝物Zを含む。) 及び代謝物Bの合計濃度 (グルホシネートに換算した値) を示した。

注2) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験 (いわゆる最大使用条件下の作物残留試験) を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

代謝物Bの残留濃度は、グルホシネート濃度に換算した値で示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について()内に記載した。

注3) 一方の分析機関における分析試料調製において誘導体化反応されずにLC-MS/MSで測定され代謝物Zを含まないグルホシネート残留濃度として分析されたものの、キヤベツ及びレタスの植物代謝試験において代謝物B以外の抽出残渣を含めた代謝物残留濃度は10%TRR以下であることから、代謝物Zを含むグルホシネート残留濃度として示した。

注4) 果肉及び果皮の重量割合が不明のため、過去の作物残留試験等のデータから、それぞれの割合を果肉80%及び果皮20%として果実全体の残留濃度を算出した。

注5) 果肉及び果皮の重量比から果実全体の残留濃度を算出した。

注6) 果肉と果皮の重量比は測定されているが、これらに対する種子の重量比が不明のため、過去の作物残留試験等のデータから、果肉と果皮の和92%及び種子8%の重量比として果実全体の残留濃度を算出した。

注7) 果肉、果皮及び種子の重量比から果実全体の残留濃度を算出した。

グルホシネットPナトリウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験 圃場数	試験条件			回数	経過日数	各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネットP (代謝物2を含む。) /代謝物 B】	設定の根拠等
		剤型	使用量・使用方法	回数					
水稻 (玄米)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (耕起前全面処理+畦間処理)	1+3	1, 7	圃場A:<0.011(4回, 7日) (#)	圃場A:<0.005/<0.006(*4回, 7日) (#)		
小麦 (種実)	6	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+圃場周縁部処理)	1+3	1	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005/<0.006 (#)		
					2, 14, 21	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012		
					3, 13, 21	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012		
				1+3	7	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012		
					7	圃場D:<0.021	圃場D:<0.009/<0.012		
					7	圃場E:<0.021	圃場E:<0.009/<0.012		
大麦 (種実)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+圃場周縁部処理)	1+3	7, 14, 21	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012		
そば (脱穀種子)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+3	7, 14	圃場A:<0.011(4回, 14日) (#)	圃場A:<0.005/*0.006(*4回, 14日) (#)		
だいす (乾燥子実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+3	5, 11	圃場A:<0.011(4回, 11日) (#)	圃場A:<0.005/*0.006(*4回, 11日) (#)		
いんげんまめ (乾燥子実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+3	7, 14	圃場B:<0.011(4回, 14日) (#)	圃場B:<0.005/*0.006(*4回, 14日) (#)		
らっかせい (種実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+3	28, 35, 42	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)	◎	
ばれいしょ (塊茎)	2	11.5% SL	500+200+500+200 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+発芽前全面処理+ 畦間処理+枯渇収穫期全面処理)	I+I+I+2	27, 35, 42	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
さといも (塊根)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	4	1, 7	圃場A:<0.011(4回, 7日) (#)	圃場A:<0.005/*0.006(*4回, 7日) (#)		
			500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)		7, 14	圃場B:<0.011(4回, 14日) (#)	圃場B:<0.005/*0.006(*4回, 14日) (#)		
さといも (葉柄)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+2	7, 14	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006		
かんしょ (塊根)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播苗前全面処理+畦間処理)	1+3	30, 45	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005/<0.006 (#)		
やまのいも (塊根)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+3	30, 44	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005/<0.006 (#)		
さとうきび (茎)	3	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+3	14, 20, 28	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012		
だいこん (根部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+2	14, 21, 28	圃場B:<0.021	圃場B:<0.009/<0.012		
					14, 21, 28	圃場C:<0.021	圃場C:<0.009/<0.012		
だいこん (葉部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+2	30, 45	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005/<0.006 (#)		
					28, 42	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005/<0.006 (#)		
はつかだいこん (葉部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+2	30, 45, 60	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)		
					30, 45, 59	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
はつかだいこん (根部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+2	7, 14	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)		
					7, 13	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
はつかだいこん (葉部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+2	7, 14	圃場A:<0.058(3回, 14日) (#)	圃場A:<0.046/*0.012(*3回, 14日) (#)		
					7, 13	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
はくさい (葉球)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+畦間処理)	1+2	30, 45, 60	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)		
					30, 45, 60	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009/<0.012 (#)		
キャベツ (葉球)	2	11.5% SL	750 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+畦間処理)	1+2	1, 7	圃場A:<0.011(3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005/*0.006(*3回, 7日) (#)		
プロコッリー (花蕾)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+畦間処理)	1+2	1, 7, 14	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005/<0.006 (#)		
たかな (茎葉)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	1, 7, 14, 21	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012		
ごぼう (根部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+2	1, 14	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005/<0.006 (#)		
レタス (茎葉)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+畦間処理)	1+3	3, 7	圃場A:<0.011(4回, 7日) (#)	圃場A:<0.005/*0.006(*4回, 7日) (#)		
たまねぎ (鱗茎)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+2	7, 14	圃場A:<0.011(4回, 14日) (#)	圃場A:<0.005/*0.006(*4回, 14日) (#)		
ねぎ (茎葉)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+2	1, 8	圃場B:<0.011(4回, 8日) (#)	圃場B:<0.005/*0.006(*4回, 8日) (#)		
にんにく (鱗茎)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (萌芽前全面処理+畦間処理)	1+2	1, 7, 14	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009/<0.012 (#)		
にら (茎葉)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	I+2	1, 7, 14	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005/<0.006 (#)		
					1, 7, 14	圃場B:<0.014 (#)	圃場B:<0.008/<0.006 (#)		
					1, 7, 14	圃場C:<0.021 (#)	圃場C:<0.009/<0.012 (#)		

グルホシネットPナトリウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験 圃場数	試験条件			回数	経過日数	各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネットP (代謝物2を含む。) /代謝物 B】		設定の根拠等
		剤型	使用量・使用方法							
アスパラガス (若茎)	2	11.5% SL	500 mL/10 a (萌芽初期全面処理+時間処理)	1+2	1~7	圃場A:<0.011 (#) 圃場B:<0.011 (#)	圃場A:<0.005<0.006 (#) 圃場B:<0.005<0.006 (#)			
ぎぼうし (可食部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 株養成(露地) +促成(施設)	3	90	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005<0.006			
					84	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005<0.006			
にんじん (根部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	1+3	1~14	圃場A:<0.011 (#) 圃場B:<0.011 (#)	圃場A:<0.005<0.006 (#) 圃場B:<0.005<0.006 (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005<0.006			
ミニトマト (果実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a (定植前全面処理+時間処理)	1+2	1~7	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005<0.006			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005<0.006			
ピーマン (果実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a (定植前全面処理+時間処理)	1+3	1~7	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005<0.006 (#)			
					1~8	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005<0.006 (#)			
なす (果実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	1+2	1~7	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005<0.006			
					1~8	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005<0.006			
きゅうり (果実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	1+3	1~7, 14	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005<0.006 (#)			
					1~36, 43	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005<0.006 (#)			
かぼちゃ (果実)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	1+2	29, 37, 42	圃場A:<0.021 (3回, 29日) (#)	圃場B:<0.009<0.012 (3回, 29日) (#)			
					30, 37, 44	圃場C:<0.021 (#)	圃場C:<0.009<0.012 (#)			
ズッキーニ (果実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+時間処理)	1+2	1~8, 15	圃場A:<0.033 (3回, 8日) (#)	圃場A:<0.009<0.024 (3回, 8日) (#)			
					1~8, 14	圃場B:<0.021 (3回, 8日) (#)	圃場B:<0.009<0.012 (3回, 8日) (#)			◎
すいか (果肉)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	1+2, 1+3	1~7, 14	圃場A:<0.011 (4回, 1日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (4回, 1日) (#)			
					1~2	圃場B:<0.011 (3回, 1日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (3回, 1日) (#)			
メロン (果肉)	2	11.5% 液剤	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (時間処理)	3	1~7	圃場A:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005<0.006			
とうがん (果実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	1+2	1~7	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005<0.006			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005<0.006			
にがうり (果実)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (定植前全面処理+時間処理)	1+2	1~3, 7	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009<0.012 (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009<0.012 (#)			
ほうれんそう (茎葉)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	1+3	1, 7	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005<0.006 (#)			
					1, 6	圃場B:<0.011 (4回, 6日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (4回, 6日) (#)			
しょうが (根茎)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+時間処理)	1+3	1~8, 15	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009<0.012 (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009<0.012 (#)			
葉しょうが (葉部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+時間処理)	1+2	14, 21, 28	圃場A:<0.021 (#)	圃場A:<0.009<0.012 (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.021 (#)	圃場B:<0.009<0.012 (#)			
未成熟えんどう (さや)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	1+3	1~7	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005<0.006 (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005<0.006 (#)			
未成熟いんげん (さや)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	1+3	1~7	圃場A:<0.011 (#)	圃場A:<0.005<0.006 (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.011 (#)	圃場B:<0.005<0.006 (#)			
えだまめ (さや)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	1+3	1, 7	圃場A:<0.011 (4回, 7日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (4回, 7日) (#)			
					500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+時間処理)	圃場B:<0.011 (4回, 7日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (4回, 7日) (#)			
3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間・株間処理)	3	14, 21, 28	圃場A:<0.048	圃場A:<0.018/0.030				
					圃場B:<0.021 (3回, 21日)	圃場B:<0.009<0.012 (3回, 21日)				◎
かのこそう (根)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	2	14, 28, 41	圃場C:<0.021 (3回, 21日)	圃場C:<0.009<0.012 (3回, 21日)			
					14, 28, 42	圃場A:<0.021	圃場A:<0.009<0.012			
温州みかん (果肉)	2	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
温州みかん (果皮)	2	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.022 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.010<0.012 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.022 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.010<0.012 (3回, 7日) (#)			
温州みかん (果実)	2	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.014 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.006<0.008 (3回, 7日) ^{注3)} (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.014 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.006<0.008 (3回, 7日) ^{注3)} (#)			
いよかん (果肉)	1	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
いよかん (果皮)	1	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.022 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.010<0.012 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.022 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.010<0.012 (3回, 7日) (#)			
きよみ (果実)	1	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.014 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.006<0.008 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.014 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.006<0.008 (3回, 7日) (#)			
きよみ (果皮)	1	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.022 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.010<0.012 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.022 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.010<0.012 (3回, 7日) (#)			
ゆず (果実)	1	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
すだち (果実)	1	11.5% SL	2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
					2000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
りんご (果実)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
					1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.011 (3回, 7日) (#)	圃場B:<0.005<0.006 (3回, 7日) (#)			
日本なし (果実)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1~7	圃場A:<0.011	圃場A:<0.005<0.006 ^{注4)}			
					1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	圃場B:<0.011	圃場B:<0.005<0.006 ^{注4)}			
西洋なし (果実)	2									

グルホシネットPナトリウム塩の作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験 圃場数	試験条件			各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネットP (代謝物2を含む。) /代謝物 B】	設定の根拠等	
		剤型	使用量・使用方法	回数				
うめ (果実)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1,5 1,7	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006 ^{注4)} 圃場B:<0.005/<0.006 ^{注4)}	
おうとう (果実)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)		1,7	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006 ^{注4)} 圃場B:<0.005/<0.006 ^{注4)}	
いちご (果実)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付前全面処理+畦間処理)	1+3	1,7	圃場A:<0.031 (#) 圃場B:<0.011 (#)	圃場A:<0.005/0.026 (#) 圃場B:<0.005/<0.006 (#)	
ぶどう (果実)			500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)			圃場C:<0.011	圃場C:<0.005/<0.006	
ぶどう (果実)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1,7	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006 ^{注4)} 圃場B:<0.005/<0.006 ^{注4)}	
キウイー (果肉)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1,7	圃場A:<0.011(3回, 7日) (#) 圃場B:<0.011(3回, 7日) (#)	圃場A:<0.005/*<0.006(*3回, 7日) (#) 圃場B:<0.005/*<0.006(*3回, 7日) (#)	
いちじく (果実)	2	11.5% SL	1000 mL/10 a 雑草茎葉散布 (樹冠下処理)	3	1,7	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006 ^{注4)} 圃場B:<0.005/<0.006 ^{注4)}	
ごま (種子)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (播種前全面処理+畦間処理)	1+2	23, 30, 37 22, 29, 35	圃場A:<0.021 圃場B:<0.021	圃場A:<0.009/<0.012 圃場B:<0.009/<0.012	◎
茶 (荒茶)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)		2, 14	圃場A:<0.028 圃場B:<0.028	圃場A:<0.012/<0.015 (§) 圃場B:<0.012/<0.015 (§)	
ホップ	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (畦間処理)	3	2, 8 1, 7	圃場A:<0.044(3回, 2日) (#) 圃場B:<0.044(3回, 1日) (#)	圃場A:<0.020/*<0.024(*3回, 2日) (#) 圃場B:<0.020/*<0.024(*3回, 1日) (#)	
甘草 (根)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (2年生・畦間処理)		14, 28, 42	圃場A:<0.020 圃場B:<0.020 圃場C:<0.020	圃場A:<0.010/<0.010 圃場B:<0.010/<0.010 圃場C:<0.010/<0.010	
			500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (3年生・畦間処理) (2年生処理と圃場A及びCは同日散布。圃場Bは1日遅い散布)	3	14, 28, 42	圃場A:<0.020 圃場B:<0.020 圃場C:<0.020(3回, 42日)	圃場A:<0.010/<0.010 圃場B:<0.010/<0.010 圃場C:<0.010/*0.010(*3回, 42日)	
	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (2年生・畦間処理)			圃場A:<0.020 圃場B:<0.020 圃場C:<0.020	圃場A:<0.010/<0.010 圃場B:<0.010/<0.010 圃場C:<0.010/<0.010	
甘草 (ほふく茎)	3	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (2年生・畦間処理)	3	14, 28, 42	圃場A:<0.020 圃場B:<0.020 圃場C:<0.020	圃場A:<0.010/<0.010 圃場B:<0.010/<0.010 圃場C:<0.010/<0.010	
			500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (3年生・畦間処理) (2年生処理と圃場A及びCは同日散布。圃場Bは1日遅い散布)			圃場A:0.023(3回, 28日) 圃場B:<0.020 圃場C:0.020(3回, 28日)	圃場A:<0.010/*0.013(*3回, 28日) 圃場B:<0.010/<0.010 圃場C:<0.010/*0.010(*3回, 28日)	
みょうが (花穂)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布 (植付後萌芽前全面処理+畦間処理)	1+1	14, 26 14, 28	圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006 圃場B:<0.005/<0.006	
しそ (可食部)	2	11.5% SL	500 mL/10 a 雑草茎葉散布			圃場A:<0.011 圃場B:<0.011	圃場A:<0.005/<0.006 圃場B:<0.005/<0.006	

SL : 液剤

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

(\$)同一圃場から採取された1つのサンプルを2つの分析機間に分けて測定されており、結果を平均値として示したため、実際の定量限界とは異なる。

今回、新たに提出された作物残留試験成績を網掛けで示した。

基準値の設定根拠及び暴露評価に使用されているものに◎で示した。

注1) グルホシネットP (代謝物2を含む。) 及び代謝物Bの合計濃度 (グルホシネットPに換算した値) を示した。

注2) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験 (いわゆる最大使用条件下的作物残留試験) を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

代謝物Bの残留濃度は、グルホシネット (遊離酸) 濃度に換算した値で示した。

表中、最大使用条件下的作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について () 内に記載した。

注3) 果肉及び果皮の重量比から果実全体会の残留濃度を算出した。

注4) グルホシネットPナトリウム塩の果樹類(かんきつ、りんご、びわ、いちょう(種子)、くり、キウイフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く)の適用に対し、日本なし、西洋なし、うめ、おうとう、ぶどう、いちじくにおいて残留濃度がいずれも定量限界未満であることをブラックベリー及びクランベリーの設定根拠とした。

グルホシネートアンモニウム塩の作物残留試験一覧表 (米国)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【グルホシネート/代謝物Z/代謝物B】	設定の根拠等
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数			
綿実	12	24.5% SL	総散布量 1700 g ai/ha(1回) 1766 g ai/ha(2回)	1, 2	90	圃場A:2. 196(1回, 90日)	圃場A:0. 024/2. 080/0. 092 (1回, 90日)	◎
			総散布量 1820 g ai/ha(1回) 1803 g ai/ha(2回)		91	圃場B:2. 78(2回, 91日)	圃場B:0. 036/2. 70/0. 049 (2回, 91日)	◎
			総散布量 1770 g ai/ha(1回) 1795 g ai/ha(2回)		95	圃場C:1. 914(1回, 95日)	圃場C:0. 044/1. 825/0. 045 (1回, 95日)	◎
			総散布量 1790 g ai/ha(1回) 1778 g ai/ha(2回)		97	圃場D:3. 30(2回, 97日)	圃場D:0. 020/3. 09/0. 188 (2回, 97日)	◎
			総散布量 1810 g ai/ha(1回) 1807 g ai/ha(2回)		99, 105, 111, 117, 131	圃場E:4. 13(1回, 111日)	圃場E:0. 067/*3. 82/**0. 416 (*1回, 111日、 **1回, 99日)	◎
			総散布量 1800 g ai/ha(1回) 1795 g ai/ha(2回)		104, 113, 118, 131, 135	圃場F:4. 32(1回, 118日)	圃場F:0. 069/**4. 16/**0. 114 (*1回, 131日、 **1回, 118日)	◎
			総散布量 1770 g ai/ha(1回) 1766 g ai/ha(2回)		70, 77, 84, 90, 96	圃場G:8. 14(2回, 77日)	圃場G:0. 151/**7. 33/**0. 722 (*2回, 96日、 **2回, 77日、 **2回, 70日)	◎
			総散布量 1760 g ai/ha(1回) 1776 g ai/ha(2回)		106	圃場G:4. 66(2回, 106日)	圃場G:0. 066/4. 30/0. 286 (2回, 106日)	
			総散布量 1810 g ai/ha(1回) 1789 g ai/ha(2回)		98	圃場H:4. 49(2回, 98日)	圃場H:0. 050/4. 16/0. 282 (2回, 98日)	◎
			総散布量 1890 g ai/ha(1回) 1805 g ai/ha(2回)		84	圃場I:1. 718(2回, 84日)	圃場I:0. 033/1. 505/0. 180 (2回, 84日)	◎
			総散布量 1720 g ai/ha(1回) 1770 g ai/ha(2回)		79, 86, 93, 100, 107	圃場J:6. 33(2回, 79日)	圃場J:0. 077/**5. 98/**0. 308 (*2回, 107日、 **2回, 79日)	◎
			総散布量 1800 g ai/ha(1回) 1801 g ai/ha(2回)		100	圃場K:1. 317(1回, 100日)	圃場K:0. 013/1. 155/0. 148 (1回, 100日)	◎
ホップ (乾花)	6	24.5% SL	総散布量 3408 g ai/ha (畝間処理)	3	9	圃場A:0. 064	圃場A:0. 033/<0. 01/0. 021	◎
			総散布量 3397 g ai/ha (畝間処理)		10	圃場B:0. 029	圃場B:<0. 009/<0. 01/0. 010	◎
			総散布量 3488 g ai/ha (畝間処理)		11	圃場C:0. 225	圃場C:0. 045/<0. 01/0. 170	◎
			総散布量 3199 g ai/ha (畝間処理)		10	圃場D:0. 426	圃場D:0. 064/<0. 01/0. 353	◎
			総散布量 3385 g ai/ha (畝間処理)		10	圃場E:0. 233	圃場E:0. 150/<0. 01/0. 074	
			総散布量 3362 g ai/ha (畝間処理)		11	圃場E:0. 284	圃場E:0. 235/<0. 01/0. 039	◎
			総散布量 3430 g ai/ha (畝間処理)		10	圃場F:0. 351	圃場F:0. 048/<0. 01/0. 293	◎

SL : 液剤

今回、新たに提出された作物残留試験成績を網掛けで示した。

基準値の設定根拠及び暴露評価に使用されているものに◎で示した。

注1) グルホシネート、代謝物Z及び代謝物Bの合計濃度 (グルホシネートに換算した値) を示した。

注2) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験 (いわゆる最大使用条件下の作物残留試験) を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

代謝物Z及び代謝物Bの残留濃度は、グルホシネート濃度に換算した値で示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時の測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について () 内に記載した。

綿実の圃場G及びホップの圃場Eについては一か月以内に同一地域で2試験が行われていることから残留濃度の高い方を採用した。

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録有無		参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
			グルホシ ネット	グルホシ ネットP	国際 基準 ppm	国/地域 基準値 ppm	
米(玄米をいう。)	0.2	0.3	○	○			0.042,0.048(¥)(G)
小麦	0.04	0.2	○・申	○			<0.021～0.032(¥)(n=8)(G)
大麦	0.5	0.5	○	○			<0.140,<0.140(¥)(G)
とうもろこし	0.1	0.1	○		0.1		
そば	0.3	0.3	○	○			<0.081,0.081(¥)(G)
大豆	2	2	○	○	2		
小豆類	0.2	0.3	○	○	0.05		<0.042,<0.042(¥)(いんげんま め)(G)
えんどう	0.2	0.3	○	○			(小豆類参照)
そら豆	0.2	0.3	○	○			(小豆類参照)
らつかせい	0.1	0.1	○	○			<0.021,<0.021(¥)(P)
その他の豆類	0.2	0.3	○	○	0.05		(小豆類参照)
ばれいしょ	0.1	0.1	○・申	○	0.1		
さといも類(やつがしらを含む。)	0.1	0.3	○	○			<0.021,<0.021(¥)(G)
かんしょ	0.04	0.1	○・申	○			<0.018～0.030(n=8)(¥)(G)
やまいも(長いもをいう。)	0.2	0.2	○	○			<0.021,0.027(¥)(G)
こんにゃくいも	0.2	0.2	○	○			<0.021,0.027(¥)(G)
てんさい	2	2			1.5		
さとうきび	0.03	0.03	○	○			<0.021(n=3)(G)
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根	0.3	0.3	○・申	○			<0.017,0.054(¥)(はつかだいこん (根部))(G)
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉	0.3	0.3	○・申	○			<0.017,0.059(¥)(はつかだいこん (葉部))(G)
かぶ類の根	0.1	0.1	○				<0.015,<0.015(¥)(G)
かぶ類の葉	0.1	0.1	○				<0.015,<0.015(¥)(G)
クレソン	0.3						
はくさい	0.03	0.1	○・申	○			<0.021(n=6)(G)
キャベツ	0.03	0.1	○・申	○			<0.021(n=6)(G)
プロッコリー	0.03	0.1	○・申	○			<0.020～<0.021(n=5)(G)
その他のあぶらな科野菜	0.2	0.2	○	○			<0.042,<0.042(¥)(たかな)(G)
ごぼう	0.2	0.2	○	○			<0.032,<0.032(¥)(G)
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)	0.4	0.4	○・申	○	0.4		
その他のきく科野菜	0.5	0.5	○				<0.105,<0.105(¥)(食用ぎく)(G)
たまねぎ	0.1	0.2	○・申	○	0.05		
ねぎ(リーキを含む。)	0.1	0.1	○・申	○			<0.015～0.044(n=12)(たまね ぎ)(G)、<0.015～<0.021(n=10)(ね ぎ)(G)、<0.016,<0.021(葉ね ぎ)(G)、<0.089,<0.089(にんに ぎ)(G)
にんにく	0.1	0.3	○・申	○			(たまねぎ参照)
にら	0.1	0.1	○	○			(たまねぎ参照)
アスパラガス	0.4	0.4	○	○	0.4		<0.018,<0.018(¥)(G)
わけぎ	0.1	0.1	○・申				(たまねぎ参照)
その他のゆり科野菜	0.1	0.05	○・申				(たまねぎ参照)
にんじん	0.1	0.1	○	○	0.05		<0.016,<0.016(¥)(G)
パセリ	0.7	0.7	○				<0.21,<0.21(¥)(G)
セロリ	0.04	0.2	○				<0.018,<0.021,0.023(G)
みつば	0.1	0.2	○				<0.016,0.027,0.050(G)
その他のせり科野菜	0.1	0.3	○				<0.021,<0.021(¥)(とうきの葉)(G)
トマト	0.03	0.1	○・申	○			<0.021(n=2)(トマト)、 <0.021(n=4)(スニトマト)(G)
ピーマン	0.03	0.1	○・申	○			<0.021(n=4)(G)
なす	0.03	0.1	○・申	○			<0.021(n=6)(G)
その他のなす科野菜	0.1	0.1	○	○	0.1		

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録有無		参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
			グルホシ ネット	グルホシ ネットP	国際 基準 ppm	国/地域 基準値 ppm	
きゅうり(ガーキンを含む。)	0.03	0.1	○・申	○			<0.021～0.021(n=10)(G)
かぼちゃ(スカッシュを含む。)	0.2	0.2	○	○			0.021,0.033(#)(¥)(ズッキーニ)(P)
しろり	0.3	0.3	○				<0.063,<0.063(¥)(G)
すいか	0.1	0.1	○	○			<0.016,0.017(¥)(果肉)(G)
メロン類果実	0.3	0.3	○	○			<0.021,0.060(¥)(果肉)(G)
その他のうり科野菜	0.1	0.1	○	○			<0.021,0.021(¥)(にがうり)(G)
ほうれんそう	0.03	0.1	○・申	○			<0.015～<0.021(n=8)(G)
たけのこ	0.2	0.2	○				<0.042,<0.042(¥)(G)
オクラ	0.1	0.1	○				<0.015,0.016(#)(¥)(G)
しょうが	0.3	0.3	○				<0.020,0.078(¥)(G)
未成熟えんどう	0.03	0.1	○・申	○			<0.011～<0.021(n=4)(さやえんどう)(G)、<0.008～<0.011(n=6)(さやいんげん)(G)
未成熟いんげん	0.05	0.05	○・申	○	0.05		
えだまめ	0.1	0.2	○・申	○			0.021,0.021,0.048(P)
その他の野菜	0.3	0.3	○	○			0.042,0.066(¥)(モロヘイヤ)(G)
みかん(外果皮を含む。)	0.05	0.2	○・申	○	0.05		
なつみかんの果実全体	0.05	0.2	○・申	○	0.05		
レモン	0.05	0.2	○・申	○	0.05		
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)	0.05	0.2	○・申	○	0.05		
グレープフルーツ	0.05	0.2	○・申	○	0.05		
ライム	0.05	0.2	○・申	○	0.05		
その他のかんきつ類果実	0.05	0.2	○・申	○	0.05		
りんご	0.1	0.1	○・申	○	0.1		
日本なし	0.1	0.1	○・申	○	0.1		
西洋なし	0.1	0.1	○・申	○	0.1		
マルメロ	0.1	0.1			0.1		
びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.1	0.1	○	○	0.1		
もも(果皮及び種子を含む。)	0.2	0.2	○・申	○	0.15		
ネクタリン	0.2	0.2	○	○	0.15		
あんず(アプリコットを含む。)	0.2	0.2	○	○	0.15		
すもも(ブルーンを含む。)	0.2	0.2	○	○	0.15		
うめ	0.2	0.2	○	○	0.15		
おうとう(チェリーを含む。)	0.3	0.3	○	○	0.15		<0.021,0.072(¥)(G)
いちご	0.3	0.3	○	○	0.3		<0.017,0.093(¥)(G)
ラズベリー	0.1	0.1		○	0.1		
ブラックベリー	0.01	0.01		○			※1
ブルーベリー	0.1	0.1	○	○	0.1		
クランベリー	0.01	0.01		○			※1
ハックルベリー	0.1	0.1		○	0.1		
その他のベリー類果実	1	1	○	○	1		
ぶどう	0.2	0.2	○・申	○	0.15		
かき	0.1	0.1	○・申	○	0.1		
バナナ	0.2	0.2		○	0.2		
キウイ(果皮を含む。)	0.6	0.6	○	○	0.6		
パパイヤ	0.1	0.1		○	0.1		
アボカド	0.1	0.1		○	0.1		
パインアップル	0.1	0.1		○	0.1		
グアバ	0.1	0.1		○	0.1		
マンゴー	0.1	0.1		○	0.1		
パッションフルーツ	0.1	0.1		○	0.1		
なつめやし	0.1	0.1		○	0.1		
その他の果実	0.2	0.2	○	○	0.15		
ひまわりの種子	0.05		申				<0.011,0.013(¥)(G)
ごまの種子	0.1	0.1		○			<0.021,<0.021(¥)(P)
綿実	15	5	IT		5	15	米国
なたね	2	2	○		1.5		【1.317～8.14(n=11)(米国)】(G)

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録有無		参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
			グルホシ ネット	グルホシ ネットP	国際 基準 ppm	国/地域 基準値 ppm	
ぎんなん	0.1	0.1	○	○	0.1		
くり	0.1	0.1	○	○	0.1		
ペカン	0.1	0.1	○	○	0.1		
アーモンド	0.1	0.1	○	○	0.1		
くるみ	0.1	0.1	○	○	0.1		
その他のナッツ類	0.1	0.1	○	○	0.1		
茶	0.3	0.3	○	○			<0.021,0.069(¥)(G)
コーヒー豆	0.1	0.1			0.1		
ホップ	0.9	0.2	○・IT	○	0.9	米国	【0.029～0.426(n=6)(米国)】(G)
その他のスパイス	0.5	0.5	○・申	○	0.05		0.028,0.159(¥)(さんしょう)(G)
その他のハーブ	0.5	0.5	○	○	0.05		<0.105,<0.105(¥)(しそ(花穂))(G)
牛の筋肉	0.2	0.2			0.05	米国	【推:<0.10】
豚の筋肉	0.2	0.2			0.05	米国	【牛の筋肉参照】
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2	0.2			0.05		【牛の筋肉参照】
牛の脂肪	0.4	0.4			0.05	米国	【推:0.14】
豚の脂肪	0.4	0.4			0.05	米国	【牛の脂肪参照】
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4	0.4			0.05		【牛の脂肪参照】
牛の肝臓	6	6			3	6.0	米国
豚の肝臓	6	6			3	6.0	米国
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	6	6			3		【牛の肝臓参照】
牛の腎臓	6	6			3	6.0	米国
豚の腎臓	6	6			3	6.0	米国
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	6	6			3		【牛の肝臓参照】
牛の食用部分	6	6			3	6.0	米国
豚の食用部分	6	6			3	6.0	米国
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	6	6			3		【牛の肝臓参照】
乳	0.2	0.2			0.02	米国	【推:<0.04】
鶏の筋肉	0.2	0.2			0.05	米国	【推:<0.076】
その他の家きんの筋肉	0.2	0.2			0.05	米国	【鶏の筋肉参照】
鶏の脂肪	0.2	0.2			0.05	米国	【推:<0.076】
その他の家きんの脂肪	0.2	0.2			0.05	米国	【鶏の脂肪参照】
鶏の肝臓	0.6	0.6			0.1	0.60	米国
その他の家きんの肝臓	0.6	0.6			0.1	0.60	米国
鶏の腎臓	0.6	0.6			0.1	0.60	米国
その他の家きんの腎臓	0.6	0.6			0.1	0.60	米国
鶏の食用部分	0.6	0.6			0.1	0.60	米国
その他の家きんの食用部分	0.6	0.6			0.1	0.60	米国
鶏の卵	0.2	0.2			0.05	米国	【推:<0.076】
その他の家きんの卵	0.2	0.2			0.05	米国	【鶏の卵参照】

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録有無		参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
			グルホシ ネート	グルホシ ネートP	国際 基準 ppm	国/地域 基準値 ppm	
はちみつ	0.05						※2
すもも(乾燥させたもの)					0.3		※3
なたね油(注1を除く。)					0.05		※3
てんさい糖蜜					8		※3

太枠:本基準(暫定基準以外の基準)を見直した基準値

斜線:食品区分を別途新設すること等に伴い、削除した食品区分、もしくは加工食品につき基準値を設定しないもの

○:既に、国内において登録等がされているもの

登録有無の欄のグルホシネートはグルホシネートアンモニウム塩に、グルホシネートPはグルホシネートPナトリウム塩に登録があることを示す。

申:農薬の登録申請等に伴い基準値設定依頼がなされたもの

IT:海外で設定されている基準値を参照するようインポートトレランス申請されたもの

(#):適用の範囲内で試験が行われていない作物残留試験成績

(¥):基準値設定の根拠とした作物残留試験成績(最大値)

推:推定される残留濃度

(G)グルホシネートアンモニウム塩を用いた作物残留試験成績

(P)グルホシネートPナトリウム塩を用いた作物残留試験成績

基準値案、基準値現行、参考基準値及び作物残留試験成績はグルホシネート、代謝物B及び代謝物Zの和(グルホシネートに換算)としての濃度でそれぞれ示している。

注1)食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油

※1)「食品中の農薬の残留基準設定の基本原則について」(令和6年6月25日食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会)の別添5「残留性が極めて低い農薬の基準値設定の考え方について」に基づき設定。

※2)「食品中の農薬の残留基準設定の基本原則について」(令和6年6月25日食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会)の別添3「はちみつ中の農薬等の基準設定の方法について」に基づき設定。

※3)加工食品である「すもも(乾燥させたもの)」、「なたね油」及び「てんさい糖蜜」について、国際基準が設定されているが、加工係数を用いて原材料中の濃度に換算した値が当該原材料の基準値案を超えないことから、基準値を設定しないこととする。基準値が設定されていない加工食品については、原材料の基準値に基づき加工係数を考慮して適否を判断することとしている。なお、本物質について、JMPRはすもも(乾燥させたもの)、なたね油及びてんさい糖蜜の加工係数を1.79、<0.48及び5.63と算出している。

グルホシネットの推定摂取量 (単位: µg/人/日)

食品名	基準値案 (ppm)	暴露評価に用いた数値 (ppm)	国民全体 (1歳以上) EDI	幼小児 (1~6歳) EDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) EDI
米 (玄米をいう。)	0.2	0.045	7.4	3.9	4.7	8.1
小麦	0.04	0.021	1.3	0.9	1.4	1.0
大麦	0.5	0.14	0.7	0.6	1.2	0.6
とうもろこし	0.1	0.05	0.2	0.3	0.3	0.2
そば	0.3	0.081	0.1	0.0	0.1	0.1
大豆	2	0.32	12.5	6.5	10.0	14.8
小豆類	0.2	0.042	0.1	0.0	0.0	0.2
えんどう	0.2	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0
そら豆	0.2	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0
らっかせい	0.1	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の豆類	0.2	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0
ばれいしょ	0.1	0.05	1.9	1.7	2.1	1.8
さといも類 (やつがしらを含む。)	0.1	0.021	0.1	0.0	0.0	0.2
かんしょ	0.04	0.021	0.1	0.1	0.3	0.2
やまいも (長いもをいう。)	0.2	0.024	0.1	0.0	0.0	0.1
こんにゃくいも	0.2	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0
てんさい	2	0.28	9.1	7.8	11.5	9.3
さとうきび	0.03	0.021	2.1	1.8	2.6	2.1
だいこん類 (ラディッシュを含む。) の根	0.3	0.036	1.2	0.4	0.7	1.6
だいこん類 (ラディッシュを含む。) の葉	0.3	0.038	0.1	0.0	0.1	0.1
かぶ類の根	0.1	0.015	0.0	0.0	0.0	0.1
かぶ類の葉	0.1	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0
はくさい	0.03	0.021	0.4	0.1	0.3	0.5
キャベツ	0.03	0.021	0.5	0.2	0.4	0.5
ブロッコリー	0.03	0.021	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のあぶらな科野菜	0.2	0.042	0.1	0.0	0.0	0.2
こぼう	0.2	0.032	0.1	0.1	0.1	0.1
レタス (サラダ菜及びしやを含む。)	0.4	0.05	0.5	0.2	0.6	0.5
その他のきく科野菜	0.5	0.105	0.2	0.0	0.1	0.3
たまねぎ	0.1	0.021	0.7	0.5	0.7	0.6
ねぎ (リーキを含む。)	0.1	0.021	0.2	0.1	0.1	0.2
にんにく	0.1	0.021	0.0	0.0	0.1	0.0
にら	0.1	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0
アスパラガス	0.4	0.05	0.1	0.0	0.1	0.1
わけぎ	0.1	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のゆり科野菜	0.1	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0
にんじん	0.1	0.016	0.3	0.2	0.4	0.3
バセリ	0.7	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0
セロリ	0.04	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0
みつば	0.1	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のせり科野菜	0.1	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0
トマト	0.03	0.021	0.7	0.4	0.7	0.8
ピーマン	0.03	0.021	0.1	0.0	0.2	0.1
なす	0.03	0.021	0.3	0.0	0.2	0.4
その他のなす科野菜	0.1	0.05	0.1	0.0	0.1	0.1
きゅうり (ガーキンを含む。)	0.03	0.021	0.4	0.2	0.3	0.5
かぼちゃ (スカッシュを含む。)	0.2	0.027	0.3	0.1	0.2	0.4
しろうり	0.3	0.063	0.0	0.0	0.0	0.1
すいか	0.1	0.017	0.1	0.1	0.2	0.2
メロン類果実	0.3	0.04	0.1	0.1	0.2	0.2
その他のうり科野菜	0.1	0.021	0.1	0.0	0.0	0.1
ほうれんそう	0.03	0.021	0.3	0.1	0.3	0.4
たけのこ	0.2	0.042	0.2	0.1	0.0	0.2
オクラ	0.1	0.0155	0.0	0.0	0.0	0.0
しょうが	0.3	0.049	0.1	0.0	0.1	0.1
未成熟えんどう	0.03	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0
未成熟いんげん	0.05	0.05	0.1	0.1	0.0	0.2
えたまめ	0.1	0.021	0.0	0.0	0.0	0.1
その他の野菜	0.3	0.054	0.7	0.3	0.5	0.8

グルホシネットの推定摂取量 (単位: µg/人/日)

食品名	基準値案 (ppm)	暴露評価に用いた数値 (ppm)	国民全体 (1歳以上) EDI	幼小児 (1~6歳) EDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) EDI
みかん (外果皮を含む。)	0.05	0.05	0.9	0.8	0.0	1.3
なつみかんの果実全体	0.05	0.05	0.1	0.0	0.2	0.1
レモン	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
オレンジ (ネーブルオレンジを含む。)	0.05	0.05	0.4	0.7	0.6	0.2
グレープフルーツ	0.05	0.05	0.2	0.1	0.4	0.2
ライム	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のかんきつ類果実	0.05	0.05	0.3	0.1	0.1	0.5
りんご	0.1	0.05	1.2	1.5	0.9	1.6
日本なし	0.1	0.05	0.3	0.2	0.5	0.4
西洋なし	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
マルメロ	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.1	0.05	0.0	0.0	0.1	0.0
もも (果皮及び種子を含む。)	0.2	0.05	0.2	0.2	0.3	0.2
ネクタリン	0.2	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
あんず (アブリコットを含む。)	0.2	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
すもも (ブルーンを含む。)	0.2	0.05	0.1	0.0	0.0	0.1
うめ	0.2	0.05	0.1	0.0	0.0	0.1
おうとう (チェリーを含む。)	0.3	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0
いちご	0.3	0.055	0.3	0.4	0.3	0.3
ラズベリー	0.1	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0
ブラックベリー	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
ブルーベリー	0.1	0.05	0.1	0.0	0.0	0.1
クランベリー	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
ハックルベリー	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のベリー類果実	1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ぶどう	0.2	0.02	0.2	0.2	0.4	0.2
かき	0.1	0.05	0.5	0.1	0.2	0.9
バナナ	0.2	0.05	0.7	0.8	0.8	0.9
キウイ (果皮を含む。)	0.6	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1
パパイヤ	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
アボカド	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
パイナップル	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1
グアバ	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
マンゴー	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
パッションフルーツ	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
なつめやし	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の果実	0.2	0.05	0.1	0.0	0.0	0.1
ひまわりの種子	0.05	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0
ごまの種子	0.1	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0
綿実	15	3.30	0.3	0.3	0.3	0.3
なたね	2	0.225	1.3	0.8	1.2	1.0
ぎんなん	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
くり	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
ペカン	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
アーモンド	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
くるみ	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のナッツ類	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	0.3	0.045	0.3	0.0	0.2	0.4
コーヒー豆	0.1	0.04	0.1	0.0	0.0	0.1
ホップ	0.9	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のスペイス	0.5	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のハーブ	0.5	0.105	0.1	0.0	0.0	0.1

グルホシネットの推定摂取量 (単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$)

食品名	基準値案 (ppm)	暴露評価に用 いた数値 (ppm)	国民全体 (1歳以上) EDI	幼小児 (1~6歳) EDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) EDI
陸棲哺乳類の肉類	0.4	筋肉 0.065 脂肪 0.067	3.8	2.8	4.2	2.7
陸棲哺乳類の食用部分 (肉類除く)	6	0.81	1.1	0.6	3.9	0.7
陸棲哺乳類の乳類	0.2	0.026	6.9	8.6	9.5	5.6
家きんの肉類	0.6	0.2	4.3	3.1	4.5	3.2
家きんの卵類	0.2	0.02	0.8	0.7	1.0	0.8
はちみつ	0.05	● 0.05	0.0	0.0	0.1	0.1
計			68.9	50.2	71.8	71.3
ADI比 (%)			13.7	33.5	13.5	14.0

EDI: 推定一日摂取量 (Estimated Daily Intake)

EDI試算法: 作物残留試験成績の中央値 (STMR) 等 × 各食品の平均摂取量

●: 個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値 (案) の数値を用いた。

茶については、浸出液 (茶葉当たりの残留濃度) における作物残留試験結果を用いてEDI試算をした。

「陸棲哺乳類の肉類」については、EDI試算では、畜産物中の平均的な残留農薬濃度を用い、摂取量の筋肉及び脂肪の比率をそれぞれ80%、20%として試算した。

グルホシネットの推定摂取量 (短期) : 国民全体(1歳以上)

食品名 (基準値設定対象)	食品名 (ESTI推定対象)	基準値案 (ppm)	評価に用いた 数値 (ppm)	ESTI (μ g/kg体重)	ESTI/ARfD (%)
米 (玄米をいう。)	米	0.2	○ 0.045	0.3	3
小麦	小麦	0.04	○ 0.021	0.0	0
大麦	大麦	0.5	○ 0.14	0.1	1
	麦茶	0.5	○ 0.14	0.1	1
とうもろこし	スイートコーン	0.1	○ 0.05	0.6	6
そば	そば	0.3	○ 0.081	0.1	1
大豆	大豆	2	○ 0.32	0.3	3
小豆類	いんげん	0.2	0.2	0.3	3
らっかせい	らっかせい	0.1	○ 0.021	0.0	0
ばれいしょ	ばれいしょ	0.1	○ 0.05	0.5	5
さといも類 (やつがしらを含む。)	さといも	0.1	0.1	0.5	5
かんしょ	かんしょ	0.04	○ 0.03	0.4	4
やまいも (長いもをいう。)	やまいも	0.2	0.2	1.6	20
だいこん類 (ラディッシュを含む。) の根	だいこんの根	0.3	0.3	3.5	40
だいこん類 (ラディッシュを含む。) の葉	だいこんの葉	0.3	0.3	2.5	30
かぶ類の根	かぶの根	0.1	0.1	0.7	7
かぶ類の葉	かぶの葉	0.1	0.1	0.3	3
はくさい	はくさい	0.03	○ 0.021	0.3	3
キャベツ	キャベツ	0.03	○ 0.021	0.2	2
ブロッコリー	ブロッコリー	0.03	○ 0.021	0.1	1
その他のあぶらな科野菜	たかな	0.2	0.2	1.6	20
	菜花	0.2	0.2	0.6	6
ごぼう	ごぼう	0.2	0.2	1.0	10
レタス (サラダ菜及びちしやを含む。)	レタス類	0.4	○ 0.29	1.6	20
たまねぎ	たまねぎ	0.1	○ 0.089	0.7	7
ねぎ (リーキを含む。)	ねぎ	0.1	○ 0.089	0.3	3
にんにく	にんにく	0.1	○ 0.089	0.1	1
にら	にら	0.1	0.1	0.1	1
アスパラガス	アスパラガス	0.4	○ 0.27	0.6	6
わけぎ	わけぎ	0.1	○ 0.089	0.2	2
その他のゆり科野菜	にんにくの芽	0.1	○ 0.089	0.2	2
	らっきょう	0.1	○ 0.089	0.1	1
にんじん	にんじん	0.1	0.1	0.4	4
	にんじんジュース	0.1	○ 0.016	0.1	1
パセリ	パセリ (生)	0.7	0.7	0.1	1
	パセリ (乾燥)	0.7	○ 0.21	0.2	2
セロリ	セロリ	0.04	0.04	0.2	2
みつば	みつば	0.1	0.1	0.1	1
その他のせり科野菜	せり	0.1	0.1	0.2	2
トマト	トマト	0.03	○ 0.021	0.2	2
ピーマン	ピーマン	0.03	○ 0.021	0.1	1
なす	なす	0.03	○ 0.021	0.1	1
その他のなす科野菜	とうがらし (生)	0.1	○ 0.05	0.1	1
	ししどう	0.1	○ 0.05	0.1	1
きゅうり (ガーキンを含む。)	きゅうり	0.03	○ 0.021	0.1	1
かぼちゃ (スカッシュを含む。)	かぼちゃ	0.2	0.2	2.0	20
	ズッキーニ	0.2	0.2	1.4	10
しろうり	しろうり	0.3	0.3	2.5	30
すいか	すいか	0.1	0.1	3.3	30
メロン類果実	メロン	0.3	0.3	5.1	50
その他のうり科野菜	とうがん	0.1	0.1	1.7	20
	にがうり	0.1	0.1	0.8	8
ほうれんそう	ほうれんそう	0.03	○ 0.021	0.1	1
たけのこ	たけのこ	0.2	0.2	1.6	20
しょうが	しょうが	0.3	0.3	0.3	3
未成熟えんどう	未成熟えんどう (さや)	0.03	○ 0.021	0.0	0
	未成熟えんどう (豆)	0.03	○ 0.021	0.0	0
未成熟いんげん	未成熟いんげん	0.05	○ 0.05	0.1	1

グルホシネットの推定摂取量 (短期) : 国民全体(1歳以上)

食品名 (基準値設定対象)	食品名 (ESTI推定対象)	基準値案 (ppm)	評価に用いた 数値 (ppm)	ESTI (μ g/kg体重)	ESTI/ARfD (%)
えだまめ	えだまめ	0.1	0.1	0.3	3
	ずいき	0.3	0.3	3.0	30
その他の野菜	もやし	0.3	0.3	0.7	7
	れんこん	0.3	0.3	1.9	20
	そら豆(生)	0.3	0.3	0.9	9
みかん(外果皮を含む。)	みかん	0.05	○ 0.05	0.5	5
なつみかんの果実全体	なつみかん	0.05	○ 0.05	0.6	6
レモン	レモン	0.05	○ 0.05	0.1	1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)	オレンジ	0.05	○ 0.05	0.5	5
	オレンジ果汁	0.05	○ 0.05	0.5	5
グレープフルーツ	グレープフルーツ	0.05	○ 0.05	0.9	9
	きんかん	0.05	○ 0.05	0.1	1
その他のかんきつ類果実	ぽんかん	0.05	○ 0.05	0.5	5
	ゆず	0.05	○ 0.05	0.1	1
	すだち	0.05	○ 0.05	0.1	1
りんご	りんご	0.1	○ 0.08	1.1	10
	りんご果汁	0.1	○ 0.05	0.5	5
日本なし	日本なし	0.1	○ 0.08	1.2	10
西洋なし	西洋なし	0.1	○ 0.08	1.1	10
びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	びわ	0.1	○ 0.08	0.6	6
もも(果皮及び種子を含む。)	もも	0.2	○ 0.08	1.1	10
すもも(ブルーンを含む。)	ブルーン	0.2	○ 0.08	0.5	5
うめ	うめ	0.2	○ 0.08	0.1	1
おうとう(チェリーを含む。)	おうとう	0.3	0.3	0.7	7
いちご	いちご	0.3	0.3	1.1	10
ブルーベリー	ブルーベリー	0.1	○ 0.06	0.1	1
ぶどう	ぶどう	0.2	○ 0.12	1.6	20
かき	かき	0.1	○ 0.08	1.1	10
バナナ	バナナ	0.2	○ 0.13	1.5	20
キウイ(果皮を含む。)	キウイ	0.6	○ 0.37	2.1	20
アボカド	アボカド	0.1	○ 0.05	0.4	4
パイナップル	パイナップル	0.1	○ 0.05	0.7	7
マンゴー	マンゴー	0.1	○ 0.05	0.7	7
その他の果実	いちじく	0.2	○ 0.08	0.6	6
ごまの種子	ごまの種子	0.1	○ 0.021	0.0	0
ぎんなん	ぎんなん	0.1	○ 0.05	0.0	0
くり	くり	0.1	○ 0.05	0.1	1
アーモンド	アーモンド	0.1	○ 0.05	0.0	0
くるみ	くるみ	0.1	○ 0.05	0.0	0
茶	緑茶類	0.3	○ 0.045	0.0	0
ホップ	ホップ	0.9	○ 0.255	0.0	0
はちみつ	はちみつ	0.05	0.05	0.0	0

ESTI : 短期推定摂取量 (Estimated Short-Term Intake)

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁(値が100を超える場合は有効数字2桁)とし四捨五入して算出した。

○ : 作物残留試験における最高残留濃度(HR)又は中央値(STMR)を用いて短期摂取量を推計した。

○を付していない食品については、基準値案の値又は暴露評価対象物質の残留濃度から推定される基準値に相当する値を使用した。

国際基準を参照したものについては、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用いてESTI試算をした。

茶については、浸出液(茶葉当たりの残留濃度)における作物残留試験結果を用いて試算をした。

グルホシネートの推定摂取量 (短期) : 幼小児(1~6歳)

食品名 (基準値設定対象)	食品名 (ESTI推定対象)	基準値案 (ppm)	評価に用いた 数値 (ppm)	ESTI (μ g/kg体重)	ESTI/ARfD (%)
米(玄米をいう。)	米	0.2	○ 0.045	0.5	5
小麦	小麦	0.04	○ 0.021	0.1	1
大麦	大麦	0.5	○ 0.14	0.1	1
	麦茶	0.5	○ 0.14	0.2	2
とうもろこし	スイートコーン	0.1	○ 0.05	1.2	10
大豆	大豆	2	○ 0.32	0.4	4
らっかせい	らっかせい	0.1	○ 0.021	0.0	0
ばれいしょ	ばれいしょ	0.1	○ 0.05	1.1	10
さといも類 (やつがしらを含む。)	さといも	0.1	0.1	1.3	10
かんしょ	かんしょ	0.04	○ 0.03	0.8	8
やまいも (長いもをいう。)	やまいも	0.2	0.2	2.7	30
だいこん類 (ラディッシュを含む。) の根	だいこんの根	0.3	0.3	6.6	70
はくさい	はくさい	0.03	○ 0.021	0.3	3
キャベツ	キャベツ	0.03	○ 0.021	0.3	3
ブロッコリー	ブロッコリー	0.03	○ 0.021	0.3	3
ごぼう	ごぼう	0.2	0.2	1.3	10
レタス (サラダ菜及びちしやを含む。)	レタス類	0.4	○ 0.29	2.8	30
	非結球レタス類	0.4	○ 0.29	4.0	40
	レタス	0.4	○ 0.29	2.6	30
たまねぎ	たまねぎ	0.1	○ 0.089	1.6	20
ねぎ (リーキを含む。)	ねぎ	0.1	○ 0.089	0.6	6
にんにく	にんにく	0.1	○ 0.089	0.1	1
にら	にら	0.1	0.1	0.2	2
にんじん	にんじん	0.1	0.1	1.0	10
パセリ	パセリ (生)	0.7	0.7	0.1	1
トマト	トマト	0.03	○ 0.021	0.6	6
ピーマン	ピーマン	0.03	○ 0.021	0.1	1
なす	なす	0.03	○ 0.021	0.3	3
きゅうり (ガーキンを含む。)	きゅうり	0.03	○ 0.021	0.3	3
かぼちゃ (スカッシュを含む。)	かぼちゃ	0.2	0.2	3.2	30
すいか	すいか	0.1	0.1	8.7	90
メロン類果実	メロン	0.3	0.3	8.8	90
ほうれんそう	ほうれんそう	0.03	○ 0.021	0.2	2
たけのこ	たけのこ	0.2	0.2	1.7	20
しようが	しようが	0.3	0.3	0.4	4
未成熟えんどう	未成熟えんどう (さや)	0.03	○ 0.021	0.0	0
	未成熟えんどう (豆)	0.03	○ 0.021	0.0	0
未成熟いんげん	未成熟いんげん	0.05	○ 0.05	0.2	2
えだまめ	えだまめ	0.1	0.1	0.3	3
その他の野菜	もやし	0.3	0.3	1.3	10
	れんこん	0.3	0.3	3.1	30
みかん (外果皮を含む。)	みかん	0.05	○ 0.05	1.4	10
オレンジ (ネーブルオレンジを含む。)	オレンジ	0.05	○ 0.05	1.3	10
	オレンジ果汁	0.05	○ 0.05	0.9	9
	りんご	0.1	○ 0.08	2.6	30
りんご果汁	りんご果汁	0.1	○ 0.05	1.7	20
日本なし	日本なし	0.1	○ 0.08	2.3	20
もも (果皮及び種子を含む。)	もも	0.2	○ 0.08	3.4	30
うめ	うめ	0.2	○ 0.08	0.3	3
いちご	いちご	0.3	0.3	3.2	30
ぶどう	ぶどう	0.2	○ 0.12	3.7	40
かき	かき	0.1	○ 0.08	1.7	20
バナナ	バナナ	0.2	○ 0.13	5.0	50
パイナップル	パイナップル	0.1	○ 0.05	1.6	20
ごまの種子	ごまの種子	0.1	○ 0.021	0.0	0

グルホシネットの推定摂取量 (短期) : 幼小児(1~6歳)

食品名 (基準値設定対象)	食品名 (ESTI推定対象)	基準値案 (ppm)	評価に用いた 数値 (ppm)	ESTI (μ g/kg体重)	ESTI/ARfD (%)
茶	緑茶類	0.3	○ 0.045	0.0	0
はちみつ	はちみつ	0.05	0.05	0.1	1

ESTI : 短期推定摂取量 (Estimated Short-Term Intake)

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○ : 作物残留試験における最高残留濃度 (HR) 又は中央値 (STMR) を用いて短期摂取量を推計した。

○を付していない食品については、基準値案の値又は暴露評価対象物質の残留濃度から推定される基準値に相当する値を使用した。

国際基準を参照したものについては、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用いてESTI試算をした。

茶については、浸出液（茶葉当たりの残留濃度）における作物残留試験結果を用いて試算をした。

(参考)

これまでの経緯

昭和 59 年 6 月 14 日	初回農薬登録（グルホシネート）
平成 17 年 11 月 29 日	残留基準告示
平成 19 年 6 月 21 日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（新規：かんきつ類、トマト等（グルホシネート P））
平成 19 年 7 月 13 日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成 21 年 5 月 12 日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：そば、ごぼう等（グルホシネート））
平成 22 年 2 月 25 日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成 22 年 9 月 14 日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成 23 年 3 月 15 日	残留基準告示
平成 23 年 10 月 13 日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：みつば及びたけのこ（グルホシネート）、ホップ（グルホシネート P））
平成 23 年 11 月 15 日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成 24 年 3 月 8 日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成 24 年 3 月 19 日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成 24 年 6 月 7 日	残留基準告示
平成 25 年 3 月 19 日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：ぎぼうし（グルホシネート P））
平成 25 年 6 月 11 日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成 25 年 7 月 29 日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成 25 年 11 月 29 日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成 26 年 10 月 3 日	残留基準告示
令和 3 年 7 月 28 日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基

		準値設定依頼（適用拡大：さとうきび（グルホシネートP））
令和 3年 8月 25日		厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
令和 4年 3月 8日		食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
令和 4年 6月 15日		薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
令和 4年 9月 1日		農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：ごま（グルホシネートP））
令和 4年 11月 24日		厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
令和 5年 2月 1日		食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
令和 5年 2月 10日		薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
令和 5年 10月 18日		残留基準告示
令和 5年 2月 2日		インポートトレランス申請（綿実及びホップ（グルホシネート））
令和 5年 3月 30日		農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：小麦、ばれいしょ等（グルホシネート））
令和 6年 4月 11日		農林水産省から消費者庁へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：鱗茎類（にらを除く）及びひまわり（種子））（グルホシネート）
令和 6年 6月 12日		内閣総理大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
令和 7年 2月 6日		食品安全委員会委員長から内閣総理大臣あてに食品健康影響評価について通知
令和 7年 6月 27日		食品衛生基準審議会へ諮問
令和 7年 11月 28日		食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会

● 食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

大山	和俊	一般財団法人残留農薬研究所業務執行理事・化学部長
○折戸	謙介	学校法人麻布獸医学園理事（兼）麻布大学獸医学部教授
加藤	くみ子	北里大学薬学部教授
近藤	麻子	日本生活協同組合連合会組織推進本部本部長
須恵	雅之	東京農業大学応用生物科学部教授
瀧本	秀美	国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事
田口	貴章	国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長
◎堤	智昭	国立医薬品食品衛生研究所食品部長
中島	美紀	金沢大学ナノ生命科学研究所（薬学系兼任）教授
野田	隆志	一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問

(◎：部会長、○：部会長代理)

答申（案）

グルホシネットについては、以下のとおり食品中の農薬の残留基準を設定することが適当である。

グルホシネット

今回残留基準を設定する「グルホシネット」の規制対象は、グルホシネット（代謝物Z【N-アセチルグルホシネット】を含む。）及び代謝物B【3-メチルホスフィニコプロピオン酸】とする。ただし、代謝物Bは、グルホシネットの濃度に換算するものとする。

食品名	残留基準値 ppm
米（玄米をいう。）	0.2
小麦	0.04
大麦	0.5
とうもろこし	0.1
そば	0.3
大豆	2
小豆類 ^{注1)}	0.2
えんどう	0.2
そら豆	0.2
らっかせい	0.1
その他の豆類 ^{注2)}	0.2
ばれいしょ	0.1
さといも類（やつがしらを含む。）	0.1
かんしょ	0.04
やまいも（長いもをいう。）	0.2
こんにゃくいも	0.2
てんさい	2
さとうきび	0.03
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	0.3
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	0.3
かぶ類の根	0.1
かぶ類の葉	0.1
はくさい	0.03
キャベツ	0.03
ブロッコリー	0.03
その他のあぶらな科野菜 ^{注3)}	0.2

食品名	残留基準値 ppm
ごぼう	0.2
レタス (サラダ菜及びちしやを含む。)	0.4
その他のきく科野菜 ^{注4)}	0.5
たまねぎ	0.1
ねぎ (リーキを含む。)	0.1
にんにく	0.1
にら	0.1
アスパラガス	0.4
わけぎ	0.1
その他のゆり科野菜 ^{注5)}	0.1
にんじん	0.1
パセリ	0.7
セロリ	0.04
みつば	0.1
その他のせり科野菜 ^{注6)}	0.1
トマト	0.03
ピーマン	0.03
なす	0.03
その他のなす科野菜 ^{注7)}	0.1
きゅうり (ガーキンを含む。)	0.03
かぼちゃ (スカッシュを含む。)	0.2
しろうり	0.3
すいか	0.1
メロン類果実	0.3
その他のうり科野菜 ^{注8)}	0.1
ほうれんそう	0.03
たけのこ	0.2
オクラ	0.1
しょうが	0.3
未成熟えんどう	0.03
未成熟いんげん	0.05
えだまめ	0.1
その他の野菜 ^{注9)}	0.3

食品名	残留基準値 ppm
みかん (外果皮を含む。)	0.05
なつみかんの果実全体	0.05
レモン	0.05
オレンジ (ネーブルオレンジを含む。)	0.05
グレープフルーツ	0.05
ライム	0.05
その他のかんきつ類果実 ^{注10)}	0.05
りんご	0.1
日本なし	0.1
西洋なし	0.1
マルメロ	0.1
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.1
もも (果皮及び種子を含む。)	0.2
ネクタリン	0.2
あんず (アプリコットを含む。)	0.2
すもも (プルーンを含む。)	0.2
うめ	0.2
おうとう (チェリーを含む。)	0.3
いちご	0.3
ラズベリー	0.1
ブラックベリー	0.01
ブルーベリー	0.1
クランベリー	0.01
ハックルベリー	0.1
その他ベリー類果実 ^{注11)}	1
ぶどう	0.2
かき	0.1
バナナ	0.2
キウイ (果皮を含む。)	0.6
パパイヤ	0.1
アボカド	0.1
パイナップル	0.1
グアバ	0.1
マンゴー	0.1
パッションフルーツ	0.1
なつめやし	0.1
その他果実 ^{注12)}	0.2

食品名	残留基準値 ppm
ひまわりの種子	0.05
ごまの種子	0.1
綿実	15
なたね	2
ぎんなん	0.1
くり	0.1
ペカン	0.1
アーモンド	0.1
くるみ	0.1
その他のナッツ類 ^{注13)}	0.1
茶	0.3
コーヒー豆	0.1
ホップ	0.9
その他のスパイス ^{注14)}	0.5
その他のハーブ ^{注15)}	0.5
牛の筋肉	0.2
豚の筋肉	0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物 ^{注16)} の筋肉	0.2
牛の脂肪	0.4
豚の脂肪	0.4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4
牛の肝臓	6
豚の肝臓	6
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	6
牛の腎臓	6
豚の腎臓	6
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	6
牛の食用部分 ^{注17)}	6
豚の食用部分	6
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	6
乳	0.2
鶏の筋肉	0.2
その他の家きん ^{注18)} の筋肉	0.2
鶏の脂肪	0.2
その他の家きんの脂肪	0.2
鶏の肝臓	0.6
その他の家きんの肝臓	0.6

食品名	残留基準値 ppm
鶏の腎臓	0.6
その他の家きんの腎臓	0.6
鶏の食用部分	0.6
その他の家きんの食用部分	0.6
鶏の卵	0.2
その他の家きんの卵	0.2
はちみつ	0.05

注1) 「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。

注2) 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。

注3) 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類（ラディッシュを含む。）の根、だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

注4) 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）及びハーブ以外のものをいう。

注5) 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ（リーキを含む。）、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

注6) 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スペイス及びハーブ以外のものをいう。

注7) 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

注8) 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり（ガーキンを含む。）、かぼちゃ（スカッシュを含む。）、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

注9) 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スペイス及びハーブ以外のものをいう。

注10) 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、グレープフルーツ、ライム及びスペイス以外のものをいう。

注11) 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

注12) 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず（アプリコットを含む。）、すもも（ブルーンを含む。）、うめ、おうとう（チェリーを含む。）、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パパイヤ、アボカド、パインアップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスペイス以外のものをいう。

注13) 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

注14) 「その他のスペイス」とは、スペイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しうが、レモンの果皮、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

注15) 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

注16) 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

注17) 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

注18) 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

農薬評価書

グルホシネート (第6版)

令和7年(2025年)2月

食品安全委員会

目 次

	頁
○ 審議の経緯.....	ii
○ 食品安全委員会委員名簿.....	iv
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	v
○ 食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿.....	vi
○ 総合評価.....	viii
(1) グルホシネート(ラセミ体)の評価の要約.....	viii
(2) グルホシネートP(光学異性体のS体)の評価の要約.....	viii
(3) 総合評価.....	ix
○ 第一部 グルホシネート評価書.....	1-1
○ 第二部 グルホシネートP評価書.....	2-1

＜審議の経緯＞

－第1版関係－

1984年 6月 14日 初回農薬登録（グルホシネート）

2005年 11月 29日 残留農薬基準告示

2007年 6月 21日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼〔新規（グルホシネートP）：かんきつ、なす、トマト等〕

2007年 7月 13日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0713006号）

2007年 7月 17日 関係書類の接受

2007年 7月 19日 第199回食品安全委員会（要請事項説明）

2008年 3月 25日 第13回農薬専門調査会確認評価第三部会

2008年 9月 1日 追加資料受理

2008年 12月 12日 第18回農薬専門調査会確認評価第二部会

2009年 5月 12日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼〔適用拡大（グルホシネート）：そば、ごぼう等〕

2009年 5月 25日 追加資料受理

2009年 6月 30日 第24回農薬専門調査会確認評価第二部会

2009年 8月 21日 第54回農薬専門調査会幹事会

2009年 9月 17日 第302回食品安全委員会（報告）

2009年 9月 17日 から10月16日まで 国民からの意見・情報の募集

2009年 11月 13日 第57回農薬専門調査会幹事会

2010年 2月 12日 第60回農薬専門調査会幹事会

2010年 2月 23日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2010年 2月 25日 第321回食品安全委員会

2010年 2月 25日 厚生労働大臣へ通知

2011年 3月 15日 残留農薬基準告示

－第2版関係－

2011年 1月 14日 農林水産大臣から飼料中の残留基準値設定に係る食品健康影響評価について要請（22消安第7912号）

2011年 1月 17日 関係書類の接受

2011年 1月 20日 第363回食品安全委員会（要請事項説明）

2011年 10月 13日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼〔適用拡大（グルホシネート）：みつば及びたけのこ、適用拡大（グルホシネートP）：ホップ〕

2011年 11月 15日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に

について要請（厚生労働省発食安 1115 第 2 号）

2011年 11月 18日 関係書類の接受

2011年 11月 24日 第 408 回食品安全委員会（要請事項説明）

2012年 3月 2日 第 81 回農薬専門調査会幹事会

2012年 3月 6日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2012年 3月 8日 第 422 回食品安全委員会（報告）
(同日付け農林水産大臣及び厚生労働大臣へ通知)

2012年 6月 7日 残留農薬基準告示

—第 3 版関係—

2013年 3月 19日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼 [適用拡大（グルホシネット P）：ぎぼうし]

2013年 6月 11日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0611 第 3 号）

2013年 6月 12日 関係書類の接受

2013年 6月 17日 第 478 回食品安全委員会（要請事項説明）

2013年 7月 29日 第 483 回食品安全委員会（審議）
(同日付け厚生労働大臣へ通知)

2014年 10月 3日 残留農薬基準告示

—第 4 版関係—

2021年 7月 28日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼 [適用拡大（グルホシネット P）：さとうきび]

2021年 8月 25日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食 0825 第 3 号）、関係書類の接受

2021年 8月 31日 第 830 回食品安全委員会（要請事項説明）

2021年 10月 13日 第 13 回農薬第二専門調査会

2021年 11月 8日 第 14 回農薬第二専門調査会

2021年 12月 6日 第 15 回農薬第二専門調査会

2022年 1月 18日 第 844 回食品安全委員会（報告）

2022年 1月 19日 から 2 月 17 日まで 国民からの意見・情報の募集

2022年 2月 28日 農薬第二専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2022年 3月 8日 第 850 回食品安全委員会（報告）
(3 月 9 日付け厚生労働大臣へ通知)

2023年 10月 18日 残留農薬基準告示

－第5版関係－

2022年 9月 1日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼〔適用拡大（グルホシネットP）：ごま〕

2022年 11月 24日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食1124第1号）、関係書類の接受

2022年 11月 29日 第880回食品安全委員会（要請事項説明）

2023年 1月 31日 第887回食品安全委員会（審議）
(2月1日付け厚生労働大臣へ通知)

2023年 10月 18日 残留農薬基準告示

－第6版関係－

2023年 2月 2日 インポートトレランス設定の要請（グルホシネット：綿実及びホップ）

2023年 3月 30日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼〔新規（グルホシネット）：小麦、ばれいしょ等〕

2024年 4月 11日 農林水産省から消費者庁へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼〔適用拡大（グルホシネット）：鱗茎類（にらを除く）及びひまわり（種子）〕

2024年 6月 12日 内閣総理大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請、関係書類の接受

2024年 6月 18日 第943回食品安全委員会（要請事項説明）

2024年 10月 21日 第34回農薬第二専門調査会

2024年 11月 18日 第35回農薬第二専門調査会

2025年 1月 27日 農薬第二専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2025年 2月 4日 第971回食品安全委員会（報告）
(2月6日付け内閣総理大臣へ通知)

＜食品安全委員会委員名簿＞

(2009年6月30日まで)	(2011年1月6日まで)	(2012年6月30日まで)
見上 彪（委員長）	小泉直子（委員長）	小泉直子（委員長）
小泉直子（委員長代理*）	見上 彪（委員長代理*）	熊谷 進（委員長代理*）
長尾 拓	長尾 拓	長尾 拓
野村一正	野村一正	野村一正
畠江敬子	畠江敬子	畠江敬子
廣瀬雅雄**	廣瀬雅雄	廣瀬雅雄

本間清一

* : 2007 年 2 月 1 日から

** : 2007 年 4 月 1 日から

村田容常

* : 2009 年 7 月 9 日から

村田容常

* : 2011 年 1 月 13 日から

(2015 年 6 月 30 日まで)

熊谷 進 (委員長)

佐藤 洋 (委員長代理)

山添 康 (委員長代理)

三森国敏 (委員長代理)

石井克枝

上安平冽子

村田容常

(2024 年 6 月 30 日まで)

山本茂貴 (委員長)

浅野 哲 (委員長代理 第一順位)

川西 徹 (委員長代理 第二順位)

脇 昌子 (委員長代理 第三順位)

香西みどり

松永 和紀

吉田 充

(2024 年 7 月 1 日から)

山本茂貴 (委員長)

浅野 哲 (委員長代理 第一順位)

祖父江友孝 (委員長代理 第二順位)

頭金正博 (委員長代理 第三順位)

小島登貴子

杉山久仁子

松永和紀

＜食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿＞

(2008 年 3 月 31 日まで)

鈴木勝士 (座長)

林 真 (座長代理*)

赤池昭紀

石井康雄

泉 啓介

上路雅子

臼井健二

江馬 真

大澤貫寿

太田敏博

大谷 浩

小澤正吾

小林裕子

三枝順三

佐々木有

代田眞理子****

高木篤也

玉井郁巳

田村廣人

津田修治

津田洋幸

出川雅邦

長尾哲二

中澤憲一

納屋聖人

成瀬一郎***

西川秋佳**

布柴達男

根岸友惠

平塚 明

藤本成明

細川正清

松本清司

柳井徳磨

山崎浩史

山手丈至

與語靖洋

吉田 緑

若栗 忍

* : 2007 年 4 月 11 日から

** : 2007 年 4 月 25 日から

*** : 2007 年 6 月 30 日まで

**** : 2007 年 7 月 1 日から

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士（座長）	佐々木有	平塚 明
林 真（座長代理）	代田眞理子	藤本成明
相磯成敏	高木篤也	細川正清
赤池昭紀	玉井郁巳	堀本政夫
石井康雄	田村廣人	松本清司
泉 啓介	津田修治	本間正充
今井田克己	津田洋幸	柳井徳磨
上路雅子	長尾哲二	山崎浩史
臼井健二	中澤憲一*	山手丈至
太田敏博	永田 清	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	義澤克彦**
小澤正吾	西川秋佳	吉田 緑
川合是彰	布柴達男	若栗 忍
小林裕子	根岸友惠	
三枝順三***	根本信雄	

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

(2012年3月31日まで)

納屋聖人（座長）	佐々木有	平塚 明
林 真（座長代理）	代田眞理子	福井義浩
相磯成敏	高木篤也	藤本成明
赤池昭紀	玉井郁巳	細川正清
浅野 哲**	田村廣人	堀本政夫
石井康雄	津田修治	本間正充
泉 啓介	津田洋幸	増村健一**
上路雅子	長尾哲二	松本清司
臼井健二	永田 清	柳井徳磨
太田敏博	長野嘉介*	山崎浩史
小澤正吾	西川秋佳	山手丈至
川合是彰	布柴達男	與語靖洋
川口博明	根岸友惠	義澤克彦
棄形麻樹子***	根本信雄	吉田 緑
小林裕子	八田稔久	若栗 忍
三枝順三		

* : 2011年3月1日まで

** : 2011年3月1日から

*** : 2011年6月23日から

＜食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿＞

(2022年3月31日まで)

浅野 哲* (座長)
赤池昭紀 (座長**)
平塚 明 (座長代理)
稻見圭子
佐藤順子***

篠原厚子
清家伸康
田中徹也
豊田武士
中塚敏夫

野村崇人
藤本成明
森田 健
* : 2021 年 6 月 30 日まで
** : 2021 年 7 月 5 日から
*** : 2021 年 8 月 4 日から

(2024 年 4 月 1 日から)

堀本政夫 (座長)
義澤克彦 (座長代理)
安部賀央里
稻見圭子

金田勝幸
佐藤順子
田中徹也
野村崇人

藤本成明
安彦行人
山折 大

<第 13 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

久米利明 (農薬第五専門調査会専門委員)
堀本政夫 (元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授)

<第 14 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

久米利明 (農薬第五専門調査会専門委員)
堀本政夫 (元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授)

<第 15 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

久米利明 (農薬第五専門調査会専門委員)
堀本政夫 (元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授)

<第 34 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

篠原厚子 (清泉女子大学人文科学研究所教授)
清家伸康 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門グループ長)
平塚 明 (東京薬科大学名誉教授)
森田 健 (独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター上席技術専門官)

<第 35 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

篠原厚子 (清泉女子大学人文科学研究所教授)
清家伸康 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門グループ長)
平塚 明 (東京薬科大学名誉教授)
森田 健 (独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター上席技術専門官)

総合評価

アミノ酸系除草剤である「グルホシネート」には光学異性体（*R*体及び*S*体）が存在し、ラセミ体であるグルホシネートと活性本体である*S*体を選択的に含有するグルホシネートPがある。このため、同一の物として合わせて評価できないことから、個別に評価した上で、これらが使用される実場面を考慮して総合評価を実施した。なお、グルホシネート及びグルホシネートPの個別の評価については、それぞれ第一部及び第二部に示されている。

（1）グルホシネート（ラセミ体）の評価の要約

アミノ酸系除草剤である「グルホシネート」（CAS No. 77182-82-2）について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。第6版の改訂に当たっては、消費者庁から作物残留試験（国内：小麦、たまねぎ等、海外：綿実及びホップ）、90日間亜急性神経毒性試験（ラット）、発生毒性試験（ラット及びウサギ）の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、植物代謝（レタス、りんご等）、作物残留、家畜代謝試験（ヤギ及びニワトリ）、畜産物残留、動物体内動態（ラット及びイヌ）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（ラット及びマウス）、急性神経毒性（ラット）、亜急性神経毒性（ラット）、発達神経毒性（ラット）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性、免疫毒性（ラット）等である。

各種毒性試験結果から、グルホシネート投与による影響は、主に中枢神経系（鎮静、円背位、自発運動亢進等）、腎臓（重量増加等）及び血液（貧血等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認められなかつた。

各種試験結果から、農産物及び畜産物中のばく露評価対象物質をグルホシネート並びに代謝物B及びZと設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験の1.9 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.019 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、グルホシネートの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験②の無毒性量5 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.05 mg/kg 体重を急性参考用量（ARfD）と設定した。

（2）グルホシネートP（光学異性体の*S*体）の評価の要約

アミノ酸系除草剤である「グルホシネートP」（CAS No. 70033-13-5）について、

各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に用いた試験成績は、植物代謝（水稻、キャベツ等）、作物残留、動物体内動態（ラット）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（ラット及びイヌ）、発がん性（ラット及びマウス）、亜急性神経毒性（ラット）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等である。

各種毒性試験結果から、グルホシネートP投与による影響は、主に腎臓（重量増加等）及び中枢神経系（大脳の神経網空胞化等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物中のばく露評価対象物質をグルホシネートP及び代謝物Bと設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた2世代繁殖試験の0.91 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.0091 mg/kg 体重/日をADIと設定した。

また、グルホシネートPの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験の1 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.01 mg/kg 体重をARfDと設定した。

（3）総合評価

グルホシネート及びグルホシネートPの農薬としての活性成分は光学異性体のS体であるが、両者の毒性試験の比較から動物における毒性発現も主にS体によるものと推察できる。食品安全委員会は、両者の総合的な評価として、S体を選択的に含有し、毒性も強く現れるグルホシネートPに基づく評価を適用するのが適当であると判断し、グルホシネートPで設定したADI及びARfDをグルホシネートのADI及びARfDと設定した。

ばく露評価対象物質については、各種試験結果から、グルホシネート（R体及びS体）並びに代謝物B及びZと設定した。

ADI	0.0091 mg/kg 体重/日
（ADI 設定根拠資料）	繁殖試験（グルホシネートP）
（動物種）	ラット
（期間）	2世代
（投与方法）	混餌
（無毒性量）	0.91 mg/kg 体重/日
（安全係数）	100

ARfD	0.01 mg/kg 体重
（ARfD 設定根拠資料）	発生毒性試験（グルホシネートP）

(動物種)	ウサギ
(期間)	妊娠 6~27 日
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ばく露量については、本評価結果を踏まえた報告を求め、確認することとする。

第一部
農薬評価書

グルホシネート
(第6版)

令和7年(2025年)2月
食品安全委員会

目 次

	頁
○ 審議の経緯.....	5
○ 食品安全委員会委員名簿.....	7
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	8
○ 食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿.....	9
○ 要 約.....	11
 I. 評価対象農薬の概要.....	12
1. 用途.....	12
2. 有効成分の一般名.....	12
3. 化学名.....	12
4. 分子式.....	12
5. 分子量.....	12
6. 構造式.....	12
7. 物理的化学的性状.....	12
8. 開発の経緯.....	13
 II. 安全性に係る試験の概要.....	14
1. 土壤中動態試験.....	14
(1) 好気的湛水土壤中動態試験	14
(2) 好気的土壤中動態試験	14
(3) 土壤吸着試験	15
2. 水中動態試験.....	15
(1) 加水分解試験①	15
(2) 加水分解試験②	15
(3) 水中光分解試験① (緩衝液及び自然水)	15
(4) 水中光分解試験② (緩衝液)	16
3. 土壤残留試験.....	16
4. 植物、家畜等における代謝及び残留試験.....	17
(1) 植物代謝試験	17
(2) 作物残留試験	24
(3) 家畜代謝試験	25
(4) 畜産物残留試験	27
5. 動物体内動態試験.....	29
(1) ラット①	29
(2) ラット②	33
(3) ラット③	33

（4）イヌ	37
6. 急性毒性試験等	40
（1）急性毒性試験（経口投与）	40
（2）一般薬理試験	42
7. 亜急性毒性試験	44
（1）90日間亜急性毒性試験（ラット）①	44
（2）90日間亜急性毒性試験（ラット）②	45
（3）90日間亜急性毒性試験（ラット）③	46
（4）28日間亜急性毒性試験（ラット）<参考資料>	47
（5）14週間亜急性毒性試験（ラット、S ³ 体）<参考資料>	48
（6）90日間亜急性毒性試験（マウス）①	48
（7）90日間亜急性毒性試験（マウス）②	48
（8）90日間亜急性毒性試験（マウス）③	49
（9）28日間亜急性毒性試験（マウス）<参考資料>	50
（10）90日間亜急性毒性試験（イヌ）①	51
（11）90日間亜急性毒性試験（イヌ）②	51
（12）28日間亜急性毒性試験（イヌ）<参考資料>	52
（13）90日間亜急性毒性試験（イヌ、S ³ 体 ⁷ ）<参考資料>	52
8. 慢性毒性試験及び発がん性試験	52
（1）1年間慢性毒性試験（イヌ）①	52
（2）1年間慢性毒性試験（イヌ）②	53
（3）2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	53
（4）2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	54
（5）2年間発がん性試験（ラット）	55
（6）18か月間発がん性試験（マウス）	56
（7）2年間発がん性試験（マウス）	56
9. 神経毒性試験	57
（1）急性神経毒性試験（ラット）（FOB観察）	57
（2）急性神経毒性試験（ラット）（水迷路試験）	58
（3）急性神経毒性試験（ラット）	58
（4）5週間亜急性神経毒性試験（ラット）	59
（5）90日間亜急性神経毒性試験（ラット）	60
（6）急性遅発性神経毒性試験	60
（7）発達神経毒性試験（ラット）	61
10. 生殖発生毒性試験	61
（1）2世代繁殖試験（ラット）①	61
（2）2世代繁殖試験（ラット）②	62
（3）発生毒性試験（ラット）①	63

(4) 発生毒性試験（ラット）②	63
(5) 発生毒性試験（ラット）③	63
(6) 発生毒性試験（ラット）④	64
(7) 発生毒性試験（ウサギ）①	64
(8) 発生毒性試験（ウサギ）②	64
11. 遺伝毒性試験	65
12. 経皮投与、吸入ばく露等試験	67
(1) 急性毒性試験（腹腔内投与、皮下投与、経皮投与及び吸入ばく露）	67
(2) 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	68
(3) 29日間亜急性経皮毒性試験（ラット）	68
(4) 28日間亜急性吸入毒性試験（ラット）①	69
(5) 28日間亜急性吸入毒性試験（ラット）②	69
13. その他の試験	70
(1) 28日間強制経口投与毒性及びメカニズム試験（イヌ）	70
(2) ラットにおける単回脳室内/静脈内投与後の脳内カテコールアミン及びグルタミン合成酵素測定（原体及び代謝物B）	70
(3) ラットにおける単回経口投与後の各臓器におけるグルタミン合成酵素活性、グルタミン酸及びアンモニア濃度測定	71
(4) ラット及びマウスにおける単回経口投与後の各臓器におけるグルタミン合成酵素活性、アンモニア濃度、グルタミン酸及びグルタミン濃度測定	71
(5) ラットにおける4週間混餌投与メカニズム試験	72
(6) 原体の各種神経伝達物質受容体との <i>in vitro</i> 結合実験	73
(7) ミトコンドリア画分における酸化的リン酸化に対する影響	73
(8) AST、ALT、GGT及びGLDH活性に対する影響	73
(9) 原体及び代謝物Zの90日間混餌投与後のグルタミン合成酵素活性測定（ラット）	73
(10) グルタミン合成酵素活性阻害試験（ラット）	74
(11) 単回経口投与による血清中グルタミン濃度への影響検討試験（ラット） ..	74
(12) 28日間免疫毒性試験（ラット）	75
III. 安全性に係る試験の概要（代謝物）	76
1. 動物体内動態試験（経口投与、代謝物B及びZ）	76
(1) ラット（代謝物B：植物体における主要代謝物）	76
(2) ラット（代謝物Z：遺伝子組換え作物における主要代謝物）	76
2. 急性毒性試験等	80
(1) 急性毒性試験（経口投与及び腹腔内投与、代謝物B、F及びZ）	80
(2) 皮膚感作性試験（代謝物B及びZ）	81
3. 亜急性毒性試験	81

(1) 28日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物B）	81
(2) 90日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物B）	82
(3) 90日間亜急性毒性試験（マウス、代謝物B）	82
(4) 90日間亜急性毒性試験（イヌ、代謝物B）	83
(5) 90日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物F）	83
(6) 90日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物Z）	84
(7) 90日間亜急性毒性試験（マウス、代謝物Z）	84
(8) 90日間亜急性毒性試験（イヌ、代謝物Z）	85
4. 慢性毒性試験及び発がん性試験	85
(1) 1年間慢性毒性試験（イヌ、代謝物Z）	85
(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット、代謝物Z）	86
(3) 2年間発がん性試験（マウス、代謝物Z）	86
5. 神経毒性試験	87
(1) 急性神経毒性試験（ラット、代謝物Z）（FOB観察）	87
(2) 急性神経毒性試験（ラット、代謝物Z）（水迷路試験）	87
(3) 5週間亜急性神経毒性試験（ラット、代謝物Z）	87
6. 生殖発生毒性試験	88
(1) 2世代繁殖試験（ラット、代謝物Z）	88
(2) 発生毒性試験（ラット、代謝物B）	88
(3) 発生毒性試験（ウサギ、代謝物B）	89
(4) 発生毒性試験（ラット、代謝物Z）	89
(5) 発生毒性試験（ウサギ、代謝物Z）	89
7. 遺伝毒性試験（代謝物B、F及びZ）	90
IV. 食品健康影響評価	92
・別紙1：代謝物/分解物略称	109
・別紙2：検査値等略称	110
・別紙3：作物残留試験成績（国内）	111
・別紙4：作物残留試験成績（海外）	136
・別紙5：畜産物残留試験成績	142
・参照	148

＜審議の経緯＞

－第1版関係－

1984年 6月 14日 初回農薬登録

2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照1）

2007年 7月 13日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0713006号）

2007年 7月 17日 関係書類の接受（参照3～18）

2007年 7月 19日 第199回食品安全委員会（要請事項説明）

2008年 12月 12日 第18回農薬専門調査会確認評価第二部会

2009年 5月 12日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：そば、ごぼう等）

2009年 5月 25日 追加資料受理（参照2）

2009年 6月 30日 第24回農薬専門調査会確認評価第二部会

2009年 8月 21日 第54回農薬専門調査会幹事会

2009年 9月 17日 第302回食品安全委員会（報告）

2009年 9月 17日 から10月16日まで 国民からの意見・情報の募集

2009年 11月 13日 第57回農薬専門調査会幹事会

2010年 2月 12日 第60回農薬専門調査会幹事会

2010年 2月 23日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2010年 2月 25日 第321回食品安全委員会（報告）

2010年 2月 25日 厚生労働大臣へ通知（参照19）

2011年 3月 15日 残留農薬基準告示（参照20）

－第2版関係－

2011年 1月 14日 農林水産大臣から飼料中の残留基準値設定に係る食品健康影響評価について要請（22消安第7912号）

2011年 1月 17日 関係書類の接受（参照21、22）

2011年 1月 20日 第363回食品安全委員会（要請事項説明）

2011年 10月 13日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：みつば及びたけのこ）

2011年 11月 15日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安1115第2号）

2011年 11月 18日 関係書類の接受（参照23～25）

2011年 11月 24日 第408回食品安全委員会（要請事項説明）

2012年 3月 2日 第81回農薬専門調査会幹事会

2012年 3月 6日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2012年 3月 8日 第422回食品安全委員会（報告）
(同日付け農林水産大臣及び厚生労働大臣へ通知)（参照

26、27)

2012年 6月 7日 残留農薬基準告示（参照 28）

—第3版関係—

2013年 6月 11日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0611 第3号）
2013年 6月 12日 関係書類の接受（参照 29）
2013年 6月 17日 第478回食品安全委員会（要請事項説明）
2013年 7月 29日 第483回食品安全委員会（審議）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 30）
2014年 10月 3日 残留農薬基準告示（参照 31）

—第4版関係—

2021年 8月 25日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食 0825 第3号）、関係書類の接受（参照 32～43）
2021年 8月 31日 第830回食品安全委員会（要請事項説明）
2021年 10月 13日 第13回農薬第二専門調査会
2021年 11月 8日 第14回農薬第二専門調査会
2021年 12月 6日 第15回農薬第二専門調査会
2022年 1月 18日 第844回食品安全委員会（報告）
2022年 1月 19日 から2月17日まで 国民からの意見・情報の募集
2022年 2月 28日 農薬第二専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
2022年 3月 8日 第850回食品安全委員会（報告）
（3月9日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 47）
2023年 10月 18日 残留農薬基準告示（参照 50）

—第5版関係—

2022年 11月 24日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食 1124 第1号）、関係書類の接受（参照 48）
2022年 11月 29日 第880回食品安全委員会（要請事項説明）
2023年 1月 31日 第887回食品安全委員会（審議）
（2月1日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 49）
2023年 10月 18日 残留農薬基準告示（参照 50）

—第6版関係—

2023年 2月 2日 インポートトレランス設定の要請（綿実及びホップ）

2023年 3月 30日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（新規：小麦、ばれいしょ等）

2024年 4月 11日 農林水産省から消費者庁へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼〔適用拡大：鱗茎類（にらを除く）及びひまわり（種子）〕

2024年 6月 12日 内閣総理大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（消食基第71号）、関係書類の接受（参照51～147）

2024年 6月 18日 第943回食品安全委員会（要請事項説明）

2024年 10月 21日 第34回農薬第二専門調査会

2024年 11月 18日 第35回農薬第二専門調査会

2025年 1月 27日 農薬第二専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2025年 2月 4日 第971回食品安全委員会（報告）
(2月6日付け内閣総理大臣へ通知)

＜食品安全委員会委員名簿＞

(2009年6月30日まで)	(2011年1月6日まで)	(2012年6月30日まで)
見上 彪（委員長）	小泉直子（委員長）	小泉直子（委員長）
小泉直子（委員長代理*）	見上 彪（委員長代理*）	熊谷 進（委員長代理*）
長尾 拓	長尾 拓	長尾 拓
野村一正	野村一正	野村一正
畠江敬子	畠江敬子	畠江敬子
廣瀬雅雄**	廣瀬雅雄	廣瀬雅雄
本間清一	村田容常	村田容常

* : 2007年2月1日から

* : 2009年7月9日から

* : 2011年1月13日から

** : 2007年4月1日から

(2015年6月30日まで)

熊谷 進（委員長）
佐藤 洋（委員長代理）
山添 康（委員長代理）
三森国敏（委員長代理）
石井克枝
上安平冽子
村田容常

(2024年6月30日まで)

山本茂貴（委員長）
浅野 哲（委員長代理 第一順位）
川西 徹（委員長代理 第二順位）
脇 昌子（委員長代理 第三順位）
香西みどり
松永 和紀
吉田 充

(2024年7月1日から)

山本茂貴（委員長）
浅野 哲（委員長代理 第一順位）
祖父江友孝（委員長代理 第二順位）
頭金正博（委員長代理 第三順位）

小島登貴子
杉山久仁子
松永和紀

＜食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿＞

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	三枝順三
林 真 (座長代理*)	佐々木有
赤池昭紀	代田眞理子****
石井康雄	高木篤也
泉 啓介	玉井郁巳
上路雅子	田村廣人
臼井健二	津田修治
江馬 真	津田洋幸
大澤貫寿	出川雅邦
太田敏博	長尾哲二
大谷 浩	中澤憲一
小澤正吾	納屋聖人
小林裕子	成瀬一郎***

西川秋佳**
布柴達男
根岸友惠
平塚 明
藤本成明
細川正清
松本清司
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
吉田 緑
若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)
林 真 (座長代理)
相磯成敏
赤池昭紀
石井康雄
泉 啓介
今井田克己
上路雅子
臼井健二
太田敏博
大谷 浩
小澤正吾
川合是彰
小林裕子
三枝順三***

佐々木有
代田眞理子
高木篤也
玉井郁巳
田村廣人
津田修治
津田洋幸
長尾哲二
中澤憲一*
永田 清
納屋聖人
西川秋佳
布柴達男
根岸友惠
根本信雄

平塚 明
藤本成明
細川正清
堀本政夫
松本清司
本間正充
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦**
吉田 緑
若栗 忍

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

(2012年3月31日まで)

納屋聖人 (座長)	佐々木有	平塚 明
林 真 (座長代理)	代田眞理子	福井義浩
相磯成敏	高木篤也	藤本成明
赤池昭紀	玉井郁巳	細川正清
浅野 哲**	田村廣人	堀本政夫
石井康雄	津田修治	本間正充
泉 啓介	津田洋幸	増村健一**
上路雅子	長尾哲二	松本清司
臼井健二	永田 清	柳井徳磨
太田敏博	長野嘉介*	山崎浩史
小澤正吾	西川秋佳	山手丈至
川合是彰	布柴達男	與語靖洋
川口博明	根岸友惠	義澤克彥
棄形麻樹子***	根本信雄	吉田 緑
小林裕子	八田稔久	若栗 忍
三枝順三		

* : 2011年3月1日まで

** : 2011年3月1日から

*** : 2011年6月23日から

<食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿>

(2022年3月31日まで)

浅野 哲* (座長)	篠原厚子
赤池昭紀 (座長**)	清家伸康
平塚 明 (座長代理)	田中徹也
稻見圭子	豊田武士
佐藤順子***	中塚敏夫

野村崇人
藤本成明
森田 健

* : 2021年6月30日まで
** : 2021年7月5日から
*** : 2021年8月4日から

(2024年4月1日から)

堀本政夫 (座長)	金田勝幸
義澤克彥 (座長代理)	佐藤順子
安部賀央里	田中徹也
稻見圭子	野村崇人

藤本成明
安彦行人
山折 大

<第13回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

久米利明 (農薬第五専門調査会専門委員)
堀本政夫 (元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授)

<第14回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

久米利明（農薬第五専門調査会専門委員）
堀本政夫（元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授）

＜第 15 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

久米利明（農薬第五専門調査会専門委員）
堀本政夫（元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授）

＜第 34 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

篠原厚子（清泉女子大学人文科学研究所教授）
清家伸康（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門
グループ長）
平塚 明（東京薬科大学名誉教授）
森田 健（独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター上席技術専
門官）

＜第 35 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

篠原厚子（清泉女子大学人文科学研究所教授）
清家伸康（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門
グループ長）
平塚 明（東京薬科大学名誉教授）
森田 健（独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター上席技術専
門官）

要 約

アミノ酸系除草剤である「グルホシネート」（CAS No. 77182-82-2）について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。第6版の改訂に当たっては、消費者庁から作物残留試験（国内：小麦、たまねぎ等、海外：綿実及びホップ）、90日間亜急性神経毒性試験（ラット）、発生毒性試験（ラット及びウサギ）の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、植物代謝（レタス、りんご等）、作物残留、家畜代謝試験（ヤギ及びニワトリ）、畜産物残留、動物体内動態（ラット及びイヌ）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（ラット及びマウス）、急性神経毒性（ラット）、亜急性神経毒性（ラット）、発達神経毒性（ラット）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性、免疫毒性（ラット）等である。

各種毒性試験結果から、グルホシネート投与による影響は、主に中枢神経系（鎮静、円背位、自発運動亢進等）、腎臓（重量増加等）及び血液（貧血等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物及び畜産物中のばく露評価対象物質をグルホシネート並びに代謝物B及びZと設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験の1.9 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.019 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、グルホシネートの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験②の無毒性量5 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.05 mg/kg 体重を急性参考用量（ARfD）と設定した。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

除草剤

2. 有効成分の一般名

和名：グルホシネートアンモニウム塩

英名：glufosinate-ammonium (ISO名)

3. 化学名

IUPAC

和名：アンモニウム=[(3RS)-3-アミノ-3-

カルボキシプロピル]メチルホスフィナート

英名：ammonium [(3RS)-3-amino-3-carboxypropyl]methylphosphinate

CAS (No. 77182-82-2)

和名：2-アミノ-4-(ヒドロキシメチルホスフィニル)ブタン酸
一アンモニウム塩

英名：2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid
monoammonium salt


4. 分子式

C₅H₁₅N₂O₄P

5. 分子量

198.2

6. 構造式



7. 物理的化学的性状

融点	: 213°C
沸点	: 241°Cで分解される
密度	: 1.42 g/mL
蒸気圧	: 4.59×10 ⁻⁶ Pa (20°C) : 6.05×10 ⁻⁶ Pa (25°C)
外観(色調及び形状)、臭気	: 類白色、固体粉末、無臭

水溶解度	: 726±41 g/L (純水、pH 7.42、20°C)
オクタノール/水分配係数	: $\log P_{ow} = -4.20$ (pH 5.2、20°C)
解離定数	: $pKa = 7.88 \pm 0.06$ (20°C)

8. 開発の経緯

グルホシネートは、ヘキスト社によって開発されたアミノ酸系除草剤（現在は BASF ジャパン株式会社に承継されている。）であり、グルタミン合成酵素阻害によりアンモニアが蓄積し、植物の生理機能を阻害して殺草活性を示すと考えられている。グルホシネートは光学異性体（*R* 体及び *S* 体）の混合物（ラセミ体）である。基準値はグルホシネートとして設定されているが、各種試験はグルホシネートアンモニウム塩を用いて実施されている。

日本では 1984 年に初回農薬登録された。海外では米国、豪州等で農薬登録されている。

第 6 版では、農薬取締法に基づく農薬登録申請〔新規：小麦、ばれいしょ等、適用拡大：鱗茎類（にらを除く）及びひまわり（種子）〕及びインポートトレーナンス設定（綿実及びホップ）の要請がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種動態及び代謝試験 [II. 1、2、4 及び 5 並びに III. 1] に用いた放射性標識化合物については、以下の略称を用いた。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からグルホシネートアンモニウム塩の濃度 (mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$) に換算した値として示した。

代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

略称	標識位置
^{14}C -グルホシネート	グルホシネートアンモニウム塩の 1 及び 2 位の炭素を ^{14}C で標識したもの
^{14}C -グルホシネート（遊離酸体）	グルホシネートの遊離酸体のアミノ基を側鎖としてもつ炭素（3 位の炭素）を ^{14}C で標識したもの
^{14}C -代謝物 B	代謝物 B の 3 位の炭素を ^{14}C で標識したもの
^{14}C -代謝物 Z	代謝物 Z の 3 及び 4 位の炭素を ^{14}C で標識したもの

1. 土壤中動態試験

(1) 好気的湛水土壤中動態試験

^{14}C -グルホシネートを用いて、好気的湛水土壤中動態試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 1 に示されている。（参照 2、33）

表 1 好気的湛水土壤中動態試験の概要及び結果

試験条件	土壤	認められた分解物	推定半減期
2,000 g ai/ha、 $22\pm 2^\circ\text{C}$ 、暗所、最長 94 日間インキュベート	シルト質埴壤土(ドイツ)	B、E、F、 $^{14}\text{CO}_2$	約 49 日
	壤質砂土(ドイツ)	B、E、F、 $^{14}\text{CO}_2$	約 32 日

グルホシネートの好気的湛水土壤における主要分解経路は、酸化的脱アミノ化、それに続く脱炭酸による分解物 B の生成であり、分解物 B は更に β 酸化、脱炭酸等を受け、最終的には CO_2 等まで分解されると考えられた。

(2) 好気的土壤中動態試験

^{14}C -グルホシネート（遊離酸体）を用いて、好気的土壤中動態試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 2 に示されている。（参照 2、33）

表2 好気的土壤中動態試験の概要及び結果

試験条件	土壤	認められた分解物	推定半減期
10,000 g ai/ha、最大容水量の40%、22±2°C、暗所、14日間ブレインキュベート後、最長35日間インキュベート	壤質砂土(ドイツ)	B、 ¹⁴ CO ₂	35日以内
	砂壤土(ドイツ)	B、 ¹⁴ CO ₂	35日以内

(3) 土壤吸着試験

グルホシネートを用いて、土壤吸着試験が実施された。

試験の概要及び結果については表3に示されている。(参照2、33)

表3 土壤吸着試験の概要及び結果

供試土壤	Freundlichの吸着係数 K_{ads}	有機炭素含有率により補正した吸着係数 $K_{ads_{oc}}$
シルト質壤土(茨城及び高知)、シルト質埴壤土(茨城)、軽埴土(和歌山)	1.7～33.0	102～788

2. 水中動態試験

(1) 加水分解試験①

グルホシネートを用いて、加水分解試験が実施された。

試験の概要及び結果については表4に示されている。(参照2、33)

表4 加水分解試験①の概要及び結果

試験条件	緩衝液	認められた分解物	推定半減期
240 mg/L、25°C、暗所、30日間インキュベート	pH 5(滅菌クエン酸緩衝液)	ND	—
	pH 7(滅菌リン酸緩衝液)	ND	—
	pH 9(滅菌ホウ酸緩衝液)	ND	—

ND: 検出されず。—: 分解しなかったことから、算出されなかった。

(2) 加水分解試験②

グルホシネートを用いて、加水分解試験が実施された。

試験の概要及び結果については表5に示されている。(参照52、148)

表5 加水分解試験②の概要及び結果

試験条件	緩衝液	認められた分解物	推定半減期
約1,800 mg/L、50°C、暗所、5日間インキュベート	pH 4(滅菌酢酸緩衝液)	ND	1年以上
	pH 7(滅菌リン酸緩衝液)	ND	
	pH 9(滅菌ホウ酸緩衝液)	ND	

ND: 検出されず。

(3) 水中光分解試験①(緩衝液及び自然水)

¹⁴C-グルホシネートを用いて、水中光分解試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 6 に示されている。 (参照 2、33)

表 6 水中光分解試験①の概要及び結果

試験条件	供試水	認められた分解物	推定半減期 a
1.5 mg/L、25±2°C、光強度： 523±66 W/m ² 、最長 192 時間照射	滅菌酢酸緩衝液(pH 5)	¹⁴ CO ₂	—b
	滅菌リン酸緩衝液 (pH 7)	¹⁴ CO ₂	—b
1.5 mg/L、25±2°C、光強度： 523±66 W/m ² 、最長 216 時間照射	滅菌ホウ酸緩衝液 (pH 9)	¹⁴ CO ₂	—b
1.5 mg/L、25±2°C、光強度： 844±30 W/m ² 、最長 118 時間照射	滅菌自然水(砂利採掘溝 より採取した表層水)	B、 ¹⁴ CO ₂	95 日 (3 年以上)

a : 括弧内は東京 (北緯 35 度) の春季自然太陽光換算値

b : 分解はほとんど認められず、算出されなかった。

(4) 水中光分解試験②(緩衝液)

¹⁴C-グルホシネートを用いて、水中光分解試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 7 に示されている。 (参照 52、149)

表 7 水中光分解試験②の概要及び結果

試験条件	供試水	区分	認められた分解物	推定半減期
1.5 mg/L、25±1°C、 光強度：31.5～35.8 W/m ² 、最長 12 日間 照射	滅菌酢酸緩衝液 (pH 4)	光照射区	ND	3,470 日
		暗対照区		1,730 日
	滅菌リン酸緩衝液 (pH 7)	光照射区	ND	3,470 日
		暗対照区		385 日
	滅菌ホウ酸緩衝液 (pH 9)	光照射区	ND	990 日
		暗対照区		990 日

ND : 検出されず。

3. 土壤残留試験

グルホシネート及び分解物 B を分析対象化合物とした土壤残留試験が実施された。

試験の概要及び結果は表 8 に示されている。 (参照 2、33)

表8 土壤残留試験の概要及び結果

試験		濃度 ^a	土壤	推定半減期		
				グルホシネート	グルホシネート +分解物B	
容器内試験	畑水分状態	4 mg/kg (1回)	火山灰土・埴壤土①(茨城)	約2日		
			沖積土・埴壤土①(埼玉)	約1.5日		
			火山灰土・壤土(茨城)	約1.5日	約5日	
	湛水状態		洪積土・砂壤土(福島)	約1.5日	約6日	
			火山灰土・壤土(茨城)	約1.5日	約4日	
			沖積土・埴壤土②(岡山)	約4日	約56日	
ほ場試験	畑地	4,000 g ai/ha (2回)	火山灰土・埴壤土②(岩手)	11日		
		3,330 g ai/ha (2回)	沖積土・埴壤土①(埼玉)	11日		
		3,700 g ai/ha (3回)	火山灰土・埴壤土②(岩手)	約5日	約37日	
	水田	1,850 g ai/ha (1回)	洪積土・砂壤土(福島)	約7日	約8日	
			火山灰土・壤土(茨城)	約3日	約13日	
			沖積土・埴土(佐賀)	約6日	約11日	

/ : 測定されず。

a : 容器内試験では純品、ほ場試験では18.5%又は20%液剤が使用された。

4. 植物、家畜等における代謝及び残留試験

(1) 植物代謝試験

① 水稻-1

¹⁴C-グルホシネートを1,000 g ai/haの濃度となるように土壤処理し、処理14日後に湛水状態とした後、3~4葉期の稻苗（品種名：日本晴）を移植して植物代謝試験が実施された。土壤処理104日後（移植89日後）に植物体試料が採取された。

各部位における放射能分布及び代謝物は表9に示されている。

培土に処理された放射能は植物体に吸収され、植物全体に分布したが、可食部である玄米における放射能濃度は低く、分布率は稻わらの約1/20であった。

いずれの試料においても未変化のグルホシネートは検出されなかった。主要代謝物はBであり、そのほかにC及びFが検出された。（参照2、33）

表9 各部位における放射能分布及び代謝物 (%TRR)

試料	稻わら	もみ殻	玄米
総残留放射能濃度(mg/kg)	1.87	3.97	0.52
グルホシネート	ND	ND	ND
代謝物 B	75.9	88.9	71.8
代謝物 C	10.5	1.3	1.1
代謝物 F	3.9	1.8	6.1
糖類	0.7	ND	14.5
未同定代謝物 M04	ND	ND	1.9
未同定代謝物 M10	0.1	ND	1.4
抽出残渣	8.4	7.8	3.1

ND : 検出されず

② 水稻-2

¹⁴C-グルホシネートを 925 g ai/ha の濃度となるようにポット内の土壤に処理し、処理 13 日後に湛水状態とした後、処理 14 日後に稻（品種名：コシヒカリ）の苗を移植し、移植 75 日後に穂前の未成熟試料を、移植 110 日後に成熟試料を採取して、植物代謝試験が実施された。未成熟試料は地上部全体、成熟試料は稻わら、もみ殻及び玄米に分けて分析された。

各部位における放射能分布及び代謝物は表 10 に示されている。

いずれの試料においても未変化のグルホシネートは検出されなかった。主要代謝物は B であり、85.8%TRR～92.4%TRR 認められた。そのほかに代謝物 F が検出されたが 10%TRR 未満であった。（参照：52、53）

表10 各部位における放射能分布及び代謝物 (%TRR)

試料	移植 75 日後	移植 110 日後(成熟試料)		
	地上部全体	稻わら	もみ殻	玄米
総残留放射能濃度(mg/kg)	1.47	1.74	3.69	0.47
グルホシネート	ND	ND	ND	ND
代謝物 B	89.1(1.3)	85.8(1.49)	89.0(3.28)	92.4(0.44)
代謝物 F	2.7(0.04)	2.6(0.04)	2.6(0.09)	0.75(0.01)
未同定代謝物	0.2(0.01)	4.5(0.08)	1.3(0.05)	ND
抽出残渣	7.6(0.14)	7.2(0.13)	7.2(0.26)	6.6(0.03)

ND : 検出されず、() : mg/kg

③ とうもろこし

とうもろこし（品種不明）のは種 3 日後に、¹⁴C-グルホシネートを 1,900 g ai/ha の用量で土壤表面処理し、処理 80 及び 164 日後（収穫時）に植物体試料を採取して植物代謝試験が実施された。

処理 164 日後における残留放射能濃度は、茎葉部で 0.114 mg/kg、種子で

0.034 mg/kg、穂軸葉で 0.079 mg/kg、穂軸で 0.066 mg/kg であった。茎葉部では 60.5%TRR が水で抽出され、その大部分 (55.2%TRR) が代謝物 B であった。抽出液中にはほかの代謝物及び未変化のグルホシネートは認められなかった。

(参照 2、33)

④ だいず

だいず (品種名 : Forest) のは種時に、¹⁴C-グルホシネートを 1,000 g ai/ha の用量で土壤表面処理して、植物代謝試験が実施された。処理 39、81 及び 155 日後 (収穫時) に植物体試料が採取された。また、処理 263 日後に、表面から 20 cm の深さまでの土壤試料が採取された。

各試料における残留放射能濃度は表 11 に示されている。

土壤表面処理された放射能は植物体に吸収され、植物全体に分布した。土壤においては、放射能は主に表面から 5 cm までに分布し、表層から 15 cm 以深からは検出されなかった。 (参照 2、33)

表 11 各試料における残留放射能濃度 (mg/kg)

処理後経過日数	39 日	81 日	155 日
種実		0.016	0.034
さや		0.049	0.04
葉	0.158	0.214	0.137
茎	0.052	0.153	0.089
根	0.2	0.17	0.026

/ : 該当なし

⑤ キャベツ

¹⁴C-グルホシネートを 925 g ai/ha の濃度となるようにポット内の土壤に処理し、処理 7 日後にキャベツ (品種 : Golden Acre) の苗を定植し、定植 61 日後に未成熟試料を採取した。採取後に同濃度の ¹⁴C-グルホシネートを土壤に処理し、定植 106 日後に成熟試料を採取して、植物代謝試験が実施された。未成熟試料は地上部全体、成熟試料は外葉及び結球に分けて分析された。

各部位における放射能分布及び代謝物は表 12 に示されている。

未変化のグルホシネートは、定植 61 日後の地上部全体に 2.8%TRR、定植 106 日後の結球において 3.8%TRR 認められた。主要代謝物は B であり、88.8%TRR～94.9%TRR 認められた。そのほかに F が検出されたが 10%TRR 未満であった。 (参照 : 52、54)

表 12 各部位における放射能分布及び代謝物(%TRR)

試料	定植 61 日後	定植 106 日後(成熟試料)	
	地上部全体	外葉	結球
総残留放射能濃度(mg/kg)	2.78	0.45	4.6
グルホシネート	2.8(0.08)	ND	3.8(0.17)
代謝物 B	88.8(2.47)	94.9(0.43)	89.7(4.1)
代謝物 F	2.2(0.06)	ND	2.85(0.14)
抽出残渣	6.2(0.18)	5.15(0.02)	3.65(0.17)

ND : 検出されず、() : mg/kg

⑥ レタス

レタス（品種名：Selma 系）の水耕液に、¹⁴C-グルホシネートを 0.45 mg/mL の濃度となるように添加し、添加処理 10 日後に植物体試料を採取して、植物代謝試験が実施された。

残留放射能濃度は、茎葉部で 0.85 mg/kg、根部で 8.8 mg/kg であった。茎葉部では 90%TRR が水で抽出され、抽出放射能の全てが代謝物 B であった。（参照 2、33）

⑦ トマト

¹⁴C-グルホシネートを 925 g ai/ha の濃度となるようにポット内の土壤に処理し、処理 7 日後にトマト（品種名：Ramya）の苗を定植し、定植 60 日後に茎葉部及び未成熟果実を採取した。定植 97 日後に同濃度の ¹⁴C-グルホシネートを土壤に処理し、定植 111 日後に茎葉部及び果実を採取して、植物代謝試験が実施された。

各部位における放射能分布及び代謝物は表 13 に示されている。

未変化のグルホシネートは、定植 60 日後の試料において 1.0%TRR～3.3%TRR 認められたが、定植 111 日後の試料ではいずれも認められなかった。主要代謝物は B であり、75.1%TRR～93.6%TRR 認められた。そのほかに代謝物 F が検出されたが 10%TRR 未満であった。（参照：52、55）

表 13 各部位における放射能分布及び代謝物(%TRR)

試料	定植 60 日後				定植 111 日後			
	葉	根	茎	未成熟 果実	葉	根	茎	果実
総残留放射能濃度(mg/kg)	0.339	0.210	3.73	0.0425	0.583	0.179	3.57	0.0675
グルホシネット	3.3 (0.01)	1.9 (0.004)	1.0 (0.037)	2.2 (0.001)	ND	ND	ND	ND
代謝物 B	89.3 (0.31)	75.1 (0.158)	91.0 (3.39)	87.4 (0.038)	93.6 (0.548)	78.3 (0.14)	91.0 (3.24)	88.9 (0.06)
代謝物 F	3.5 (0.01)	ND	ND	2.9 (0.001)	2.6 (0.012)	3.1 (0.006)	2.6 (0.091)	2.8 (0.002)
抽出残渣	3.9 (0.0138)	23.0 (0.0484)	8.0 (0.298)	7.5 (0.00302)	3.8 (0.022)	18.5 (0.0335)	6.5 (0.232)	8.4 (0.0058)

ND : 検出されず、() : mg/kg

⑧ りんご-1

りんご（品種名：コックスオレンジレンネット）の培土に、¹⁴C-グルホシネットを 1,500 g ai/ha の用量で土壤表面処理して、植物代謝試験が実施された。試料として、処理 1、3、6、9 及び 14 週間後に葉が、処理 3、9 及び 14 週間後に果実及び土壤が、処理 14 週間後には枝が採取された。

各試料における残留放射能濃度は表 14 に示されている。

培土に処理された放射能は植物体に吸収され、植物全体に分布した。果実における放射能濃度は、葉及び枝に比べて低く、収穫時（処理 14 週間後）で約 0.1 mg/kg であった。土壤表面に処理された放射能は、主に表面から 10 cm までに分布し、表層から 15 cm 以深からはほとんど検出されなかった。樹全体の重量及び各部位の放射能濃度から、約 1%TAR が植物体に吸収されたと推定された。（参照 2、33）

表 14 各試料における残留放射能濃度 (mg/kg)

処理後経過週数	3 週	9 週	14 週
葉 A	0.117	0.458	0.405
葉 B	0.086	0.285	0.304
果実	0.033	0.083	0.104
新梢			0.773
短果枝			0.811
旧梢			0.385
土壤(深度 0～5 cm)	1.10	0.30	0.41
土壤(深度 5～10 cm)	0.71	0.14	0.14
土壤(深度 10～15 cm)	0.09	0.06	0.03
土壤(深度 15～20 cm)	<0.01	<0.01	<0.01

葉 A : 新梢より採取、葉 B : 短果枝より採取、/ : 採取されず

⑨ りんご-2

りんご（品種名：コックスオレンジレンネット）の培土に、¹⁴C-グルホシネットを 1,500 g ai/ha の用量で土壤表面処理し、処理 14 週間後に果実試料を採取して、植物代謝試験が実施された。

果実中の残留放射能濃度は 0.1 mg/kg であった。このうち 89%TRR が水で抽出され、その大部分が代謝物 B であった。（参照 2、33）

⑩ とうもろこし（遺伝子組換え体）

とうもろこし（グルホシネット耐性遺伝子組換え作物、品種不明）の慣行収穫予定日の 112 及び 102 日前に、¹⁴C-グルホシネットを約 504 g ai/ha (0.45 ポンド/エーカー) の用量で 2 回茎葉散布して、植物代謝試験が実施された。各処理 1 時間後及び 5 日後、2 回目処理 28、55 及び 102 日後に植物体試料が採取された。

2 回目散布 102 日後の各部位における放射能分布及び代謝物は表 15 に示されている。

茎葉処理されたグルホシネットは植物全体に移行したが、可食部を含む雌穂への移行は少なかった。茎葉部における主要代謝物は Z であり、次いで B 及び未変化のグルホシネットが認められた。雌穂試料では、いずれの部位（種子、穂軸及び皮）においても主要代謝物は B であった。次いで多く認められたのは代謝物 F 及び Z であり、未変化のグルホシネットの残留は少なかった。代謝物 G は種子においてのみ検出された。（参照 2、33）

表 15 2 回目散布 102 日後の各部位における放射能分布及び代謝物 (%TRR)

試料	茎葉部	雌穂		
		種子	穂軸	皮
総残留放射能濃度(mg/kg)	2.01	0.130	0.251	0.872
グルホシネット	9.9	1.5	2.6	2.1
代謝物 B	10.9	32.7	43.9	41.1
代謝物 F	2.9	4.4	12.2	11.0
代謝物 G	ND	9.8	ND	ND
代謝物 Z	54.4	9.1	20.1	18.9

ND : 検出されず

⑪ だいず（遺伝子組換え体）

だいず（グルホシネット耐性遺伝子組換え作物¹、品種名：Ignite）の 3 葉期

¹ グルホシネットを N-アセチル化するホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼ遺伝子を導入したもの（以下同じ。）。

及び開花期に、¹⁴C-グルホシネートを約 504 g ai/ha (0.45 ポンド/エーカー) の用量で 2 回茎葉散布して、植物代謝試験が実施された。散布直後、2 回目散布直前及び 2 回目散布 85 日後に植物体試料が採取された。

2 回目散布 85 日後の各部位における放射能分布及び代謝物は表 16 に示されている。

茎葉散布されたグルホシネートは植物全体に移行したが、可食部への移行は他の部位に比較して少なかった。いずれの試料においても主要代謝物は Z であった。次いで、茎葉部では未変化のグルホシネート及び代謝物 B が、さや殻及び種子では代謝物 B が多く検出された。ほかに少量の代謝物 F が全ての試料に認められた。（参照 2、33）

表 16 2 回目散布 85 日後の各部位における放射能分布及び代謝物 (%TRR)

試料	茎葉部	さや殻	種子
総残留放射能濃度(mg/kg)	3.11	4.94	1.47
グルホシネート	18.5	5.8	6.2
代謝物 B	13.6	22.3	16.0
代謝物 F	5.7	2.9	7.1
代謝物 Z	53.2	62.6	60.8

⑫ てんさい（遺伝子組換え体）

てんさい（グルホシネート耐性遺伝子組換え作物、品種名不明）のは種 36 及び 59 日後に、¹⁴C-グルホシネートを、それぞれ 600 g ai/ha (合計 1,200 g ai/ha) ずつ茎葉散布して、植物代謝試験が実施された。試料として、散布直後、初回散布 8 及び 15 日後、2 回目散布直後、2 回目散布 21 及び 146 日後（成熟時）に葉部及び根部が採取された。

2 回目散布後の各試料における放射能分布及び代謝物は表 17 に示されている。

茎葉部に散布されたグルホシネートは比較的速やかに植物体に吸収され、根部にも移行した。いずれの試料においても、残留放射能の主要成分は代謝物 Z 及び未変化のグルホシネートであった。ほかに微量の代謝物 B 及び F（成熟時の茎葉で 0.07%TRR）が検出された。（参照 2、13、33）

表 17 2 回目散布後の各試料における放射能分布及び代謝物 (%TRR)

散布後経過日数	0 日		21 日		146 日	
	試料	茎葉部	根部	茎葉部	根部	茎葉部
総残留放射能濃度(mg/kg)	20.1	2.01	12.3	6.75	2.05	0.93
グルホシネート	84.6	30.9	41.8	30.6	26.3	19.1
代謝物 B	0.4	2.2	1.1	2.0	3.0	6.0
代謝物 Z	13.4	64.3	55.2	63.3	67.1	67.9

⑯ なたね（遺伝子組換え体）

3～5 葉期のなたね（グルホシネート耐性遺伝子組換え作物、品種不明）に、¹⁴C-グルホシネートを 750 g ai/ha の用量で茎葉散布して、植物代謝試験が実施された。散布 1 時間後、21 及び 120 日後（成熟時）に植物体試料が採取された。各部位における残留放射能濃度は表 18 に示されている。

茎葉散布されたグルホシネートは植物全体にほぼ均一に移行した。

散布 1 時間後の植物全体から、主要成分として未変化のグルホシネートが 72.9%TRR、代謝物 Z が 18.2%TRR 検出された。散布 21 日後の茎葉部では、代謝物 Z が 60.2%TRR に増加し、未変化のグルホシネート 20.7%TRR に減少し、少量の代謝物 B (6.7%TRR) が認められた。

散布 120 日後（成熟時）の種子及びさやにおける主要代謝物は B (12%TRR ～58%TRR) であり、ほかに Z が 2%TRR～18%TRR 認められた。種子では未変化のグルホシネートも 20%TRR 以上検出された。（参照 2、13、33）

表 18 各部位における残留放射能濃度

試料	植物 全体	茎葉部		根部		種子	さや
散布後経過時間	1 時間	21 日	120 日	21 日	120 日	120 日	120 日
残留放射能濃度(mg/kg)	145	4.3	0.04	4.5	0.17	0.07	0.14

グルホシネートの植物における主要代謝経路は、①酸化的脱アミノ化後の脱炭酸による代謝物 B の生成、②代謝物 B のα酸化に続く脱炭酸による代謝物 F の生成又は脱水素による代謝物 C の生成であり、グルホシネート耐性遺伝子組換え作物では、上記に加え、グルホシネートの N-アセチル化による代謝物 Z の生成であると考えられた。

（2）作物残留試験

国内において、水稻、小麦等を用いて、グルホシネート及び代謝物 B を分析対象化合物とした作物残留試験²が実施された。

結果は別紙 3 に示されている。

グルホシネートの最大残留値は、最終散布 40 日後に収穫した大麦（乾燥子実）で認められた 0.56 mg/kg であった。代謝物 B の最大残留値は、散布 121 日後に収穫した稻わらで認められた 0.17 mg/kg、可食部では最終散布 21 及び 35 日後に収穫したさんしよう（果実）で認められた 0.16 mg/kg であった。

海外において、綿実及びホップを用いて、グルホシネート並びに代謝物 B 及び Z を分析対象化合物とした作物残留試験²が実施された。

² 残留値はグルホシネート又はグルホシネート（遊離酸体）換算値として示された。

結果は別紙 4 に示されている。

グルホシネートの最大残留値は、最終散布 11 日後に収穫したホップ（乾花）の 0.262 mg/kg、代謝物 B の最大残留値は、最終散布 70 日後に収穫した綿実の 0.872 mg/kg [グルホシネート（遊離酸体）換算値]、代謝物 Z の最大残留値は、最終散布 96 日後に収穫した綿実の 7.43 mg/kg [グルホシネート（遊離酸体）換算値] であった。（参照 2、24、33、52、56～112、141～147）

（3）家畜代謝試験

① ヤギ

泌乳ヤギ（品種不明、雌 2 匹）に、¹⁴C-グルホシネートを 3 mg/kg 体重/日（164 mg/頭/日、約 100 mg/kg 飼料相当）で、1 日 2 回、4 日間カプセル経口投与して、家畜代謝試験が実施された。投与 1 日からと殺まで毎日 2 回、尿、糞及び乳汁が、最終投与 15 時間後のと殺時に組織・臓器が採取された。

腎臓（0.6 μg/g）及び肝臓（0.4 μg/g）で比較的高い残留放射能が認められ、筋肉及び脂肪（0.01 μg/g 未満）では微量であった。乳汁中残留放射能濃度は、投与 2 日で 0.02 μg/g となつたが、それ以降は変化が認められなかった。

最終投与 15 時間後における各試料中の代謝物は表 19 に示されている。

いずれの試料においても、残留放射能の主要成分は未変化のグルホシネートであり、主要代謝物は B であった。そのほかに代謝物 F 及び Z が少量検出された。

投与放射能は主に糞中に排泄された。投与開始から試験終了時までに、消化管内容物も含めると 80%TAR 以上が糞中に排泄された。尿中排泄率は低く、試験終了時までの排泄量は約 3%TAR であった。乳汁中への排泄は僅かであり、試験終了時までに乳汁中に排泄された放射能は 0.02%TAR であった。（参照 2、4、33）

表 19 最終投与 15 時間後における各試料中の代謝物 (%TRR)

試料	腎臓	肝臓	乳汁 ¹⁾	糞 ²⁾	尿 ²⁾
グルホシネート	49.0	52.7	48.9	75.9	80.9
代謝物 B	29.4	36.5	6.3	12.0	13.7
代謝物 F	1.2	0.4	5.3	2.0	0.7
代謝物 Z	4.2	ND	2.2	8.3	2.4

ND：検出されず、¹⁾ 投与 2 日午後搾乳試料、²⁾ 最終採取試料

② ヤギ（代謝物 Z）

泌乳ヤギ（品種不明、1 頭）に¹⁴C-代謝物 Z を 3 mg/kg 体重/日で 1 日 2 回、3 日間カプセル経口投与して、家畜代謝試験が実施された。

最終投与 16 時間後における各試料中の代謝物は表 20 に示されている。

組織及び血中の残留放射能は 0.2%TAR で、腎臓 (0.93 $\mu\text{g/g}$) 及び肝臓 (0.29 $\mu\text{g/g}$) で比較的高かった。乳汁中に排泄された放射能は 0.1%TAR 未満であった。乳汁中放射能濃度は投与 2 日で約 0.02 $\mu\text{g/g}$ となり、定常状態に達した。

いずれの試料においても、残留放射能の主要成分はグルホシネートであった。腎臓及び肝臓では代謝物 B 及び未変化の Z も多く検出された。糞中ではグルホシネートが 34%TRR、未変化の代謝物 Z が 52%TRR 検出された。

投与放射能は糞中に 68%TAR、尿中に 7.3%TAR、消化管内容物中に 19%TAR 検出され、主に糞中に排泄された。(参照 22)

表 20 最終投与 16 時間後における各試料中の代謝物

試料	腎臓		肝臓		乳汁	
	%TRR	$\mu\text{g/g}$	%TRR	$\mu\text{g/g}$	%TRR	$\mu\text{g/g}$
グルホシネート	40	0.37	33	0.095	40	0.009
代謝物 B	20	0.19	21	0.060	14	0.003
代謝物 F	1.6	0.015	2.0	0.006	4.8	0.001
代謝物 Z	32	0.30	19	0.054	9.2	0.002

③ ニワトリ

産卵鶏 (単冠白色レグホン、一群雌 6 羽) に ^{14}C -グルホシネートを 2 mg/kg 体重/日 (3.0 $\text{mg}/\text{羽}/\text{日}$ 、24.5 mg/kg 飼料相当) で 1 日 2 回、14 日間カプセル経口投与して、家畜代謝試験が実施された。

各試料中の代謝物は表 21 に示されている。

排泄物中から 90%TAR 以上の残留放射能が検出され、組織 (可食部) からは 0.02%TAR 未満、卵中からは 0.07%TAR 検出された。残留放射能の主要成分は未変化のグルホシネートであり、肝臓では代謝物 B が 10%TRR を超えて認められた。(参照 4、22、33、34)

表 21 各試料中の代謝物 (%TRR)

試料	肝臓	卵白(投与 14 日)	卵黄(投与 13 日)
グルホシネート	31.1	77.8	53.1
代謝物 B	44.1	1.3	4.1
代謝物 F	3.5	ND	3.1
代謝物 Z	4.9	ND	2.4

ND : 検出されず

④ ニワトリ (代謝物 Z)

産卵鶏 (品種不明、6 羽) に ^{14}C -代謝物 Z を 2.2 mg/kg 体重/日で 1 日 2 回、14 日間カプセル経口投与して、家畜代謝試験が実施された。

各試料中の代謝物は表 22 に示されている。

組織（可食部）及び血中の残留放射能は 0.1%TAR 未満であり、残留放射能濃度は肝臓で 0.076 $\mu\text{g/g}$ 、筋肉で 0.013 $\mu\text{g/g}$ 、脂肪で 0.011 $\mu\text{g/g}$ であった。卵白中の残留放射能は、試験期間を通じて定量限界（0.009 $\mu\text{g/g}$ ）を僅かに上回る程度であったが、卵黄では徐々に増加した（最大 0.056 $\mu\text{g/g}$ ）。

肝臓及び卵黄の残留放射能の主要成分は未変化の代謝物 Z、卵白ではグルホシネートであった。排泄物中放射能の主要成分は未変化の代謝物 Z（73%TRR）であり、ほかにグルホシネートが 13%TRR、代謝物 B が 8.6%TRR 検出された。

投与放射能の大部分（86%TAR）が排泄物中に排泄され、消化管内容物中に 1.0%TAR 検出された。（参照 22）

表 22 各試料中の代謝物 (%TRR)

試料	肝臓	卵白(投与 13 日目)	卵黄(と殺日)
グルホシネート	15	14	2.8
代謝物 B	17	2.0	2.2
代謝物 F	ND	1.1	0.6
代謝物 Z	27	5.1	13

ND : 検出されず

畜産動物（ヤギ及びニワトリ）におけるグルホシネートの主要代謝経路は、①酸化的脱アミノ化後の脱炭酸による代謝物 B の生成、②N-アセチル化による代謝物 Z の生成、③代謝物 B の α 酸化に続く脱炭酸による代謝物 F の生成と考えられた。

（4）畜産物残留試験

① 乳汁移行試験

ホルスタイン種泌乳牛（3 頭）に、グルホシネートを 2 mg/kg の濃度で 4 週間混餌投与して乳汁移行試験が実施された。

投与開始時から投与 28 日まで、いずれの採取時点においても乳汁試料のグルホシネートは定量限界（0.01 $\mu\text{g/g}$ ）未満であった。（参照 21）

② ウシ（原体及び代謝物 B）

ホルスタイン種泌乳牛（一群雌 3~4 頭）に、グルホシネート及び代謝物 B を表 23 に示した用量で 28 日間混餌投与し、グルホシネート及び代謝物 B を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。

表 23 畜産物残留試験（ウシ）における投与量

投与群	グルホシネート	代謝物 B
4.3 mg/kg 飼料投与群	3.0 mg/kg 飼料/日 (0.075 mg/kg 体重/日)	1.0 mg/kg 飼料/日 (0.025 mg/kg 体重/日)
12.9 mg/kg 飼料投与群	9.0 mg/kg 飼料/日 (0.225 mg/kg 体重/日)	3.0 mg/kg 飼料/日 (0.075 mg/kg 体重/日)
43.0 mg/kg 飼料投与群	30.0 mg/kg 飼料/日 (0.75 mg/kg 体重/日)	10.0 mg/kg 飼料/日 (0.25 mg/kg 体重/日)

結果は別紙 5①に示されている。

乳汁中におけるグルホシネートの最大残留値は 12.9 mg/kg 飼料投与群の投与 1 日に認められた 0.03 $\mu\text{g/g}$ であり、ほとんどの投与群において定量限界 (0.02 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。代謝物 B は全ての投与群で定量限界 (0.02 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。

臓器及び組織中におけるグルホシネートの最大残留値は、肝臓で 0.13 $\mu\text{g/g}$ (4.3 mg/kg 飼料投与群)、腎臓で 0.13 $\mu\text{g/g}$ (43.0 mg/kg 飼料投与群)、脂肪で 0.06 $\mu\text{g/g}$ (4.3 mg/kg 飼料投与群) であった。筋肉ではいずれの投与群においても定量限界 (0.05 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。また、代謝物 B の最大残留値は、肝臓で 10.7 $\mu\text{g/g}$ 、腎臓で 7.4 $\mu\text{g/g}$ 、脂肪で 0.16 $\mu\text{g/g}$ (いずれも 43.0 mg/kg 飼料投与群) であった。筋肉ではいずれの投与群においても定量限界 (0.05 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。

肝臓及び腎臓では休薬期間終了後にも代謝物 B が認められた。（参照 33、35）

③ ニワトリ（原体及び代謝物 B）

Shaver Starcross 種産卵鶏（一群雌 15 羽）に、グルホシネート及び代謝物 B を表 24 に示した用量で 28 日間混餌投与し、グルホシネート及び代謝物 B を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。

表 24 畜産物残留試験（ニワトリ）における投与量

投与群	グルホシネート	代謝物 B
4.8 mg/kg 飼料投与群	3.5 mg/kg 飼料/日 (0.247 mg/kg 体重/日)	1.0 mg/kg 飼料/日 (0.071 mg/kg 体重/日)
14.4 mg/kg 飼料投与群	10.5 mg/kg 飼料/日 (0.741 mg/kg 体重/日)	3.0 mg/kg 飼料/日 (0.213 mg/kg 体重/日)
48.0 mg/kg 飼料投与群	35.0 mg/kg 飼料/日 (2.4 mg/kg 体重/日)	10.0 mg/kg 飼料/日 (0.71 mg/kg 体重/日)

結果は別紙 5②に示されている。

卵におけるグルホシネートの最大残留値は 48.0 mg/kg 飼料投与群で投与 7～

13日に認められた 0.07 $\mu\text{g/g}$ であり、ほとんどの投与群で定量限界 (0.05 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。代謝物 B はいずれの投与群においても定量限界 (0.05 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。

臓器及び組織中におけるグルホシネートの最大残留値は、腎臓で 0.25 $\mu\text{g/g}$ (48.0 mg/kg 飼料投与群) であり、肝臓、筋肉及び脂肪はいずれも定量限界 (肝臓: 0.10 $\mu\text{g/g}$ 、筋肉及び脂肪: 0.05 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。代謝物 B の最大残留値は、腎臓で 7.80 $\mu\text{g/g}$ (48.0 mg/kg 飼料投与群) であり、肝臓、筋肉及び脂肪はいずれも定量限界 (肝臓: 0.10 $\mu\text{g/g}$ 、筋肉及び脂肪: 0.05 $\mu\text{g/g}$) 未満であった。

休薬期間終了後には、腎臓以外の試料中にグルホシネート及び代謝物 B は認められなかった。(参照 33、36)

④ ブタ及びニワトリ

LW・D 種ブタ (雌)、アーバーエーカー種ブロイラー (雌) 及びデカルブ TX 種採卵鶏を用い、グルホシネート及び代謝物 B を分析対象化合物とした畜産物残留試験が実施された。

結果は表 25 に示されている。

ブタ及びブロイラーの筋肉及び脂肪並びに採卵鶏の卵黄では、いずれの投与群においてもグルホシネートは検出されなかった (検出限界: 0.01 $\mu\text{g/g}$)。ブタ及びブロイラーの肝臓では、2 mg/kg 以上投与群でグルホシネートの移行が認められ、その検出量は投与量に対応して増加し、最大残留値はブロイラーの肝臓の 0.10 $\mu\text{g/g}$ であった。(参照 21)

表 25 臓器、組織及び卵黄へのグルホシネートの移行量* ($\mu\text{g/g}$)

投与量 (ppm)	ブタ			ブロイラー			採卵鶏 卵黄
	肝臓	筋肉	脂肪	肝臓	筋肉	脂肪	
0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2	0.01 ±0.00	<0.01	<0.01	<0.01 ~0.03	<0.01	<0.01	<0.01
10	0.07 ±0.02	<0.01	<0.01	0.10 ±0.02	<0.01	<0.01	<0.01

*: グルホシネート及び代謝物 B (グルホシネートに換算) の含量

5. 動物体内動態試験

(1) ラット①

① 吸収

a. 血中濃度推移

Wistar ラット (一群雌雄各 5 匹) に ^{14}C -グルホシネートを 2 mg/kg 体重で単

回経口投与若しくは単回静脈内投与、Wistar ラット（雌雄各 3 匹）に ^{14}C -グルホシネートを 800 mg/kg 体重で単回経口投与、又は Wistar ラット（一群雌 3 匹）に ^{14}C -グルホシネートを 10 若しくは 100 mg/kg 体重で単回経口投与し、繰り返し同用量で非標識体を 6 日間反復経口投与した後、標識体を 3 日間反復経口投与して、血中薬物動態学的パラメータについて検討された。

経口投与群における血中薬物動態学的パラメータは表 26 に示されている。

2 mg/kg 体重の単回経口投与群では、雌雄とも T_{\max} は 1 時間、 $T_{1/2}$ は雌で 3.7 時間であったが、雄では C_{\max} が検出限界の 2 倍未満であったため、 $T_{1/2}$ は算出不能であった。2 mg/kg 体重の静脈内投与群では、5 分後の値 ($C_{5\text{min}}$) を基に $T_{1/2}$ が算出された。血中濃度推移曲線は減衰速度から 3 相に分けられ、第 I 相における $T_{1/2}$ は雌雄とも約 20 分であった。（参照 2、33）

表 26 経口投与群における血中薬物動態学的パラメータ

投与方法	単回経口						反復経口	
	2		800		10	100	10	100
投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)								
性別	雄	雌	雄	雌	雌	雌	雌	雌
T_{\max} (hr)	1	1	1	0.5~1	1	2	1	4
C_{\max} (μg/g)	0.008	0.027	3.18	NA	0.106	1.25	0.242	1.73
$T_{1/2}$ (hr)	—	3.7	4.9	4.0	4.4	2.3	5.3	4.5
AUC (μg·hr/mL)	0.012	0.088						

— : 算出不能、/ : 算出されず

NA : 投与 1 時間後のサンプル処理が不適切であったことから測定されなかった。

b. 吸收率

尿及び糞中排泄試験 [5.(1)④] における静脈内及び経口投与群の尿中排泄率から算出された吸收率³は、雄で約 8%、雌で約 13% と算出された。また、尿及び糞中排泄試験 [5.(1)④] における尿及びケージ洗浄液中の放射能の合計から、吸收率は、雄で少なくとも 6.9%、雌で少なくとも 7.8% と算出され、消化管からの吸収は少ないと考えられた。（参照 2、33）

② 分布

Wistar ラット（一群雌雄各 5~12 匹）に ^{14}C -グルホシネートを 2 mg/kg 体重若しくは 500 mg/kg 体重で単回経口投与、又は Wistar ラット（雌雄各 10 匹）に非標識のグルホシネートを 2 mg/kg 体重/日で 14 日間反復経口投与した後、15 日目に標識体を同用量で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 27 に示されている。

³ 吸收率 (%) = 経口投与群尿中排泄率 (%) / 静脈内投与群尿中排泄率 (%)

2 mg/kg 体重の単回経口投与群では、投与 168 時間後における体内残留放射能濃度は極めて低く、腎臓、肝臓等の一部の臓器を除いて検出限界を超える放射能は認められなかった。臓器及び組織中の残留放射能は最大で 0.09%TAR 程度 [雄の腎臓 (0.17 $\mu\text{g/g}$) 及び雌の肝臓 (0.05 $\mu\text{g/g}$)] であった。

500 mg/kg 体重の単回経口投与群では、最も放射能濃度が高かったのは腎臓で、投与 2 時間後に最高値を示した。次いで肝臓及び脾臓で高かった。脳を除く各臓器中の放射能濃度は投与 2 時間後で最も高く、経時的に減少した。

2 mg/kg 体重/日の反復経口投与群においても、腎臓に最も高濃度の放射能分布が認められた。その他の臓器及び組織中の放射能濃度は低く、脳及び脂肪組織中の濃度は血中濃度と等しかった。 (参照 2、6、33)

表 27 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 ($\mu\text{g/g}$)

投与方法	投与量	試料採取時間	性別	残留放射能濃度
単回経口	2 mg/kg 体重	投与 168 時間後	雄	腎臓(0.17)、生殖腺(0.07)、肝臓(0.02)、その他(0.01 未満)
			雌	肝臓(0.05)、腎臓(0.01)、その他(0.01 未満)
	500 mg/kg 体重	投与 2 時間後	雄	腎臓(81.6)、脾臓(12.3)、肝臓(12.2)、血漿(3.0)、血球(0.8)、脳(0.3)
			雌	腎臓(76.3)、脾臓(41.3)、肝臓(17.7)、血漿(3.2)、血球(1.0)、脳(0.6)
		投与 96 時間後	雄	脾臓(4.7)、肝臓(2.0)、脳(0.7)、血漿(0.4)、血球(0.2)
			雌	腎臓(1.2)、脾臓(1.1)、肝臓(0.7)、脳(0.4)、血球(0.2 未満)、血漿(0.06 未満)
	反復経口	最終投与 96 時間後	雄	腎臓(0.11)、肝臓(0.03)、脾臓(0.01)、脳(0.003)、脂肪組織(0.003)、全血(0.003)
			雌	腎臓(0.28)、肝臓(0.06)、脾臓(0.01)、脳(0.003)、脂肪組織(0.003)、全血(0.002)

③ 代謝

Wistar ラット (雌雄各 12 匹) に ^{14}C -グルホシネートを 500 mg/kg 体重で単回経口投与、Wistar ラット (雌雄各 10 匹) に非標識のグルホシネートを 2 mg/kg 体重/日で 14 日間反復経口投与した後、標識体を同用量で単回経口投与、又は Wistar ラット (雄 5 匹) に ^{14}C -グルホシネートを 2 mg/kg 体重で単回静脈内投与して、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿及び糞中における代謝物は表 28 に示されている。

いずれの投与群においても、尿及び糞中放射能の主要成分は未変化のグルホシネートであり、尿中の主要代謝物は、酸化的脱アミノ化の後、脱炭酸された B であった。そのほかに、微量の代謝物として、経口投与群の尿及び糞中では E 及び Z が、静脈内投与群の糞中では D 及び Z が認められた。

なお、本試験において排泄物中に認められたグルホシネートの脱アミノ体で

ある G は、被験物質の不純物由来である可能性が考えられた。（参照 2、6、33）

表 28 尿及び糞中における代謝物 (%TRR)

投与方法	投与量	試料採取時間	試料	性別	グルホシネート	代謝物
単回 経口	500 mg/kg 体重	投与後 24 時間	尿	雄	74.1	B(13.5)、G(5.6)、Z(1.2)、D(<0.6)、F(<0.6)
				雌	79.3	B(8.6)、G(6.1)、Z(0.7)、D(<0.7)、F(<0.7)
		最終 投与後 24 時間	糞	雄	97.7	Z(0.9)、B(0.8)、G(0.6)、D(0.3)、F(<0.2)
				雌	96.5	Z(1.1)、B(0.6)、D(0.3)、G(0.2)、F(<0.2)
反復 経口	2 mg/kg 体重/日	最終 投与後 24 時間	尿	雄	76.1	B(11.9)、E(9.5)、未同定代謝物 2(2.4)
				雌	100	—
			糞	雄	85.0	B(6.5)、E(1.8)、未同定代謝物 2(3.5)、未同定代謝物 1(3.1)
				雌	82.5	B(9.3)、E(4.4)、未同定代謝物 2(4.0)
単回 静脈内	2 mg/kg 体重	投与後 24 時間	尿	雄	87.4	B(12.2)、未同定代謝物 2(0.6)
			糞	雄	84.1	Z(8.6)、D(4.7)、B(2.1)

—：検出されず

④ 排泄

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）に ¹⁴C-グルホシネートを 2 mg/kg 体重で単回経口投与若しくは単回静脈内投与、Wistar ラット（雌雄各 12 匹）に ¹⁴C-グルホシネートを 500 mg/kg 体重で単回経口投与、又は Wistar ラット（雌雄各 10 匹）に非標識のグルホシネートを 2 mg/kg 体重/日で 14 日間反復経口投与した後、15 日目に標識体を単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

尿及び糞中排泄率は表 29 に示されている。

静脈内投与群では、投与放射能は雌雄ともに主に尿中に排泄された。排泄は速やかであり、投与後 48 時間で 70%TAR 以上が尿中に排泄された。一方、糞中排泄率は低く、胆汁中排泄は少ないものと考えられた。いずれの経口投与群においても、雌雄ともに主に糞中に排泄され、静脈内投与時にも大部分が尿中に回収され、胆汁中排泄が少ないとから、経口投与された放射能の大部分は吸収されることなく、胃腸内を通過したと考えられた。尿中排泄率は低かった。排泄は速やかであり、単回投与群では投与後 48 時間で 70%TAR～80%TAR 以上、反復投与群では最終投与後 24 時間で 85%TAR 以上が排泄された。呼気中に放射能は検出されなかった。（参照 2、33）

表 29 尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与方法	単回経口		単回静脈内		単回経口		反復経口
投与量	2 mg/kg 体重		2 mg/kg 体重		500 mg/kg 体重		2 mg/kg 体重/日
試料採取時間	投与後 168 時間		投与後 168 時間		投与後 96 時間		最終投与後 96 時間
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄
尿	6.5	11.9	82.5	91.8	7.7	5.2	5.4
糞	89.1	81.4	17.7	8.1	75.2	88.6	83.0
ケージ洗浄液	0.4	1.7	2.1	1.2	3.5	2.6	/

/ : 該当なし

(2) ラット②

Wistar ラット（一群雄 28 匹）に ^{14}C -グルホシネートを 12、116 又は 1,220 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ で経皮投与して動物体内動態試験が実施された。処理 0.5、1、2、4、10、24 及び 72 時間後に組織等の試料が採取された（処理 2 時間後以降は、皮膚刺激性が認められたため、処理部位はガーゼで覆って保護された）。

尿及び糞中排泄物、各組織、カーカス⁴並びにケージ洗浄液から算出された吸収量は 1.0%TAR～16.3%TAR であった。また、皮膚からの吸収には用量相関性が認められた。処理部位を覆ったガーゼからは、処理 24 及び 72 時間後に高い残留放射能（12.2%TAR～34.8%TAR）が認められた。

各投与群における残留放射能は、カーカスで最も高い濃度を示したが、血液や組織における濃度は低かった。また、尿及び糞中残留放射能には用量相関性が認められた。吸収されなかった放射能のほとんど（79.8%TAR～98.3%TAR）が、皮膚洗浄液から検出され、グルホシネートは皮膚から吸収され難いことが示唆された。（参照 7）

(3) ラット③

① 吸収

a. 全血及び血漿中濃度推移

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 4 匹）に ^{14}C -グルホシネートを 10 mg/kg 体重（以下 [5.(3)] において「低用量」という。）又は 100 mg/kg 体重（以下 [5.(3)] において「高用量」という。）で単回経口投与して、全血及び血漿中薬物動態学的パラメータについて検討された。

全血及び血漿中薬物動態学的パラメータは表 30 に示されている。

T_{max} は、高用量群の雌の全血中の 4 時間を除き、1 時間であった。高用量群での $T_{1/2}$ は低用量群に対して長く、AUC は用量比以上の増加が認められた。いずれの投与群においても C_{max} は全血中と比較して血漿中で高かった。（参照 52、113）

⁴ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ。）。

表 30 全血及び血漿中薬物動態学的パラメータ

投与量	10 mg/kg 体重				100 mg/kg 体重			
	全血		血漿		全血		血漿	
試料	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
T _{max} (hr)	1	1	1	1	1	4	1	1
C _{max} (μg/g)	0.417	0.400	0.570	0.474	3.94	4.21	6.45	5.82
T _{1/2} (hr)	3.18	2.36	NC	1.95	17.7	17.1	10.1	9.1
AUC _{last} (μg·hr/g)	4.38	2.85	3.28	3.45	58.8	52.8	77.5	57.9
C _{max} ratio (全血/血漿比)	0.732	0.844	/	/	0.611	0.723	/	/
AUC _{last} ratio (全血/血漿比)	1.34	0.826	/	/	0.759	1.02	/	/

/ : 該当なし

NC : 2 つの測定時点で定量限界未満であったことから算出されず。

AUC_{last} : 定量可能な時点までの薬物濃度曲線下面積。

b. 吸收率

尿及び糞中排泄試験 [5. (3)④a.] における投与後 96 時間の尿、ケージ洗浄液及びカーカスの合計から、吸収率は雄で 30.1%～30.7%、雌で 25.6%～27.5% と算出された。 (参照 52、115、116)

② 分布

Wistar Hannover ラット (一群雌雄各 4 匹) に ¹⁴C-グルホシネートを低用量又は高用量で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 31 に示されている。

残留放射能は、肝臓、肺、脾臓、胸腺等の血液系臓器のほか、腎臓及び膀胱で高く認められた。投与 72 時間後における臓器及び組織中の放射能は 0.2%TAR 未満であった。 (参照 : 52、114)

表 31 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (%TAR)

投与量	性別	T _{max} 付近 ^a	投与 72 時間後
10 mg/kg 体重	雄	カーカス(0.393)、腎臓(0.320)、肝臓(0.138)、膀胱(0.0526)、血漿(0.0390)、精巣(0.0387)、胸腺(0.0302)、全血(0.0265)	カーカス(0.113)、精巣(0.0952)、肝臓(0.0616)、腎臓(0.0489)、胸腺(0.0254)、脾臓(0.0060)、膵臓(0.0055)、肺(0.0050)、精巣上体(0.0045)、大腿部骨格筋(0.0042)、皮膚(0.0038)、皮下脂肪(0.0034)、脳(0.0032)、心臓(0.0028)、胸部骨格筋(0.0027)、血漿(0.0023)、前立腺(0.0021)、褐色脂肪(0.0015)、骨髓(0.0014)、全血(0.0014)
	雌	カーカス(3.39)、腎臓(0.254)、肝臓(0.0837)、血漿(0.0181)、大腿部骨格筋(0.0178)、脳(0.0174)、皮膚(0.0166)、全血(0.0165)	カーカス(0.0800)、肝臓(0.0593)、胸腺(0.0273)、腎臓(0.0193)、膵臓(0.0089)、肺(0.0075)、脾臓(0.0064)、子宮(0.0061)、大腿部骨格筋(0.0056)、脳(0.0050)、胸部骨格筋(0.0041)、皮膚(0.0035)、褐色脂肪(0.0028)、皮下脂肪(0.0021)、骨髓(0.0018)、全血(0.0018)、心臓(0.0017)、血漿(0.0015)
100 mg/kg 体重	雄	カーカス(1.74)、腎臓(0.256)、肝臓(0.0600)、膵臓(0.0232)、大腿部骨格筋(0.0152)、精巣(0.0143)、肺(0.0125)、膀胱(0.0116)、皮下脂肪(0.0081)、前立腺(0.0078)、血漿(0.0077)、皮膚(0.0076)、胸部骨格筋(0.0074)、胸腺(0.0059)、精巣上体(0.0046)、脾臓(0.0040)、脳(0.0038)、褐色脂肪(0.0037)、心臓(0.0030)、食道(0.0026)、全血(0.0025)	カーカス(0.105)、肝臓(0.0847)、精巣(0.0667)、腎臓(0.0323)、胸腺(0.0119)、膵臓(0.0090)、脾臓(0.0062)、皮膚(0.0061)、精巣上体(0.0053)、肺(0.0050)、皮下脂肪(0.0028)、前立腺(0.0027)、胸部骨格筋(0.0027)、大腿部骨格筋(0.0027)、褐色脂肪(0.0026)、脳(0.0016)、心臓(0.0011)、全血(0.0006)、眼球(0.0002)、大腿骨(0.0002)、膀胱(0.0002)、血漿(0.0002)
	雌	カーカス(2.42)、腎臓(0.609)、肝臓(0.113)、胸腺(0.0548)、子宮(0.0318)、血漿(0.0240)、膵臓(0.0210)、肺(0.0180)、脾臓(0.0153)、大腿部骨格筋(0.0137)、皮膚(0.0118)、膀胱(0.0109)、心臓(0.0066)、胸部骨格筋(0.0061)、全血(0.0061)	カーカス(0.0500)、肝臓(0.0473)、腎臓(0.0130)、大腿部骨格筋(0.0071)、膵臓(0.0060)、胸腺(0.0059)、脾臓(0.0057)、子宮(0.0049)、肺(0.0045)、褐色脂肪(0.0028)、皮膚(0.0027)、脳(0.0022)、皮下脂肪(0.0020)、胸部骨格筋(0.0018)、心臓(0.0012)、血漿(0.0004)、骨髓(0.0003)、眼球(0.0003)、卵巣(0.0003)、食道(0.0002)、甲状腺(0.0002)、膀胱(0.0002)、大腿骨(0.0001)、副腎(0.0001)、全血(0.0000)

^a : 高用量群の雌では投与 4 時間後、そのほかの投与群では投与 1 時間後

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験 [5.(3)④a.] 並びに胆汁中排泄試験 [5.(3)④b.]において採取された尿及び糞を用いて、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿及び糞中代謝物は表 32 に示されている。

未変化のグルホシネートは、いずれの投与群においても尿及び糞中に認められた。尿及び糞中の主要代謝物は B、G 及び Z であり、尿中では G、糞中では Z が多く認められた。ほかに、胆汁中排泄試験では、尿及び糞中に代謝物 F が認められた。（参照 52、115、116）

表 32 尿及び糞中代謝物 (%TAR)

試験	投与量	試料	性別	グルホシネート	代謝物
尿及び糞中 排泄試験 ^a	10 mg/kg 体重	尿	雄	17.8	G(3.00)、Z(0.50)、B(0.11)、未同定(0.86)
			雌	14.9	G(2.09)、Z(0.61)、B(0.10)、未同定(3.05)
		糞	雄	43.3	Z(14.7)、G(0.07)、B(0.01)、未同定(0.01)
			雌	48.1	Z(12.9)、G(1.02)、B(0.07)、未同定(0.26)
	100 mg/kg 体重	尿	雄	18.4	G(2.78)、Z(0.42)、B(0.11)、未同定(4.61)
			雌	19.5	G(2.95)、Z(0.24)、B(0.08)
		糞	雄	59.0	Z(3.73)、B(0.13)
			雌	61.8	Z(6.22)、未同定(0.06)
胆汁中 排泄試験 ^b	10 mg/kg 体重	尿	雄	25.8	G(3.39)、B(0.97)、F(0.4)、未同定(0.02)
			雌	19.9	G(3.03)、B(0.5)
		糞	雄	37.8	Z(6.56)、G(0.43)、B(0.01)
			雌	32.8	Z(5.63)、G(0.48)、B(0.02)、未同定(3.51)
	100 mg/kg 体重	尿	雄	25.3	B(1.95)、G(0.87)、Z(0.49)、未同定(0.01)
			雌	28.5	B(1.85)、G(1.13)、Z(0.04)
		糞	雄	41.4	Z(6.86)、B(0.01)、未同定(0.01)
			雌	33.3	Z(4.68)、G(0.44)、F(0.23)、B(0.18)

^a : 投与後 48 時間の試料を採取

^b : 投与後 24 時間の試料を採取

ラットにおけるグルホシネートの主要代謝経路は、①酸化的脱アミノ化後の脱炭酸による代謝物 B の生成、②N-アセチル化による代謝物 Z の生成、③酸化的脱アミノ化後の還元による代謝物 G の生成と考えられた。

④ 排泄

a. 尿及び糞中排泄

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 4 匹）に ¹⁴C-グルホシネートを低用量又は高用量で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与後 96 時間における尿及び糞中排泄率は表 33 に示されている。

投与放射能は、いずれの投与群においても、投与後 96 時間で 90%TAR 以上が尿及び糞中に排泄され、主に糞中に排泄された。（参照 52、115）

表 33 投与後 96 時間における尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与量	10 mg/kg 体重	100 mg/kg 体重	
試料採取時間	投与後 96 時間	投与後 96 時間	
性別	雄	雌	雄
尿	23.2	18.5	23.9
糞	64.9	70.2	69.5
ケージ洗浄液	6.36	6.54	6.19
消化管	0.13	0.14	0.18
カーカス	0.57	0.56	0.57
			0.47

b. 胆汁中排泄

胆管カニューレを挿入した Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 4 匹）に ¹⁴C-グルホシネートを低用量又は高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 72 時間における胆汁中排泄率は、低用量群の雄で 0.09%TAR 及び雌で 0.08%TAR、高用量群の雄で 0.08%TAR 及び雌で 0.10%TAR であり、いずれの投与群においても胆汁からの排泄は僅かであった。（参照 52、116）

(4) イヌ

ビーグル犬（雌雄各 2 匹）に ¹⁴C-グルホシネートを 8 mg/kg 体重で単回経口投与、又はビーグル犬（一群雌雄各 6 匹）に ¹⁴C-グルホシネートを 1 mg/kg 体重/日若しくは 8 mg/kg 体重/日で 10 日間反復経口投与して、動物体内動態試験が実施された。

① 血中薬物動態学的パラメータ

血中薬物動態学的パラメータは表 34 に示されている。

反復投与による経時的な血中濃度上昇は認められなかった。いずれの投与群においても血中放射能濃度に比較し血漿中放射能濃度が概ね高かった。8 mg/kg 体重/日投与群の雄における放射能濃度の消失半減期は血中で 46.2 時間、血漿中で 16.1 時間であった。（参照 2、33）

表 34 血中薬物動態学的パラメータ

投与方法		単回経口		反復経口			
投与量		8 mg/kg 体重		1 mg/kg 体重/日		8 mg/kg 体重/日	
性別		雄	雌	雄	雌	雄	雌
全血	T _{max} (hr)	2	4	4	6	6	6
	C _{max} (μg/g)	0.184	0.274	0.024	0.032	0.204	0.228
血漿	T _{max} (hr)	2	4	4	6	6	6
	C _{max} (μg/g)	0.312	0.448	0.038	0.047	0.270	0.329

② 分布

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 35 に示されている。

いずれの投与群においても、腎臓で残留放射能濃度が最も高く、次いで肝臓であった。その他の臓器・組織中放射能はいずれも低かった。反復投与による放射能の蓄積は認められなかった。(参照 2、33)

表 35 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (μg/g)

投与方法	投与量	性別	投与 6 時間後 ^a	投与 24 時間後 ^a	最終投与 96 時間後
単回 経口	8 mg/kg 体重	雄	腎臓(右)(1.6)、腎臓(左)(1.4)、肝臓(0.4)、その他(0.05 以下)	腎臓(右)(1.2)、腎臓(左)(1.2)、肝臓(1.2)、その他(0.06 以下)	
		雌	腎臓(左)(2.4)、腎臓(右)(2.3)、肝臓(0.4)、その他(0.06 未満)	腎臓(左)(2.4)、腎臓(右)(2.3)、肝臓(1.2)、その他(0.06 未満)	
反復 経口	1 mg/kg 体重/日	雄	腎臓(右)(0.3)、腎臓(左)(0.3)、肝臓(0.2)、その他(0.02 以下)	腎臓(右)(1.1)、腎臓(左)(1.1)、肝臓(0.6)、その他(0.04 以下)	全ての組織(0.1 未満)
		雌	腎臓(左)(0.5)、腎臓(右)(0.5)、肝臓(0.3)、その他(0.07 未満)	腎臓(右)(0.5)、腎臓(右)(0.5)、肝臓(0.4)、その他(0.04 未満)	全ての組織(0.1 未満)
	8 mg/kg 体重/日	雄	腎臓(右)(3.8)、腎臓(左)(3.5)、肝臓(2.4)、その他(0.5 以下)	腎臓(左)(6.4)、腎臓(右)(5.7)、肝臓(3.5)、その他(0.3 以下)	全ての組織(0.8 未満)
		雌	腎臓(左)(4.2)、腎臓(右)(4.1)、肝臓(1.5)、その他(0.4 以下)	腎臓(左)(5.1)、腎臓(右)(5.1)、肝臓(3.2)、その他(0.4 以下)	腎臓(左)(1.2)、腎臓(右)(1.2)、肝臓(0.9)、その他(0.2 未満)

/: 該当なし

^a: 反復投与群では、最終投与後の経過時間

③ 代謝

排泄試験 [5. (3)④] で得られた尿及び糞並びにと殺時に採取された腎臓及び肝臓を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿、糞及び臓器中代謝物は表 36 に示されている。

いずれの投与群においても、糞中の抽出放射能は全て未変化のグルホシネットであった。尿中放射能の主要成分も未変化のグルホシネットであり、代謝物として、酸化的脱アミノ化の後、脱炭酸されて生成した B のみが認められた。臓器中放射能の主要成分は、単回投与群では未変化のグルホシネットであったが、反復投与群では、腎臓では代謝物 B が多く、肝臓では未変化のグルホシネットが多かった。(参照 2、33)

表 36 尿、糞及び臓器中代謝物 (%TRR)

投与方法	投与量	試料採取時間	試料	性別	グルホシネート	代謝物 B	非抽出性放射能
単回 経口	8 mg/kg 体重	投与 6 時間後 ～24 時間後	尿	雄	88.7	11.3	
				雌	83.9	16.1	
			糞	雄	68.1	ND	31.9
				雌	78.3	ND	21.7
		投与 24 時間 後	腎臓	雄	98.4	ND	1.6
				雌	97.2	ND	2.8
			肝臓	雄	95.1	ND	4.9
				雌	98.6	ND	1.4
反復 経口	1 mg/kg 体重/日	最終投与後 48 時間	尿	雄	100	ND	
				雌	88.8	11.2	
		最終投与後 24 時間	糞	雄	81.7	ND	18.3
				雌	85.8	ND	14.2
	8 mg/kg 体重/日	最終投与後 48 時間	尿	雄	75.3	24.7	
				雌	79.3	20.7	
		最終投与後 24 時間	糞	雄	84.0	ND	16.0
				雌	87.0	ND	13.0
		最終投与 24 時間後	腎臓	雄	16.7	59.1	23.2
				雌	11.3	71.5	17.2
			肝臓	雄	34.7	30.8	34.5
				雌	73.8	ND	26.2

ND : 検出されず、/ : 該当なし

④ 排泄

尿及び糞中排泄率は表 37 に示されている。

いずれの投与群においても、投与放射能は主に糞中に排泄され、尿中排泄率は低かった。排泄は速やかで、単回投与群では、投与後 24 時間で 80%TAR 以上が糞中に排泄された。反復投与群においても、最終投与 96 時間後までに約 80%TAR が糞中に排泄された。(参照 2、33)

表 37 尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与方法	単回経口		反復経口				
	投与量	8 mg/kg 体重	1 mg/kg 体重/日		8 mg/kg 体重/日		
			性別	雄 雌	雄 雌	雄 雌	
尿		9.7	9.2	13.8	14.1	14.1	17.0
糞		81.7	83.2	83.5	80.2	82.0	78.8
ケージ洗浄液		3.4	1.6	1.1	2.2	1.2	1.5

注) 尿、糞とも、単回投与群では投与後 24 時間、反復投与群では投与開始から最終投与 96 時間後までの排泄率を示す。

6. 急性毒性試験等

(1) 急性毒性試験（経口投与）

グルホシネートアンモニウム塩（原体）を用いた急性毒性試験（経口投与）が実施された。

結果は表 38 に示されている。（参照 2、17、33、37、38、52、117）

表 38 急性毒性試験概要（原体、経口投与）

動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
Fischer ラット 雌雄各 10 匹 ^a	1,660	1,510	<p>投与量：1,000、1,170、1,370、1,600、1,870、 2,190、2,570、3,000(雌のみ) mg/kg 体重</p> <p>雄： 1,600 mg/kg 体重以上：下痢 1,000 mg/kg 体重以上：鎮静、触刺激反応亢進、流涎、流涙、腹臥位、立毛及び体重減少</p> <p>雌： 3,000 mg/kg 体重：振戦 1,600 mg/kg 体重以上：下痢 1,000 mg/kg 体重以上：鎮静、触刺激反応亢進、流涎、流涙、腹臥位、立毛及び体重減少</p> <p>雌雄：1,170 mg/kg 体重以上で死亡例</p>
Wistar ラット 雌雄各 10 匹 ^b	2,000	1,620	<p>投与量： 雄：630、1,000、1,600、2,500、3,150 mg/kg 体重 雌：630、1,000、1,600、1,800、2,000 mg/kg 体重</p> <p>雄： 発現用量不明：運動失調、横臥位、眼の赤色痂皮形成、不規則呼吸、尾部咬傷及び体重増加抑制 2,500 mg/kg 体重以上：反射亢進、ダルリンプル徵候、眼球突出、開脚姿勢及び側腹部陥没 1,000 mg/kg 体重以上：うずくまり、反射低下、粗毛及び全身状態悪化 630 mg/kg 体重：症状なし</p> <p>雌： 発現用量不明：ダルリンプル徵候、眼球突出及び体重増加抑制 1,600 mg/kg 体重以上： 活動性低下、平衡失調、運動失調、うずくまり、腹臥位、横臥位、開脚姿勢、振戦、痙攣、間代性痙攣、痙攣性横転、反射亢進、粗毛、眼及び口吻部の赤色痂皮形成、不規則呼吸及び全身状態悪化 1,000 mg/kg 体重以下：症状なし</p> <p>雄：1,000 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：1,600 mg/kg 体重以上で死亡例</p>

動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
Wistar ラット 雌 9 匹 ^{a, d}		>2,000	投与量 : 300、2,000 mg/kg 体重 症状及び死亡例なし
Wistar Hannover ラット 雌 6 匹 ^{b, e}		>2,000	投与量 : 2,000 mg/kg 体重 自発運動亢進及び立毛(軽度) 2,000 mg/kg 体重で死亡例
ICR マウス 雌雄各 10 匹 ^c	436	464	投与量 : 雄 : 231、300、390、507、659 mg/kg 体重 雌 : 300、390、507、659、857 mg/kg 体重 雄 : 390 mg/kg 体重以上 : 被毛光沢消失、横臥位、腹臥位及び失調性歩行(390 mg/kg 体重のみ) 300 mg/kg 体重以上 : 立毛 231 mg/kg 体重以上 : 間代性痙攣及び自発運動低下 雌 : 507 mg/kg 体重以上 : 間代性痙攣 390 mg/kg 体重以上 : 腹臥位及び被毛光沢消失 300 mg/kg 体重以上 : 自発運動低下及び立毛 雄 : 300 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 390 mg/kg 体重以上で死亡例
NMRI マウス 雌雄各 10 匹 ^b	431	416	投与量 : 315、500、800 mg/kg 体重 雄 : 発現用量不明 : 運動失調、異常運動、うずくまり、腹臥位、間代性痙攣、痙攣性跳躍、痙攣性横転、シユトラウプ反応、痙攣性不規則呼吸、粗毛、全身状態悪化及び体重増加抑制 雌 : 発現用量不明 : 運動失調、異常運動、うずくまり、側臥位、間代性痙攣、痙攣性跳躍、痙攣性横転、シユトラウプ反応、流涎、痙攣性不規則呼吸、運動亢進、粗毛、全身状態悪化及び体重増加抑制 雌雄 : 315 mg/kg 体重以上で死亡例

動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
ビーグル犬 雌雄各 2 匹 ^c	<350		<p>投与量 : 350、400 mg/kg 体重</p> <p>雄 :</p> <p>400 mg/kg 体重 : 後弓反張、痙攣性横転、痙攣性跳躍</p> <p>350 mg/kg 体重以上 : 流涎、振戦、嘔吐、咬筋痙攣、運動性異常、強直性痙攣、水かき運動、運動失調、腹臥位又は横臥位、筋痙攣、呼吸異常、頻脈及び摂餌量減少</p> <p>雌 :</p> <p>400 mg/kg 体重 : 痙攣性横転</p> <p>350 mg/kg 体重以上 : 振戦、嘔吐、咬筋痙攣、流涎、運動性異常、旋回行動、粗毛、強直性痙攣、間代性痙攣、後弓反張、水かき運動、運動失調、腹臥位又は横臥位、筋痙攣、呼吸異常及び摂餌量減少</p> <p>雌雄 : 350 mg/kg 体重以上で死亡例</p>
ビーグル犬 性別及び匹数 不明	200～400		詳細不明

/ : 該当なし

・溶媒として、^aは蒸留水、^bは脱イオン水、^cは 4%CMC 水溶液が用いられた。

^d : 上げ下げ法による評価。検体として、原体水溶液が用いられ、投与量及び結果の値は検体の重量。

^e : 毒性等級法による評価。

(2) 一般薬理試験

グルホシネートアンモニウム塩（原体）を用いた一般薬理試験が実施された。

結果は表 39 に示されている。（参照 2、3）

表 39 一般薬理試験概要

試験の種類	動物種	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
中枢神経系	多元観察	ICR マウス	雄 3 雌 3	0、200、 400、 800、1,600 (経口) ^a	200	雄 ^c ： 800 mg/kg 体重以上 下痢(投与 4~8 時間後)、刺激(接触及び音)への反応亢進、挙尾、振戦、間代性痙攣、警戒性低下、視覚性置き直し反応低下、無反応、自発運動低下、筋緊張低下、異常姿勢、正向反射亢進、立毛、眼瞼下垂、低体温及び呼吸緩徐 400 mg/kg 体重以上 疼痛刺激反応亢進及びぴくつき 雌 ^d ： 1,600 mg/kg 体重 下痢(投与 4~8 時間後)及び振戦 800 mg/kg 体重以上 挙尾及び反射亢進 400 mg/kg 体重以上 刺激(接触、音及び疼痛)への反応亢進、ぴくつき、間代性痙攣、警戒性低下、視覚性置き直し反応低下、無反応、自発運動低下、ふらつき歩行、筋緊張低下、異常姿勢、眼瞼下垂、立毛、低体温及び呼吸緩徐
	日本 白色種 ウサギ	雄 3	0、2.5、 10、40 (静脈内) ^a	10	40	投与 8 時間後以降で痙攣等の神経症状、生存個体は投与 3 日後には回復 40 mg/kg 体重で死亡例
ヘキソバル ビタール誘 発睡眠時間	ICR マウス	雄 10	0、200、 400、 800、1,600 (経口) ^a	400	800	800 mg/kg 体重以上 ヘキソバルビタール誘発睡眠時間延長
脳波	日本 白色種 ウサギ	雄 3	0、2.5、 10、40 (静脈内) ^a	2.5	10	投与 4 時間後以降痙攣を示唆する異常脳波、生存個体は投与 4 日後までに正常に回復
体温	日本 白色種 ウサギ	雄 3	0、2.5、 10、40 (静脈内) ^a	10	40	3 例中 2 例に 1~2°C の体温上昇

試験の種類		動物種	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
呼吸循環器系	呼吸、血圧、心電図	日本白色種ウサギ	雄 3	0、2.5、10、40 (静脈内) ^a	10	40	呼吸数減少、呼吸振幅増加 血圧、心電図に影響なし
骨格筋	前脛骨筋収縮	日本白色種ウサギ	雄 3	0、2.5、10、40 (静脈内) ^a	40	—	筋直接及び神経刺激による収縮に影響なし
血液系	溶血作用、血液凝固(PT、APTT)	日本白色種ウサギ	雄 4	0、10 ⁻⁵ 、10 ⁻⁴ 、10 ⁻³ g/mL (<i>in vitro</i>) ^a	10 ⁻³ g/mL	—	影響なし
自律神経系	摘出輸精管 摘出回腸	Hartleyモルモット	雄 4	0、10 ⁻⁵ 、10 ⁻⁴ 、10 ⁻³ g/mL (<i>in vitro</i>) ^b	10 ⁻⁴	10 ⁻³	摘出輸精管：ノルアドレナリン、高カリウム誘発収縮増加 摘出回腸：筋緊張及び自発運動亢進

注) 溶媒として、^aは生理食塩液、^bは Krebs Ringer が用いられた。

—：最小作用量は設定できなかった。

^c：下痢を除く所見について、400 mg/kg 体重投与群では投与 4～5 日後、800 mg/kg 体重投与群では投与 1～2 日後、1,600 mg/kg 体重投与群では投与 8 時間～2 日後に認められた。

^d：下痢を除く所見について、400 mg/kg 体重投与群では投与 1～4 日後、800 mg/kg 体重投与群では投与 1～5 日後、1,600 mg/kg 体重投与群では投与 8 時間～2 日後に認められた。

＜グルタミン合成酵素活性の変化について＞

亜急性毒性試験 [7.]、慢性毒性試験及び発がん性試験 [8.] 並びにその他の試験 [13.] の一部において、脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性が測定されている。各臓器におけるグルタミン合成酵素活性の低下と病理組織学的变化又は神経症状の変化との関係性は明確ではないが、食品安全委員会は、各試験におけるグルタミン合成酵素活性の低下について、統計学的有意差に加えて、肝臓及び腎臓では病理組織学的变化、脳では病理組織学的变化のほか、神経症状の変化が併せて認められる場合には毒性影響として評価を行った。

7. 亜急性毒性試験

(1) 90 日間亜急性毒性試験 (ラット) ①

Fischer ラット (一群雌雄各 20 匹) を用いた混餌投与 (原体 : 0、8、64、500 及び 4,000 ppm : 平均検体摂取量は表 40 参照) による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、全ての投与群に 4 週間回復群 (一群雌雄各 10 匹) が設けられた。本試験において、最終投与終了時及び回復期間終了時に肝グルタ

ミン合成酵素活性及び血清アンモニア濃度が測定された。

表 40 90 日間亜急性毒性試験（ラット）①の平均検体摂取量

投与群		8 ppm	64 ppm	500 ppm	4,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.52	4.1	32	263
	雌	0.63	4.8	39	311

各投与群で認められた毒性所見は表 41 に示されている。

最終投与終了時には 4,000 ppm 投与群の雄及び 500 ppm 以上投与群の雌で肝グルタミン合成酵素活性の低下が認められたが、回復期間終了時には認められなかつた。いずれの投与群においても血清アンモニア濃度に影響は認められなかつた。

本試験において、500 ppm 以上投与群の雄及び 4,000 ppm 投与群の雌で腎臓の絶対及び比重量⁵增加等が認められたことから、無毒性量は雄で 64 ppm (4.1 mg/kg 体重/日)、雌で 500 ppm (39 mg/kg 体重/日) であると考えられた。なお、500 ppm 以上投与群の雄で認められた腎絶対及び比重量増加は、4 週間回復期間終了時にも認められた。（参照 2、3、33）

表 41 90 日間亜急性毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
4,000 ppm	・体重増加抑制(投与 1~3 週)及び摂餌量減少(投与 1~3 週)	・体重増加抑制(投与 1~3 週)及び摂餌量減少(投与 1~3 週) ・腎絶対及び比重量増加
500 ppm 以上	・腎絶対及び比重量増加	500 ppm 以下
64 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（2）90 日間亜急性毒性試験（ラット）②

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体：0、7,500、10,000 及び 20,000 ppm：平均検体摂取量は表 42 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 42 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②の平均検体摂取量

投与群		7,500 ppm	10,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	521	686	1,350
	雌	574	741	1,440

各投与群で認められた毒性所見は表 43 に示されている。

本試験において、7,500 ppm 以上投与群の雄で縮瞳及び RBC 減少、雌で注意

⁵ 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。

力低下及び驚愕反応低下が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 7,500 ppm 未満（雄：521 mg/kg 体重/日未満、雌：574 mg/kg 体重/日未満）であると考えられた。（参照 2、17、33）

表 43 90 日間亜急性毒性試験（ラット）②で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
20,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 鎮静(投与 1～2 週)、横臥(投与 2 週)、円背位(投与 1～2 週)、喘ぎ呼吸(投与 2 週)、削瘦(投与 2 週)及び粗毛(投与 1～4 週) 無気力、注意力低下、驚愕反応低下、探索行動低下、恐怖症状、筋緊張性増加、発声増加、下痢及び毛づくろい減少(FOB) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 例死亡(胸腺萎縮：投与 6 及び 8 日) 鎮静(投与 1～2 週)、横臥(投与 1～2 週)、円背位(投与 1～2 週)、喘ぎ呼吸(投与 2 週)、削瘦(投与 1～2 週)及び粗毛(投与 1～4 週) 筋緊張性増加、痛覚反応亢進、下痢及び毛づくろい減少(FOB)
10,000 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> 血清 LDH 及び CK 活性低下（約 20%） カルシウム増加 	<ul style="list-style-type: none"> 縮瞳、恐怖症状及び発声増加(FOB) RBC 減少 血清 LDH 及び CK 活性低下（約 20%）
7,500 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> 縮瞳[§](FOB) RBC 減少 	・注意力低下及び驚愕反応低下(FOB)

・FOB で認められた症状は主に投与 1 又は 2 週の検査において認められた。

§ : 10,000 ppm 投与群において統計学的有意差は認められないが、検体投与の影響と考えられた。

（3）90 日間亜急性毒性試験（ラット）③

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体：0、100、500 及び 2,500 ppm：平均検体摂取量は表 44 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 44 90 日間亜急性毒性試験（ラット）③の平均検体摂取量

投与群		100 ppm	500 ppm	2,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	7.35	36.5	189
	雌	8.18	40.5	205

各投与群で認められた毒性所見は表 45 に示されている。

本試験において、2,500 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制、摂餌量減少等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 500 ppm（雄：36.5 mg/kg 体重/日、雌：40.5 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 52、122）

表 45 90 日間亜急性毒性試験（ラット）③で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,500 ppm	・体重増加抑制(投与 1 週)及び摂餌量減少(投与 1 及び 2 週) ・腎絶対及び比重量 [§] 増加	・自発運動亢進(投与 18 日以降) ・体重増加抑制(投与 1 週)及び摂餌量減少(投与 1 及び 2 週) ・腎比重量増加
500 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

§：統計学的有意差はないが、検体投与の影響と考えられた。

（4）28 日間亜急性毒性試験（ラット）<参考資料⁶>

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体：0、2,000、6,000 及び 12,000 ppm：平均検体摂取量は表 46 参照）による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 46 28 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群	2,000 ppm	6,000 ppm	12,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	169	489
	雌	166	482
			943
			925

各投与群で認められた毒性所見は表 47 に示されている。

本試験において、2,000 ppm 以上投与群の雌雄で体重増加抑制、摂餌量減少等が認められた。（参照 52、125）

表 47 28 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
12,000 ppm	・活動性低下、立毛、流涎及び振戦 ^a ・胸腺絶対重量減少 ・脳(大脳皮質、海馬及び視床)神経細胞消失 ・心筋変性及び線維化	・活動性低下、立毛、流涎及び異常発声 ^a ・脳(大脳皮質及び視床)神経細胞消失
6,000 ppm 以上	・自発運動亢進 ^a ・Glu 減少 ^b ・心臓絶対重量減少 ・肝絶対及び比重量減少	・肝絶対及び比重量減少 ・脳(海馬)神経細胞消失
2,000 ppm 以上	・体重増加抑制及び摂餌量減少 ^c ・胸腺リンパ球枯渇	・自発運動亢進 ^a ・体重増加抑制及び摂餌量減少 ^c

^a：雌雄における一般状態の変化は、いずれも投与 3～15 日以降に認められた。

^b：統計学的有意差は認められなかつたが、検体投与による影響と考えられた。

^c：6,000 及び 12,000 ppm 投与群では投与 1 週以降、2,000 ppm 投与群では投与 1 週のみ認められた。

⁶ 90 日間亜急性毒性試験（ラット）③ [7. (3)] の用量設定試験であり、検査項目が不足していることから、参考資料とした。

(5) 14週間亜急性毒性試験（ラット、S体⁷）<参考資料>

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（S 体 : 0、250、1,250 及び 2,500 ppm）による 14 週間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、1,250 ppm 以上投与群の雌雄で血漿及び尿中アンモニア濃度増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 250 ppm（雄 : 18.5 mg/kg 体重/日、雌 : 19.8 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5）

(6) 90日間亜急性毒性試験（マウス）①

NMRI マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体 : 0、80、320 及び 1,280 ppm：平均検体摂取量は表 48 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 48 90 日間亜急性毒性試験（マウス）①の平均検体摂取量

投与群		80 ppm	320 ppm	1,280 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	17	67	278
	雌	19	87	288

各投与群で認められた毒性所見は表 49 に示されている。

本試験において、320 ppm 以上投与群の雄でカリウム增加、雌で RBC 及び Ht 減少が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 80 ppm（雄 : 17 mg/kg 体重/日、雌 : 19 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、3、33）

表 49 90 日間亜急性毒性試験（マウス）①で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,280 ppm	・AST 増加	・ALP 増加
320 ppm 以上	・カリウム增加	・RBC 及び Ht 減少
80 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

(7) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）②

NMRI マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体 : 0、1,750、3,500 及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 50 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

⁷ [7. (5) 及び (13)] の試験は、S-グルホシネートアンモニウム塩を用いて実施された。

表 50 90 日間亜急性毒性試験（マウス）②の平均検体摂取量

投与群		1,750 ppm	3,500 ppm	7,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	274	561	—
	雌	356	644	—

— : 7,000 ppm 投与群では全例が投与 8 日までに死亡したことから、検体摂取量は算出されなかった。

各投与群で認められた毒性所見は表 51 に示されている。

本試験において、1,750 ppm 以上投与群の雌雄で体重及び摂餌量減少等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 1,750 ppm 未満（雄 : 274 mg/kg 体重/日未満、雌 : 356 mg/kg 体重/日未満）であると考えられた。（参照 2、4、33）

表 51 90 日間亜急性毒性試験（マウス）②で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
7,000 ppm	・全例死亡(投与 4~8 日) ・側臥位(投与 1 週)、歩行失調(投与 1 週)及び衰弱(投与 1 週)	・全例死亡(投与 4~8 日) ・衰弱(投与 1 週)
3,500 ppm 以上	・5 例死亡(3,500 ppm のみ、投与 6~45 日) ・鎮静(投与 1~8 週)、無気力(投与 1 週)、円背位(投与 1~2 週)、痙攣(投与 1~7 週)、腹臥位(投与 1~7 週)、呼吸困難(投与 1~7 週)及び削瘦(投与 1~2 週)	・5 例死亡(3,500 ppm のみ、投与 6~8 日) ・円背位(投与 1~5 週)、痙攣(投与 1 週)、腹臥位(投与 1 週)、歩行失調(投与 1 週)及び呼吸困難(投与 1 週) ・体重増加抑制(投与 15 日)
1,750 ppm 以上	・粗毛(投与 1~3 週 ^a) ・体重減少(投与 8 日)/増加抑制(投与 15~29 日 ^b)及び摂餌量減少(投与 1~8 日 ^c)	・1 例死亡(1,750 ppm のみ、投与 8 日) ・粗毛(投与 1~2 週 ^d)、鎮静(投与 2 週 ^e)及び削瘦(投与 2 週 ^f) ・体重減少(投与 8 日)及び摂餌量減少(投与 1~36 日 ^g)

・7,000 ppm 投与群の雌雄で認められた一般状態の変化は投与 1~2 週に認められた。

^a : 3,500 ppm 投与群では、投与 1 週以降に認められた。

^b : 3,500 ppm 投与群では、投与 15 日以降に認められた。

^c : 3,500 ppm 投与群では、投与 1~36 日に認められた。

^d : 3,500 ppm 投与群では、投与 1~7 週に認められた。

^e : 3,500 ppm 投与群では、投与 1~5 週に認められた。

^f : 3,500 ppm 投与群では、投与 1~2 週に認められた。

^g : 3,500 ppm 投与群では、投与 1~64 日に認められた。

(8) 90 日間亜急性毒性試験（マウス）③

NMRI マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体 : 0、50、200 及び 800 ppm : 平均検体摂取量は表 52 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 52 90 日間亜急性毒性試験（マウス）③の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	200 ppm	800 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	7.28	28.4	108
	雌	8.84	32.4	126

各投与群で認められた毒性所見は表 53 に示されている。

本試験において、800 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制、摂餌量減少等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 200 ppm（雄：28.4 mg/kg 体重/日、雌：32.4 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 52、124）

表 53 90 日間亜急性毒性試験（マウス）③で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
800 ppm	・死亡(1 例、投与 63 日) ^a ・体重増加抑制(投与 1 週)及び 摂餌量減少(投与 3 週以降)	・体重増加抑制(投与 2 週以降) 及び摂餌量減少(投与 3 週)
200 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

^a：内臓器官の自己融解が著しかったことから、死因は特定できなかった。

（9）28 日間亜急性毒性試験（マウス）<参考資料⁸>

Swiss マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体：0、300、1,000 及び 3,000 ppm：平均検体摂取量は表 54 参照）による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 54 28 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		300 ppm	1,000 ppm	3,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	47.8	144	346
	雌	58.5	154	371

各投与群で認められた毒性所見は表 55 に示されている。

本試験において、1,000 ppm 以上投与群の雌雄で体重減少、摂餌量減少等が認められた。（参照 52、125）

⁸ 90 日間亜急性毒性試験（マウス）③ [7. (8)] の用量設定試験であり、検査項目が不足していることから、参考資料とした。

表 55 28 日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
3,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 死亡(3 例、投与 6~20 日)及び切迫と殺(2 例、投与 8 日)[脳(大脳皮質及び海馬)神経細胞消失及び空胞化、胸腺リンパ球枯渇、脾臓萎縮] 眼瞼閉鎖(投与 4~6 日)、脱水(投与 4~8 日)及び陰茎突出(投与 7~8 日) Glu 減少 副腎絶対及び比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> 死亡(4 例、投与 5~14 日)及び切迫と殺(3 例、投与 8~16 日)[脳(海馬)神経細胞消失、胸腺リンパ球枯渇、子宮及び卵巣萎縮] 脱水(投与 6~16 日)、活動性低下(投与 4~16 日) 及び歩行失調(投与 15~16 日) 子宮及び卵巣萎縮
1,000 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> 活動性低下(投与 7 日)^a 体重減少(投与 1 週)、体重増加抑制(投与 2 週以降)及び摂餌量減少(投与 1 週以降) 	<ul style="list-style-type: none"> 死亡(1 例、投与 7 日)[著変なし] 体重減少(投与 1 週)、体重増加抑制(投与 3 週)^b 及び摂餌量減少(投与 1 週以降)
300 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

[]内は、死亡又は切迫と殺例で認められた病理組織学的所見

^a : 3,000 ppm 投与群では投与 4~8 日に認められた。

^b : 3,000 ppm 投与群では、投与 2 週以降に認められた。

(10) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）①

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌投与（原体：0、4、8、16、64 及び 256 ppm：平均検体摂取量は表 56 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。本試験において、対照群、64 及び 256 ppm 投与群において肝機能の指標として BSP 排泄速度及び腎機能の指標として PSP 排泄速度が測定された。

表 56 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）①の平均検体摂取量

投与群		4 ppm	8 ppm	16 ppm	64 ppm	256 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.13	0.26	0.57	2.1	8.0
	雌	0.13	0.25	0.49	2.0	7.6

BSP 及び PSP 排泄速度に検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、256 ppm 投与群の雌雄で摂餌量の減少傾向がみられ、雌で体重増加抑制（投与 7、56~70 及び 91 日）が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 64 ppm（雄：2.1 mg/kg 体重/日、雌：2.0 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、33）

(11) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）②

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口投与（原体：0、1、3

及び 6 mg/kg 体重/日⁹⁾ による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 6 mg/kg 体重/日であると考えられた。 (参照 52、126)

(12) 28 日間亜急性毒性試験 (イヌ) <参考資料¹⁰⁾>

ビーグル犬 (一群雌雄各 1 匹) を用いたカプセル経口投与 (原体 : 0、1、3、6 及び 10 mg/kg 体重/日) による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、10 mg/kg 体重/日投与群の投与 11 日に雄 (1 例) が切迫と殺され、雌 (1 例) で死亡が認められた。 (参照 52、127)

(13) 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ、S 体) <参考資料>

ビーグル犬 (一群雌雄各 6 匹) を用いた混餌投与 (S 体 : 0、2、5 及び 8.5 mg/kg 体重/日) による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、5 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で血漿アンモニア濃度増加、同群の雌で腎臓中アンモニア濃度の増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 2 mg/kg 体重/日であると考えられた。 (参照 5)

8. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1 年間慢性毒性試験 (イヌ) ①

ビーグル犬 (6 か月間投与群 : 一群雌雄各 4 匹、1 年間投与群 : 一群雌雄各 4 匹) を用いた混餌投与 (原体 : 0、60、150 及び 375/250¹¹⁾ ppm : 平均検体摂取量は表 57 参照) による 1 年間慢性毒性試験が実施された。本試験において、肝機能の指標として BSP 排泄速度、腎機能の指標として PSP 排泄速度が測定された。

表 57 1 年間慢性毒性試験 (イヌ) ①の平均検体摂取量

投与群		60 ppm	150 ppm	375/250 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	2.0	5.0	8.5
	雌	2.0	5.5	9.0

BSP 及び PSP 排泄速度に検体投与による影響は認められなかった。

⁹ 28 日間亜急性毒性試験 (イヌ) [7. (12)] において、10 mg/kg 体重/日投与群の 2 例中 2 例で死亡又は切迫と殺例認められたことから、本試験の最高用量は 6 mg/kg 体重/日と設定された。

¹⁰ 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ) ② [7. (11)] の用量設定試験であり、供試動物数が一群雌雄各 1 匹であることから参考資料とした。

¹¹ 飼料中濃度は 375 ppm で投与が開始されたが、投与開始後の平均検体摂取量が大きく (投与 10 日までの平均検体摂取量 : 雄 12.1 mg/kg 体重/日、雌 15.7 mg/kg 体重/日)、死亡等の重篤な毒性影響が認められたことから、投与 11 日から飼料中濃度が 250 ppm に引き下げられた。

各投与群で認められた毒性所見は表 58 に示されている。

本試験において、375/250 ppm 投与群の雌雄で一般状態の変化が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 150 ppm (雄: 5.0 mg/kg 体重/日、雌: 5.5 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2、3、14、17、33)

(中枢神経系への影響の発現機序については [13. (1)] 参照)

表 58 1年間慢性毒性試験 (イヌ) ①で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
375/250 ppm	<ul style="list-style-type: none">・1例死亡(投与 14 日)(心筋壊死による心及び循環器系の衰弱)・咬痙、流涎、運動亢進、嗜眠、自発運動低下、振戦、失調性歩行、強直性歩行、頻尿、強直性/間代性痙攣及び横臥位(投与 9~14 日)	<ul style="list-style-type: none">・1例死亡(投与 10 日)(誤嚥性肺炎、軽度心筋壊死)・咬痙、流涎、運動亢進、嗜眠、自発運動低下、振戦、失調性歩行、強直性歩行、頻尿、強直性/間代性痙攣及び横臥位(投与 9~10 日)
150 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(2) 1年間慢性毒性試験 (イヌ) ②

ビーグル犬 (一群雌雄各 4 匹) を用いたカプセル経口投与 (原体: 0、2、4 及び 8/10/16¹² mg/kg 体重/日) による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 8 mg/kg 体重/日 であると考えられた。(参照 52、128)

(3) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット)

Wistar Hannover ラット [1 年間慢性毒性試験群: 一群雌雄各 10 匹 (4,000 ppm 投与群のみ雌雄各 20 匹)、発がん性試験群: 一群雌雄各 50 匹] を用いた混餌投与 (原体: 0、40、400 及び 4,000 ppm: 平均検体摂取量は表 59 参照) による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

¹² 28 日間亜急性毒性試験 (イヌ) [7. (12)] において、10 mg/kg 体重/日投与群の 2 例中 2 例で死亡又は切迫と殺例が認められたこと、及び 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ) ② [7. (11)] において、最高用量 6 mg/kg 体重/日投与群で毒性影響は認められなかったことから、本試験の最高用量は 8 mg/kg 体重/日と設定された。8 mg/kg 体重/日の用量で投与が開始されたが、毒性兆候が認められなかつたことから、雌雄とも投与 27 週から 10 mg/kg 体重/日に変更、投与 32 週から雌雄各 4 匹中 2 匹で 16 mg/kg 体重/日に変更、投与 36 週から残りの雌雄各 2 匹も 16 mg/kg 体重/日に変更された。

表 59 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		40 ppm	400 ppm	4,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	慢性毒性試験群	雄	2.32	23.1
		雌	2.59	25.9
	発がん性試験群	雄	1.88	18.8
		雌	2.20	21.5

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表 60 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、4,000 ppm 投与群の雌雄で自発運動亢進、立毛等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 400 ppm（雄：18.8 mg/kg 体重/日、雌：21.5 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 52、129）

表 60-1 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見
(非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
4,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 自発運動亢進(投与 1～40 週)、立毛(投与 1～92 週)、接触時の発声(投与 1～5 週)、流涎(投与 1 週)及び痙攣(投与 1 週) 体重増加抑制(投与 1～6 週)及び摂餌量減少(投与 1～3 週) 網膜萎縮 	<ul style="list-style-type: none"> 自発運動亢進(投与 1～40 週)、立毛(投与 1～105 週)及び接触時の発声(投与 1～5 週) 体重増加抑制(投与 1～4 週)及び摂餌量減少(投与 1～3 週) 網膜萎縮
400 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

表 60-2 1年間慢性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見
(非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
4,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 自発運動亢進(投与 1～23 週)、立毛(投与 1～5 週)、流涎(投与 1 週)及び痙攣(投与 1 週) 体重増加抑制(投与 1～2 週)及び摂餌量減少(投与 1～2 週) 	<ul style="list-style-type: none"> 自発運動亢進(投与 1～15 週)、立毛(投与 1 週以降)及び接触時の発声(投与 1～5 週) 摂餌量減少(投与 1 週)
400 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（4）2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）

Wistar ラット（1年間慢性毒性試験群：一群雌雄各 10 匹、2年間慢性毒性試験群：一群雌雄各 20 匹、2年6か月間発がん性試験群：一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌投与（原体：0、40、140 及び 500 ppm：平均検体摂取量は表 61 参照）による 2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。本試験において、対照群及び 500 ppm 投与群の雌雄各 10 匹について、肝機能の指標とし

て BSP 排泄速度、腎機能の指標として PSP 排泄速度が測定された。また、一群雌雄各 10 匹について、脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性¹³、脳、肝臓、腎臓、血漿及び尿中のアンモニア濃度並びに肝臓及び全血中の還元型、酸化型及び総グルタチオン濃度が測定された。

表 61 2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		40 ppm	140 ppm	500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	慢性毒性試験群	雄	2.1	7.6
		雌	2.5	8.9
	発がん性試験群	雄	1.9	6.8
		雌	2.4	8.2
				28.7

BSP 及び PSP 排泄速度には検体投与による影響は認められなかった。グルタミン合成酵素活性は、脳では 500 ppm 投与群の雌で低下、肝臓では 140 ppm 以上投与群の雌雄で低下、腎臓では 140 ppm 以上投与群の雄及び 40 ppm 以上投与群の雌で増加が認められた。アンモニア濃度には検体投与による影響は認められなかった。グルタチオン濃度は、肝臓では 140 ppm 以上投与群の雄で酸化型の減少、同用量の雌で還元型及び総グルタチオン濃度の減少、全血中では、500 ppm 投与群の雄で還元型の減少及び酸化型の増加、140 ppm 以上投与群の雌で還元型の減少が認められた。

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表 62 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、140 ppm 以上投与群の雄で腎臓の絶対及び比重量増加が、雌で死亡率増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 40 ppm（雄：1.9 mg/kg 体重/日、雌：2.4 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、33）

表 62 2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見
(非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
500 ppm		・腎絶対及び比重量増加
140 ppm 以上	・腎絶対及び比重量増加	・死亡率増加(投与 130 週後)
40 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

（5）2年間発がん性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 60 匹）を用いた混餌投与（原体：0、1,000、5,000 及び 10,000 ppm：平均検体摂取量は表 63 参照）による 2 年間発がん性試験が実施された。

¹³ 投与 52 及び 104 週に測定された。

表 63 2年間発がん性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		1,000 ppm	5,000 ppm	10,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	45.4	229	466
	雌	57.1	282	579

10,000 ppm 投与群の雄において、稀な腫瘍である皮膚腫瘍（毛包腫）の発生頻度増加が認められたが、毛包由来と考えられる腫瘍（毛母腫、毛包上皮腫、毛包腫及び角化棘細胞腫）の発生頻度の合計に統計学的な有意差は認められず、これらの毛包系腫瘍の発現は投与に関連した影響ではないと考えられた。

本試験において、10,000 ppm 投与群の雌で背景データを超える網膜萎縮の発生頻度増加が、全投与群の雌雄で腎臓の絶対及び比重量増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 1,000 ppm 未満（雄：45.4 mg/kg 体重/日未満、雌：57.1 mg/kg 体重/日未満）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、33）

（6）18か月間発がん性試験（マウス）

NMRI マウス [主群：一群雌雄各 50 匹、衛星群（9 か月間投与）：一群雌雄各 10 匹] を用いた混餌投与（原体：0、50、200 及び 800 ppm：平均検体摂取量は表 64 参照）による 18 か月間発がん性試験が実施された。

表 64 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	200 ppm	800 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	主群	雄	7.25	28.3
		雌	7.85	32.0
	衛星群	雄	7.95	31.6
		雌	8.81	33.5

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、雄ではいずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められず、雌では 800 ppm 投与群で体重増加抑制（主群：投与 7 週以降、衛星群：投与 18 週以降）が認められたことから、無毒性量は雄で本試験の最高用量 800 ppm (113 mg/kg 体重/日)、雌で 200 ppm (32.0 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 52、130）

（7）2年間発がん性試験（マウス）

NMRI マウス（1 年間慢性毒性試験群：一群雌雄各 10 匹、2 年間発がん性試験群：一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌投与 [原体：0、20、80 及び 160 (雄)/320 (雌) ppm：平均検体摂取量は表 65 参照] による 2 年間発がん性試験が実

施された。本試験において、全血中及び肝臓中の還元型、酸化型及び総グルタチオン濃度が測定された。

表 65 2年間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群	20 ppm	80 ppm	160 ppm	320 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	2.8	10.8	22.6
	雌	4.2	16.2	64

/ : 実施されず

160 ppm 投与群の雄において、全血中の還元型及び総グルタチオン濃度の減少が認められた。肝臓中のグルタチオン濃度には検体投与による影響は認められなかった。

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表 66 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、160（雄）/320（雌） ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 80 ppm（雄：10.8 mg/kg 体重/日、雌：16.2 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。

（参照 2、3、14、17、33）

表 66 2年間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）

投与群	雄	雌
320 ppm		<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制（投与 3 日以降） Glu 及び AST 増加 脾絶対及び比重量増加
160 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 死亡率增加 体重増加抑制（投与 3 日以降） Glu 増加 	
80 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

/ : 実施せず

9. 神経毒性試験

（1）急性神経毒性試験（ラット）（FOB 観察）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口投与 [原体：0、10、100 及び 500 mg/kg 体重（有効成分換算¹⁴⁾、溶媒：蒸留水] による急性神経毒性試験（FOB 観察）が実施された。なお、本試験において、神経病理組織学的検査は実施されなかった。

本試験において、500 mg/kg 体重投与群の雌 1 例で、一般状態観察において円背位、頻呼吸、粗毛及びるい瘦（投与 2~4 日後）、FOB 観察において眼瞼

¹⁴ グルホシネート又は代謝物 Z を用いた毒性試験において、検体として水溶液が用いられ、投与量が有効成分換算されている場合は有効成分換算値を記載した（以下同じ。）。

下垂、頻呼吸、円背位及び立毛（投与 1 週後）が認められたことから、一般毒性に対する無毒性量は 100 mg/kg 体重であると考えられた。本試験は用量設定が低かったことから、神経毒性を検出できなかった。（参照 2、33）

（2）急性神経毒性試験（ラット）（水迷路試験）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口投与〔原体：0、10、100 及び 500 mg/kg 体重（有効成分換算）、溶媒：蒸留水〕による急性神経毒性試験（水迷路試験）が実施された。

神経病理組織学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、一般毒性に対する無毒性量は、本試験の最高用量 500 mg/kg 体重であると考えられた。神経毒性は認められなかった。神経毒性が認められない低用量においては水迷路試験に対する影響は検出できなかった。（参照 2、33）

（3）急性神経毒性試験（ラット）

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口投与（原体：0、300、600 及び 1,200 mg/kg 体重、溶媒：イオン交換水）による急性神経毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 67 に示されている。

本試験において、600 mg/kg 体重投与群の雌雄で自発運動亢進等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 300 mg/kg 体重であると考えられた。（参照 52、131）

表 67 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,200 mg/kg 体重	<ul style="list-style-type: none"> 死亡(1 例、投与 7 日)[脳(大脳皮質、海馬及び視床)神経細胞消失、下頸リンパ節及び胸腺リンパ球枯渇、心筋変性/線維化、腺胃粘膜壞死巣並びに肝臓、脾臓及び精囊・凝固腺の萎縮] 一般状態観察：立毛、軟便、自発運動亢進/低下^a、振戦、眼及び鼻分泌物並びに流涎 FOB：ケージからの取り出し困難、反応性亢進、立毛、流涎、覚醒レベル上昇、下痢、視覚(接近)反応消失及び低下並びに接触、聴覚及び痛覚反応亢進 体重増加抑制(投与 1~8 日)及び摂餌量減少(投与 1~8 日) 脳(大脳皮質及び視床)神経細胞消失 心筋変性/線維化 	<ul style="list-style-type: none"> 切迫と殺(1 例、投与 6 日)[脳(大脳皮質、海馬及び視床)神経細胞消失、胸腺リンパ球枯渇、心筋変性/線維化並びに肝臓及び脾臓の萎縮] 一般状態観察：立毛、軟便、自発運動亢進/低下^b、振戦、脱水及び会陰部の汚れ FOB：ケージからの取り出し困難、反応性亢進、立毛、覚醒レベル上昇、下痢並びに接触、聴覚及び痛覚反応亢進 脳(大脳皮質、海馬及び視床)神経細胞消失 心筋変性/線維化
600 mg/kg 体重以上	<ul style="list-style-type: none"> 一般状態観察：自発運動亢進 脳(海馬)の神経細胞消失 	<ul style="list-style-type: none"> 一般状態観察：自発運動亢進
300 mg/kg 体重	毒性所見なし	毒性所見なし

[]内は、死亡又は切迫と殺例で認められた病理組織学的所見

^a : 1,200 mg/kg 体重投与群の雄では、9 例に自発運動亢進、残りの 1 例に自発運動低下が認められた。

^b : 1,200 mg/kg 体重投与群の雌では、8 例に自発運動亢進、1 例に自発運動亢進（投与 2 日）及び自発運動低下（投与 3~6 日）、残りの 1 例に自発運動低下が認められた。

（4）5 週間亜急性神経毒性試験（ラット）

Wistar ラット（神経毒性観察群：一群雌雄各 10 匹、グルタミン合成酵素活性測定群：一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌投与 [原体：0、20、200 及び 2,000 ppm：平均検体摂取量（有効成分換算）は表 68 参照] による 5 週間亜急性神経毒性試験が実施された。本試験において、最終投与終了時に脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性が測定された。

表 68 5 週間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

被験物質		原体		
投与群		20 ppm	200 ppm	2,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.5	14.9	143
	雌	1.8	17.1	162

グルタミン合成酵素活性に関して、全投与群で肝臓（雌雄）及び腎臓（雄）で統計学的に有意な阻害が認められた。また、200 ppm 以上投与群の雄及び

2,000 ppm 投与群の雌では脳で統計学的に有意な阻害が認められた。

神経病理組織学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 2,000 ppm (雄: 143 mg/kg 体重/日、雌: 162 mg/kg 体重/日) であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。(参照 2、33)

(5) 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット)

Wistar Hannover ラット (一群雌雄各 10 匹) を用いた混餌投与 (原体: 0、100、500 及び 2,500 ppm: 平均検体摂取量は表 69 参照) による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

表 69 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群		100 ppm	500 ppm	2,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	7.94	39.9	198
	雌	8.60	42.7	210

各投与群で認められた毒性所見は表 70 に示されている。

神経病理組織学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、2,500 ppm 投与群の雌雄で自発運動亢進等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 500 ppm (雄: 39.9 mg/kg 体重/日、雌: 42.7 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 52、132)

表 70 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,500 ppm	<ul style="list-style-type: none">一般状態観察: 自発運動亢進(投与 7 日以降)及び立毛(投与 36 日以降)FOB: ケージからの取り出し困難(投与 1 か月以降)、反応性亢進(投与 2 週以降)、立毛(投与 2 か月以降)及び覚醒レベル上昇(投与 2 週)体重増加抑制(投与 1 週以降)及び摂餌量減少(投与 1 週以降)	<ul style="list-style-type: none">一般状態観察: 自発運動亢進(投与 7 日以降)FOB: ケージからの取り出し困難(投与 2 週以降)、反応性亢進(投与 2 週以降)、覚醒レベル上昇(投与 2 週以降)及び接触、聴覚及び痛覚反応亢進(投与 2 週)体重増加抑制(投与 1 週以降)及び摂餌量減少(投与 1 週以降)
500 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(6) 急性遅発性神経毒性試験

白色レグホン種ニワトリ (一群雌 6 羽) を用いた強制経口投与 (原体¹⁵: 0 及び 10,000 mg/kg 体重) による急性遅発性神経毒性試験が実施された。試験群

¹⁵ 検体として原体水溶液が用いられた。投与量は検体の用量。

として、検体投与群、検体投与前にアトロピン、トキソゴニンを翼下注射した解毒剤投与群、TOCP を経口投与した陽性対照群及び溶媒のみを投与した対照群が設定され、検体投与は 2 回（第 2 回投与は第 1 回投与 21 日後）行われた。

神経病理組織学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、検体投与群では解毒剤投与の有無に関係なく、投与に関連した変化は認められなかったことから、急性遅発性神経毒性誘発性はないものと考えられた。（参照 2、33）

（7）発達神経毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌 25 匹）の妊娠 6 日から分娩 21 日後まで混餌投与〔原体：0、200、1,000 及び 4,500 ppm：平均検体摂取量（有効成分換算）は表 71 参照〕して、発達神経毒性試験が実施された。

表 71 発達神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群	200 ppm	1,000 ppm	4,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	14	69	292

各投与群で認められた毒性所見は表 72 に示されている。

本試験において、1,000 ppm 以上投与群の母動物で体重増加抑制等が、児動物で自発運動量増加等が認められたことから、無毒性量は母動物及び児動物とも 200 ppm（14 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、33）

表 72 発達神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	母動物	児動物
4,500 ppm	・淡色便（妊娠 8～13 日）	・出生後死亡数增加
1,000 ppm 以上	・体重増加抑制（妊娠 7 日及び哺育 2～9 日） ^a ・摂餌量減少（妊娠 6～7 日以降）	・体重増加抑制 ・自発運動量及び移動運動量增加 ^b
200 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 4,500 ppm 投与群では妊娠 7 日以降に認められた。

^b : 4,500 ppm 投与群では雄で生後 17 及び 21 日、雌で生後 21 及び 61 日、1,000 ppm 投与群では雄で生後 21 日、雌で生後 21 及び 61 日に認められた。

10. 生殖発生毒性試験

（1）2 世代繁殖試験（ラット）①

Wistar ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌投与（原体：0、40、120 及び 360 ppm：平均検体摂取量は表 73 参照）による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 73 2世代繁殖試験（ラット）①の平均検体摂取量

投与群			40 ppm	120 ppm	360 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	2.7	8.1	24
		雌	4.2	12	36
	F ₁ 世代	雄	2.7	8.1	24
		雌	3	12	33

本試験において、親動物では雄で毒性影響が認められず、360 ppm 投与群の雌（P 及び F₁）で哺育期間中の摂餌量減少、児動物では 360 ppm 投与群の全世代で生産児数減少が認められたことから、無毒性量は親動物の雄で本試験の最高用量 360 ppm（P 雄：24 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：24 mg/kg 体重/日）、雌で 120 ppm（P 雌：12 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：12 mg/kg 体重/日）、児動物で 120 ppm（P 雄：8.1 mg/kg 体重/日、P 雌：12 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：8.1 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：12 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 2、33）

（2）2世代繁殖試験（ラット）②

Wistar Hannover ラット（一群雌雄各 25 匹）を用いた混餌投与（原体：0、40、120 及び 360 ppm：平均検体摂取量は表 74 参照）による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 74 2世代繁殖試験（ラット）②の平均検体摂取量

投与群			40 ppm	120 ppm	360 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	2.85	8.47	25.0
		雌	3.20	9.58	29.3
	F ₁ 世代	雄	4.02	11.9	35.7
		雌	4.49	12.9	39.1

本試験において、親動物では雄でいずれの投与群においても検体投与による毒性影響が認められず、360 ppm 投与群の雌で着床後胚損失率増加、児動物ではいずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は親動物の雄で本試験の最高用量 360 ppm（P 雄：25.0 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：35.7 mg/kg 体重/日）、雌で 120 ppm（P 雌：9.58 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：12.9 mg/kg 体重/日）、児動物では雌雄とも本試験の最高用量 360 ppm（P 雄：25.0 mg/kg 体重/日、P 雌：29.3 mg/kg 体重/日、F₁ 雄 35.7 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：39.1 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 52、133）

(3) 発生毒性試験（ラット）①

Wistar ラット（一群雌 20 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口投与（原体：0、10、50 及び 250 mg/kg 体重/日、溶媒：蒸留水）して、発生毒性試験が実施された。

全投与群の母動物で活動性の亢進（10 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 10 日以降、50 及び 250 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 8 日以降）が認められ、50 mg/kg 体重/日以上投与群では膿出血（50 及び 250 mg/kg 体重/日投与群とも妊娠 9 日以降）及び粗毛（50 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 6 日以降、250 mg/kg 体重/日投与群：妊娠 8 日以降）が、250 mg/kg 体重/日投与群では死亡（1 例、妊娠 15 日）、弛緩状態（妊娠 7 日以降）及び背部屈曲（妊娠 8 日以降）が認められた。

胎児では、全投与群で腎孟及び尿管の両部位の拡張の発生頻度増加がみられ、250 mg/kg 体重/日投与群では、統計学的に有意に増加した。

本試験において、10 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で活動性の亢進が、胎児で腎孟及び尿管の両部位の拡張の発生頻度増加が認められたことから、無毒性量は母動物及び胎児とも 10 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。（参照 2、17、33）

(4) 発生毒性試験（ラット）②

前述のラットを用いた発生毒性試験① [10. (3)] において、最低用量で母動物及び胎児に影響がみられ、無毒性量が得られなかつたことから、本試験は無毒性量を求める目的で追加試験として実施された。

Wistar ラット（一群雌 21～24 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口投与（原体：0、0.5、2.2 及び 10 mg/kg 体重/日、溶媒：蒸留水）して、発生毒性試験が実施された。

10 mg/kg 体重/日投与群において、母動物には試験① [10. (3)] で観察されたような臨床症状はみられず、胎児に腎孟及び尿管拡張は認められなかつた。

いずれの投与群の母動物及び胎児においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかつたことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 10 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかつた。（参照 2、33）

(5) 発生毒性試験（ラット）③

Wistar ラット（一群雌 20～25 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口投与（原体：0、0.5、2.2 及び 10 mg/kg 体重/日、溶媒：蒸留水）して、発生毒性試験が実施された。母動物には自然分娩させ、その後 21 日間児動物を哺育させた。

本試験において、いずれの投与群の母動物及び児動物においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかつたことから、無毒性量は母動物及び児動物とも本試験の最高用量 10 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認め

られなかった。 (参照 2、3、33)

＜発生毒性試験（ラット）①～③の総合評価＞

試験① [10. (3)] における 10 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物でみられた活動性亢進並びに胎児でみられた腎孟及び尿管の両部位の拡張の発生頻度増加について、10 mg/kg 体重/日を最高用量として実施された試験②及び③ [10. (4) 及び (5)] では認められなかったこと、試験① [10. (3)] の 50 mg/kg 体重/日投与群胎児で観察された腎孟及び尿管の両部位の拡張の発生頻度は、試験②及び③ [10. (3) 及び (4)] で再現性が認められなかった 10 mg/kg 体重/日投与群での頻度とほぼ同等であり、統計学的に有意な変化ではなかったことを考慮し、食品安全委員会はラットを用いた発生毒性試験①～③ [10. (3) ～ (5)] の総合評価として、無毒性量は母動物で 10 mg/kg 体重/日、胎児で 50 mg/kg 体重/日であると判断した。催奇形性は認められなかった。

（6）発生毒性試験（ラット）④

Wistar Hannover ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 5～19 日に強制経口投与（原体：0、10、20 及び 40 mg/kg 体重/日¹⁶、溶媒：イオン交換水）して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群の母動物及び胎児においても検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 40 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。 (参照 52、134)

（7）発生毒性試験（ウサギ）①

ヒマラヤウサギ（一群雌 15 匹）の妊娠 7～19 日に強制経口投与（原体：0、2、6.3 及び 20 mg/kg 体重/日、溶媒：蒸留水）して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、20 mg/kg 体重/日投与群の母動物で流産又は早産（2 例、妊娠 19 及び 24 日）及び体重増加抑制（妊娠 20 日）、胎児で死亡数増加¹⁷が認められたことから、無毒性量は母動物及び胎児とも 6.3 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。 (参照 2、14、17、33)

（8）発生毒性試験（ウサギ）②

NZW ウサギ（一群雌 24 匹）の妊娠 6～28 日に強制経口投与（原体：0、2.5、

¹⁶ 用量設定試験において、50 mg/kg 体重/日以上投与群で体重増加抑制及び妊娠率低下が認められたことから、本試験の最高用量は 40 mg/kg 体重/日と設定された。

¹⁷ 対照群と比較して統計学的に有意な差はなく、母動物毒性による二次的影響と考えられたことから、ARfD のエンドポイントとはしなかった。

5 及び 10 mg/kg 体重/日、溶媒：イオン交換水）して、発生毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 75 に示されている。

本試験において、10 mg/kg 体重/日投与群の母動物で流産、体重減少等、胎児で低体重が認められたことから、無毒性量は母動物及び胎児とも 5 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 52、135）

表 75 発生毒性試験（ウサギ）②で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
10 mg/kg 体重/日	<ul style="list-style-type: none">・流産(2 例、妊娠 18 及び 27 日)・体重減少(妊娠 6~12 日)、体重增加抑制(投与期間累積)及び摂餌量減少(妊娠 6 日以降)・妊娠子宮重量減少・後期胚吸收数増加	<ul style="list-style-type: none">・低体重[§]
5 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし	毒性所見なし

[§]：雄で統計学的有意差が認められ、雌では統計学的有意差が認められなかつたが、毒性影響と判断した。

1.1. 遺伝毒性試験

グルホシネートアンモニウム塩（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、出芽酵母を用いた遺伝子変換/DNA 修復試験、分裂酵母及びチャイニーズハムスター肺由来細胞（V79）を用いた遺伝子突然変異試験、マウスリンパ腫細胞を用いた前進突然変異試験、ヒト末梢血リンパ球及びハムスター卵巣由来細胞（CHO-K1）を用いた染色体異常試験、ラット初代培養肝細胞を用いた UDS 試験並びにマウスを用いた小核試験が実施された。

表 76 に示されているとおり、いずれの試験においても結果は全て陰性であったことから、グルホシネートアンモニウム塩（原体）に遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 2、3、33、52、136~138）

表 76 遺伝毒性試験概要 (原体)

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
in vitro	DNA 修復試験	<i>Bacillus subtilis</i> (H-17、M-45 株)	50~10,000 µg/ディスク
	遺伝子変換/DNA 修復試験	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (D4)	1,000~10,000 µg/プレート (+/-S9)
	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537、TA1538 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2hcr 株)	5~1,000 µg/プレート (+/-S9)
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	0.08~250 µg/プレート (+/-S9)
	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA/pKM101 株)	①6~600 µg/プレート (+/-S9) (プレート法) ②38~600 µg/プレート (+/-S9) (プレインキュベーション法)
	遺伝子突然変異試験	<i>Schizosaccharomyces pombe</i>	125~1,000 µg/mL (+/-S9)
	遺伝子突然変異試験 (<i>Hprt</i>)	チャイニーズハムスター 肺由来細胞 (V79)	625~10,000 µg/mL (-S9) (3 時間処理) 1,250~8,000 µg/mL (+S9) (3 時間処理)
	前進突然変異試験	マウスリンパ腫細胞 (L5178Y TK ^{+/})	50~5,000 µg/mL (+/-S9)
	染色体異常試験	ヒト末梢血リンパ球	1~1,000 µg/mL (+/-S9) (3 時間処理)
	染色体異常試験	ヒト末梢血リンパ球	46.4~10,000 µg/mL (+/-S9) (-S9: 24 時間処理、+S9: 2 時間処理)
in vivo	染色体異常試験	チャイニーズハムスター 卵巢由来細胞 (CHO-K1)	①200~2,000 µg/mL (+/-S9) (3 時間処理し、18 時間後採取) ②200~2,000 µg/mL (-S9) (21 時間処理後採取)
	UDS 試験	ラット初代培養肝細胞	26.2~5,240 µg/mL
	小核試験	NMRI マウス (骨髄細胞) (一群雌雄各 5 匹)	100、200 及び 350 mg/kg 体重 (単回経口投与 24、48 及び 72 時間後に採取)
	小核試験	NMRI マウス (骨髄細胞) (一群雌雄各 5 匹)	75、150 及び 300 mg/kg 体重/日 (24 時間間隔で 2 回経口投与 21~22 時間後に採取)

+/-S9: 代謝活性化系存在下及び非存在下

a: 500 µg/プレート以上で致死作用

12. 経皮投与、吸入ばく露等試験

(1) 急性毒性試験（腹腔内投与、皮下投与、経皮投与及び吸入ばく露）

グルホシネートアンモニウム塩（原体）を用いた急性毒性試験（腹腔内、皮下、経皮投与及び吸入ばく露）が実施された。

結果は表 77 に示されている。（参照 17、39、52、118～120、141）

表 77 急性毒性試験概要（腹腔内投与、皮下投与、経皮投与及び吸入ばく露、原体）

投与 経路	動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
腹腔内	Fischer ラット 雌雄各 10 匹 ^a	96	83	鎮静、接触に対する過敏反応、流涎、流涙、腹臥及び立毛 雌雄 : 58 mg/kg 体重以上で死亡例
	ICR マウス 雌雄各 10 匹 ^a	103	82	自発運動減少、間代性痙攣、腹臥、横臥、失調性歩行、立毛及び被毛光沢消失 雌雄 : 81 mg/kg 体重以上で死亡例
皮下	Fischer ラット 雌雄各 10 匹 ^a	73	61	鎮静、接触に対する過敏反応、流涎、流涙、腹臥及び立毛 雄 : 62 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 43 mg/kg 体重以上で死亡例
	ICR マウス 雌雄各 10 匹 ^a	88	104	自発運動減少、間代性痙攣、腹臥、横臥、失調性歩行、立毛及び被毛光沢消失 雄 : 62 mg/kg 体重以上で死亡例 雌 : 81 mg/kg 体重以上で死亡例
経皮	Wistar ラット 雌雄各 6 匹 ^b	>4,000	4,000	過敏反応、鎮静、痙攣、昏迷、平衡失調、うずくまり、爪先歩き、腹位、振戦、ひきつり、腹部退縮、腹側部退縮、痙攣性跳躍、拳尾、立毛、眼瞼拡大、流涎、血尿、攻撃的拳動、咀嚼行動及び削瘦 雄 : 死亡例なし 雌 : 2,000 mg/kg 体重以上で死亡例
	Wistar Hannover ラット 雌雄各 5 匹 ^b	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし

投与 経路	動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
吸入	Wistar ラット 雌雄各 5 匹 ^c	LC ₅₀ (mg/L)		眼瞼下垂、断続的振戻、間代性痙攣、機能亢進、立毛、流涎及び鎮静 雄 : 0.19 mg/L 以上で死亡例 雌 : 0.38 mg/L 以上で死亡例
	ラット ^d 系統、性別及び 匹数不明	0.62	0.62	詳細不明
	Wistar ラット 雌雄各 5 匹 ^{e, f}	>5.0	>5.0	努力呼吸、呼吸数増加、虚弱状態、活動性低下、興奮性亢進及び運動失調 雌で死亡例
	Wistar Hannover ラット 一群雌雄各 5 匹 ^e	3.88	3.88	嗜眠、自発運動亢進、背弯姿勢、立毛、鼻汁、横臥位、異常歩行(後肢の誇張、引きずり歩行及び後肢の反転)、流涎(軽度)及び振戻(軽度) 雌雄 : 2.46 mg/L 以上で死亡例
	Wistar ラット 一群雌雄各 5 匹 ^e	2.71	3.16	鼻汁、流涎(軽度～中等度)、運動失調(軽度)、反り返り、自発運動亢進 雌雄 : 1.75 mg/L 以上で死亡例

・溶媒として、^aは生理食塩水、^bは脱イオン水が用いられた。

^c : 4 時間ばく露 (ダスト)

^d : エアロゾル

^e : 4 時間ばく露 (エアロゾル)。

^f : 検体として原体水溶液が用いられた。結果の値は検体の濃度。

(2) 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

グルホシネートアンモニウム塩 (原体) の NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、ウサギの眼粘膜及び皮膚に対する刺激性は認められなかった。

ピルブライト白色種モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Buehler 法及び Maximization 法) 並びに Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Maximization 法) が実施され、結果は陰性であった。 (参照 2、14、33、52、121)

(3) 29 日間亜急性経皮毒性試験 (ラット)

Wistar ラット (一群雌雄各 12 匹、125 mg/kg 体重/日投与群のみ一群雌雄各 6 匹) を用いた経皮投与 (原体 : 0、125、250、500 及び 1,000 mg/kg 体重/日) による 29 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 78 に示されている。

本試験において、250 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で APTT 短縮が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 125 mg/kg 体重/日であると考えられた。
(参照 17)

表 78 29 日間亜急性経皮毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,000 mg/kg 体重/日	・鎮静状態、異常呼吸音、不規則呼吸、うずくまり、流涎、緊張性/間代性痙攣、振戦、活動低下、よろめき歩行、鼻及び眼瞼に血様物付着、皮膚への影響(荒れ、乾燥、硬化、変色)及び痂皮形成 ・表皮肥厚、過角化症及び潰瘍	・鎮静状態、異常呼吸音、不規則呼吸、うずくまり、流涎、緊張性/間代性痙攣、振戦、活動低下、よろめき歩行、鼻及び眼瞼に血様物付着、皮膚への影響(荒れ、乾燥、硬化、変色)及び痂皮形成 ・表皮肥厚、過角化症及び潰瘍
500 mg/kg 体重/日以上		・心比重量減少
250 mg/kg 体重/日以上	・APTT 短縮	・APTT 短縮
125 mg/kg 体重/日	毒性所見なし	毒性所見なし

（4）28 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）①

SD ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた鼻部吸入ばく露〔原体：0、50 及び 100 mg/m³（有効成分換算）、6 時間/日、5 日/週〕による 28 日間亜急性吸入毒性試験が実施された。

本試験において、100 mg/m³ ばく露群の雌雄で易刺激性、不穏及び活動性低下、反復性の頭部の動きが認められ、雌の 1 例は切迫と殺されたことから、無毒性量は雌雄とも 50 mg/m³ であると考えられた。（参照 2、33）

（5）28 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）②

Wistar ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた鼻部吸入ばく露（原体：0、12、25 及び 50 mg/m³、6 時間/日）による 28 日間亜急性吸入毒性試験が実施された。各投与群で認められた毒性所見は表 79 に示されている。

本試験において、25 mg/m³ 以上ばく露群の雄で鎮静状態、緊張性/間代性痙攣等が認められたことから、無毒性量は 12 mg/m³（雌に関する記載なし）であると考えられた。（参照 17）

表 79 28 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見

ばく露群	雄	雌
50 mg/m ³	・2 例死亡（肺炎並びに胸腺、骨髓及び脾臓萎縮）	・2 例死亡（肺炎並びに胸腺、骨髓及び脾臓萎縮） ・鎮静状態、緊張性/間代性痙攣、振戦、よろめき歩行、興奮、攻撃性及び血尿
25 mg/m ³ 以上	・鎮静状態、緊張性/間代性痙攣、振戦、よろめき歩行、興奮、攻撃性及び血尿	25 mg/m ³ 投与群の雌に関する記載なし
12 mg/m ³	毒性所見なし	毒性所見なし

13. その他の試験

（1）28 日間強制経口投与毒性及びメカニズム試験（イヌ）

イヌを用いた1年間慢性毒性試験①[8.(1)]において、375/250 ppm 投与群（雄：8.5 mg/kg 体重/日、雌：9.0 mg/kg 体重/日）で強直性/間代性痙攣などの症状がみられ死亡例もみられたことから、本試験は検体の中枢神経系への作用を含めた毒性発現機序を解明する目的で実施された。

ビーグル犬（一群雌雄各6匹）に原体を0、1又は8 mg/kg 体重/日の用量で、最初の1~18日は非標識体を、19~28日は¹⁴C-グルホシネートを反復カプセル経口投与して、一般毒性のほかに神経毒性検査、脳内伝達物質を含む各種物質の動態の測定、グルタミン合成酵素活性の測定が実施された。また、検体の組織中レベルの変化と生体恒常性の生理的変動との関連性をみるために、検体の体内分布及び代謝についても観察された。

その結果、8 mg/kg 体重/日投与群の雌雄の中脳及び小脳並びに同群雄の脊髄におけるグルタミン合成酵素活性の低下がみられた。

8 mg/kg 体重/日投与群の雌では、毒性影響として摂餌量減少傾向（投与1~2週）及び体重増加抑制（投与1~2週）が認められた。1 mg/kg 体重/日投与群では毒性学的に意義のある変化は認められず、無毒性量は雄で本試験の最高用量8 mg/kg 体重/日、雌で1 mg/kg 体重/日と考えられた。また、本試験の結果から神経伝達物質を含めた物質の動態又は検体の代謝分布に毒性発現を示唆する変化は得られず、本検体の毒性発現の作用機序の解明には至らなかった。（参照2、33）

（2）ラットにおける単回脳室内/静脈内投与後の脳内カテコールアミン及びグルタミン合成酵素測定（原体及び代謝物B）

高用量の原体をばく露したラット及びマウスで観察された1~4時間の潜伏期の後の痙攣に関連し、これらの潜伏期間中に脳の各部位におけるカテコールアミン濃度又はグルタミン合成酵素活性が静脈内投与又は脳室内投与により変化がみられるか否かについて検討された。また、主要代謝物であるBについても

同様の検討試験が実施された。

Wistar ラット（一群雄 2 匹）に、原体又は代謝物 B を 10 又は 20 μg の用量で脳室内投与し、投与 24 時間後まで症状観察が行われた。また、Wistar ラット（一群雄 5~6 匹）に、原体を 10 若しくは 20 μg 又は代謝物 B を 20 μg の用量で脳室内投与、又は原体を 0、10 若しくは 100 mg/kg 体重の用量で静脈内投与して、脳内カテコールアミン濃度及びグルタミン合成酵素活性が測定された。

その結果、原体の投与により、投与経路にかかわらず痙攣がみられた。しかし、原体の 20 μg の脳室内投与の場合のみ、痙攣発現に至るまでの潜伏期間に線条体のジヒドロキシフェニル酢酸の上昇、前頭葉のノルアドレナリンの低下がみられた。原体の 10 μg 以上の脳室内投与群でグルタミン合成酵素活性の低下がみられた。代謝物 B の投与では脳室内投与、静脈内投与ともに変化がみられなかった。（参照 2、33）

（3）ラットにおける単回経口投与後の各臓器におけるグルタミン合成酵素活性、グルタミン酸及びアンモニア濃度測定

Wistar ラット（一群雌 15~30 匹）に、原体を 0、200、800 又は 1,600 mg/kg 体重（溶媒：脱イオン水）の用量で単回強制経口投与し、投与 1、3 及び 7.5 日後に脳、肝臓及び腎臓におけるグルタミン合成酵素活性、アンモニア濃度及びグルタミン酸濃度並びに脳における AChE 活性が測定された。

1,600 mg/kg 体重投与群において死亡が 3 匹（投与 1~2 日後）で認められた。一般状態観察の結果、200 mg/kg 体重以上投与群で自発運動亢進（投与 1 日以後）が認められ、1,600 mg/kg 体重投与群では側腹部拘縮、傾眠等の症状が投与 1 日以後に認められた。

肝臓及び腎臓由来グルタミン合成酵素活性は、全投与群で投与 1 日後から統計学的に有意な阻害が認められ、脳由来グルタミン合成酵素活性は、1,600 mg/kg 体重投与群で投与 1 日後から統計学的に有意な阻害が認められた。アンモニア量に変化はなかったが、脳内グルタミン酸量の減少が 800 mg/kg 体重以上投与群で認められた。1,600 mg/kg 体重投与群で、肝臓中グルタミン酸量の増加が認められた。脳 AChE 活性に影響は認められなかった。また、グルタミン合成酵素の変化は脳、肝臓及び腎臓のいずれの臓器においても回復性を有することが示された。（参照 2、17、33）

（4）ラット及びマウスにおける単回経口投与後の各臓器におけるグルタミン合成酵素活性、アンモニア濃度、グルタミン酸及びグルタミン濃度測定

原体を、Wistar ラット（一群雌 5 匹）に 0、200 又は 800 mg/kg 体重（溶媒：脱イオン水）、NMRI マウス（一群雌 5 匹）に 0、50 又は 200 mg/kg 体重（溶媒：脱イオン水）の用量で単回経口投与し、投与 4 時間後に脳、心臓、肝臓及び腎臓におけるグルタミン合成酵素活性、アンモニア濃度並びにラットに

おけるこれら臓器中のグルタミン及びグルタミン酸濃度が測定された。

その結果、グルタミン合成酵素阻害は、検体投与群におけるマウス及びラットの腎臓並びに 800 mg/kg 体重投与群におけるラットの肝臓で顕著にみられたが、脳では変化は認められなかつた。アンモニア濃度はマウスの 200 mg/kg 体重投与群の肝臓のみで有意に上昇した。ラットにおけるグルタミン及びグルタミン酸濃度は、いずれの臓器にも変化はみられなかつた。

グルホシネートの高用量を投与した場合にみられる中枢神経に関連した毒性作用は、脳におけるグルタミン合成酵素阻害、アンモニア濃度及びグルタミン又はグルタミン酸濃度の変化によるものではないと考えられた。（参照 2、33）

（5）ラットにおける4週間混餌投与メカニズム試験

グルホシネートはグルタミン酸と構造が類似しており、グルタミン合成酵素阻害作用を有する。グルタミン酸は生体内エネルギー産生、アミノ酸生合成及び神経伝達において重要な役割を果たしていることから、本試験は以下の点を解明することを目的に実施された。

- ①グルタミン、グルタミン酸、グリシン、アスパラギン酸及びアラニンの生体内濃度に及ぼす影響
- ②グルタチオンの生体内濃度に及ぼす影響
- ③本検体の代謝物が α -ケトグルタル酸に類似していることによる糖新生及びクエン酸回路への影響
- ④脳内のアミノ酸系神経伝達物質及びカテコールアミンの濃度に及ぼす影響

Wistar ラット（一群雌雄各 40 匹）にグルホシネートを 4 週間混餌投与（原体：0、40、200、1,000 及び 5,000 ppm、平均検体摂取量は表 80 参照）して、メカニズム試験が実施された。

表 80 ラットにおける4週間混餌投与メカニズム試験の平均検体摂取量

投与群		40 ppm	200 ppm	1,000 ppm	5,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.7	18.7	93.5	443
	雌	3.7	18.3	89.4	424

その結果、グルタミン合成酵素阻害は、肝臓では 200 ppm 以上投与群の雌雄で最終投与終了時～7 日後に認められ、腎臓では 200 ppm 以上投与群の雄で最終投与終了 3～7 日後に認められた。また、脳では 5,000 ppm 投与群の雄で最終投与終了時～3 日後に認められた。5,000 ppm 投与群の雄では脳のグルタミン濃度が投与終了時に一時的に低下した。本酵素に関連する基質濃度の変化としては、投与終了時のグルタミン濃度のみに変化がみられ、肝臓では 200 ppm

以上投与群の雄、脳については 5,000 ppm 投与群の雄で低下がみられた。アンモニア濃度に影響はみられなかった。脳内のカテコールアミン濃度の変化もみられなかった。

したがって、グルホシネートの中枢神経刺激作用は、アンモニア又はグルタミン酸の蓄積によるものではなく、機序の解明には至らなかった。(参照 2、33)

(6) 原体の各種神経伝達物質受容体との *in vitro* 結合実験

原体の脳内神経伝達物質との相互作用の可能性について解析するために、ラット又はウシの脳を材料として脳神経シナプス部の膜画分(受容体を含む)を調製し、原体と種々の神経伝達物質受容体(GABA受容体、ノルアドレナリン受容体、ドーパミン受容体、セロトニン受容体、ベンゾジアゼピン受容体及びCaイオンチャネル)との *in vitro* での結合実験が実施された。

その結果、原体はこれらの神経伝達物質受容体について、競合阻害は起こさないものと判断された。(参照 2、33)

(7) ミトコンドリア画分における酸化的リン酸化に対する影響

グルホシネートはグルタミン酸の構造類似体である。グルタミン酸はクエン酸回路の基質のひとつであることから、原体のミトコンドリア画分(ラットの肝臓から調製)における酸化的リン酸化に対する影響について検討された。

その結果、原体はミトコンドリア画分におけるコハク酸、 α -ケトグルタル酸、グルタミン酸又はグルタミンを基質とした酸化的リン酸化に対して影響を及ぼさないものと判断された。(参照 2、33)

(8) AST、ALT、GGT 及び GLDH 活性に対する影響

グルホシネートアンモニウム塩及びその遊離酸体(10 mmol/L)の各種酵素に対する影響について、*in vitro* 検討試験が実施された

AST、ALT 及び GGT 活性はいずれの検体によっても影響を受けなかった。GLDH 活性は対照と比較して、グルホシネートで 19%、遊離酸体で 15% 低下した。(参照 2、33)

(9) 原体及び代謝物 Z の 90 日間混餌投与後のグルタミン合成酵素活性測定(ラット)

Wistar ラット(一群雄 10 匹)に原体[0、100 及び 1,000 ppm、平均検体摂取量(有効成分換算)は表 81 参照]又は代謝物 Z[0、1,000 及び 10,000 ppm、平均検体摂取量(有効成分換算)は表 81 参照]を 90 日間混餌投与して、投与 6、13、20 及び 90 日後並びに最終投与終了 30 日後の肝臓、脳及び腎臓由来グルタミン合成酵素活性が測定された。

表 81 原体及び代謝物 Z の 90 日間混餌投与後のグルタミン合成酵素活性測定における平均検体摂取量

投与群		100 ppm	1,000 ppm	10,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	原体	6.21	63.6	
	代謝物 Z		63.2	658

/ : 実施されず

投与 6 日後以降には、いずれの投与群においても肝臓及び腎臓由来グルタミン合成酵素活性阻害 (20%以上) が認められ、原体の 1,000 ppm 投与群では脳由来グルタミン合成酵素活性阻害 (9%~18%) が認められた。最終投与終了後 30 日間の回復期間で酵素活性の回復が認められた。(参照 2、17、33)

(10) グルタミン合成酵素活性阻害試験 (ラット)

Wistar ラット (一群雄 10 匹、11 週齢) の脳 (視床下部、延髄及び新皮質)、肝臓及び腎臓より抽出されたグルタミン合成酵素を用いて、グルホシネートアンモニウム塩 (0、0.003、0.008、0.026、0.077、0.26、0.77 及び 1.3 mmol/L) 及び代謝物 Z (0、0.13、0.38、0.63、1.3、6.3 及び 13 mmol/L) によるグルタミン合成酵素活性阻害試験が実施された。

いずれの組織の酵素においても、グルホシネートアンモニウム塩は用量相関性のある阻害を示し、腎臓を除く他の組織では 0.77 mmol/L 以上処理群で約 20%以上の阻害を示した。代謝物 Z では、肝臓由来グルタミン合成酵素の 13 mmol/L 処理群で 15%の阻害が認められたが、他の組織では 2%~7%の阻害しか認められなかった。(参照 17、33、41)

(11) 単回経口投与による血清中グルタミン濃度への影響検討試験 (ラット)

Wistar ラットに単回強制経口投与 (原体 : 0、200 mg/kg 体重) して、血清中グルタミン濃度に及ぼす影響について検討された。(参照 33、42)

① 非妊娠動物 (経時的变化)

非妊娠動物 (一群雌 4 匹、溶媒 : 0.5% メチルセルロース水溶液) を用いて、投与 1、2、4、8 及び 24 時間後に採血が行われた。

200 mg/kg 体重投与群において、血清中グルタミン濃度は経時的に減少する傾向が認められ、投与 4~24 時間後には対照群と比較して 24%~31% 減少した。

② 妊娠動物

妊娠動物 (一群雌 18 匹、溶媒 : 減菌水) を用いて、妊娠 6 日の投与 24 時間後 (妊娠 7 日) に採血が行われた。

200 mg/kg 体重投与群において、投与 1 日後の体重増加量が 63% 減少した。
200 mg/kg 体重投与群における血清中グルタミン濃度は対照群と比較して 21% 減少した。

(12) 28 日間免疫毒性試験 (ラット)

Wistar ラット (一群雄 10 匹) に混餌投与 [原体 : 0、500、2,000 及び 6,000 ppm : 平均検体摂取量 (有効成分換算) は表 82 参照] して、28 日間免疫毒性試験が実施された。投与 26 日に、全ての動物に SRBC が静脈内投与された。

表 82 28 日間免疫毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群	500 ppm	2,000 ppm	6,000 ppm	
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	36.4	147	428

500 ppm 以上投与群で、体重増加抑制 (投与 1~8 日以降) 及び摂餌量減少 (投与 8 日) が認められた。

いずれの投与群においても、検体投与による抗 SRBC 特異的 IgM 濃度、脾臓及び胸腺重量に影響は認められず、本試験条件下において免疫毒性は認められなかった。 (参照 33、43)

III. 安全性に係る試験の概要（代謝物）

1. 動物体内動態試験（経口投与、代謝物 B 及び Z）

（1）ラット（代謝物 B：植物体における主要代謝物）

Wistar ラット（一群雌 5 匹）に、¹⁴C-代謝物 B を 20 mg/kg 体重で単回経口投与又は単回静脈内投与して排泄試験が実施された。

尿及び糞中排泄率は表 83 に示されている。

経口及び静脈内投与群ともに、投与放射能は主に尿中に排泄された。両投与群における尿中排泄率に違いが認められなかったことから、代謝物 B は大部分が消化管から吸収されたものと考えられた。（参照 2、33）

表 83 尿及び糞中排泄率（代謝物 B）(%TAR)

投与方法	単回経口		単回静脈内	
	投与量	20 mg/kg 体重	20 mg/kg 体重	
時間	投与後 24 時間	投与後 96 時間	投与後 24 時間	投与後 96 時間
尿	80.8	89.4	85.9	91.7
糞	2.8	3.7	0.1	0.5
ケージ洗浄液	2.4	2.7	0.8	1.2
合計	86.0	95.8	86.8	93.4

（2）ラット（代謝物 Z：遺伝子組換え作物における主要代謝物）

① 吸収

a. 血中薬物動態学的パラメータ

Wistar ラット（一群雌雄各 3 匹）に¹⁴C-代謝物 Z を 3 mg/kg 体重で単回経口投与又は単回静脈内投与して、血中濃度推移について検討された。

血中薬物動態学的パラメータは表 84 に示されている。

単回経口投与群では、投与 1~1.2 時間後に C_{max} に達した後、速やかに消失した。投与 8 時間後には血中放射能濃度は 0.006 $\mu\text{g/g}$ に減少し、24 時間後には定量限界 (0.003 $\mu\text{g/g}$) 未満まで減少した。単回静脈内投与群においても血中放射能の減衰は非常に速やかであった。 $T_{1/2}$ は投与 5 分後の値 ($C_{5\text{min}}$) を基に算出された。（参照 2、17、33）

表 84 血中薬物動態学的パラメータ（代謝物 Z）

投与方法		単回経口		単回静脈内	
投与量		3 mg/kg 体重		3 mg/kg 体重	
性別		雄	雌	雄	雌
T _{max} (hr)		1	1.2	0.08	0.08
T _{1/2} (hr)	α 相	0.8	0.9	0.4	0.3
	β 相	6.3	7.4	12.9	15.4
AUC _{0-8h} (μg · hr/g)		0.150	0.122	3.51	3.69
AUC _{0-∞} (μg · hr/g)		0.214	0.192	3.66	3.86

^a : 静脈内投与群については、試料採取可能な最短時間であった投与 5 分後の値 (C_{5min}) を最大値とした。

b. 吸収率

尿及び糞中排泄試験 [1. (2)④] における静脈内及び経口投与群の尿中排泄率から算出された吸収率は、雌雄とも 5%～6% であり、消化管からの吸収は少なかった。（参照 2、33）

② 分布

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）に ¹⁴C-代謝物 Z を 3 mg/kg 体重で単回経口投与若しくは単回静脈内投与、又は 1,000 mg/kg 体重で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織中の残留放射能濃度は表 85 に示されている。

投与 96 時間後においては、ほぼ排泄が終了しており、体内残留放射能濃度は極めて低かった。特に経口投与群においては、吸収率が低く体内に取り込まれた放射能が少なかったことから、腎臓及び雌の肺で、ある程度の放射能が認められた以外は臓器中の放射能濃度は極めて低かった。

静脈内投与群においては、投与放射能の全てが体内に入ることから、全ての臓器・組織において経口投与群よりも高い放射能濃度を示した。分布は経口投与群と類似しており、腎臓で最も高い放射能が認められた。次いで肝臓、脾臓及び雄の生殖腺で比較的高い放射能が認められた。しかし、臓器・組織中の放射能は最大でも 0.06%TAR（静脈内投与群の雌の腎臓）に過ぎなかった。

また、全身オートラジオグラフィーの結果においても、両投与群ともに腎臓で最も高い放射能が認められ、他の臓器・組織中の濃度は極めて低く、上記の結果を支持するものであった。（参照 2、17、33）

表 85 主要臓器及び組織中の残留放射能濃度（代謝物 Z）（ $\mu\text{g/g}$ ）

投与方法	投与量	性別	投与 96 時間後	
単回 経口	3 mg/kg 体重	雄	腎臓(0.13)、生殖腺(0.01)、肝臓(0.005)、脾臓(0.003)、カーカス(0.002)、その他(検出限界未満)	
		雌	腎臓(0.06)、肺(0.04)、肝臓(0.01)、脾臓(0.004)、カーカス(0.002)、その他(検出限界未満)	
単回 静脈内	3 mg/kg 体重	雄	腎臓(0.2)、脾臓(0.04)、生殖腺(0.03)、肝臓(0.01)、その他(0.01 未満)	
		雌	腎臓(0.07)、脾臓(0.04)、肝臓(0.01)、その他(0.01 未満)	
投与 2 時間後			投与 96 時間後	
単回 経口	1,000 mg/kg 体重	雄	腎臓(152)、脾臓(86.2)、肝臓(9.9)、血漿(2.7)	肝臓(0.4)、その他(検出限界未満)
		雌	腎臓(37.0)、血漿(3.9)、肝臓(2.9)	肝臓(0.3)、その他(検出限界未満)

③ 代謝

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）に ^{14}C -代謝物 Z を 3 若しくは 1,000 mg/kg 体重で単回経口投与、又は Wistar ラット（雄 5 匹）に単回静脈内投与して、代謝物同定・定量試験が実施された。

尿、糞及び臓器等中における代謝物は表 86 に示されている。

経口投与群では、尿、糞とともに抽出放射能の大部分が未変化の代謝物 Z であった。主要代謝物は、尿中では代謝物 B であり、糞中ではグルホシネートであった。

消化管内容物中の放射能特性が検討された結果、投与 4 時間後においては、大部分の放射能（91.1%TAR）が腸管内に移動しており、胃部に残存している放射能は 3.6%TAR であった。抽出放射能のほぼ全てが未変化の代謝物 Z であり、代謝物としては、グルホシネート及び B が僅かに検出された。

静脈内投与群では、尿中の放射能は全て未変化の代謝物 Z であり、代謝物は全く認められなかった。糞中の放射能についても大部分が未変化の代謝物 Z であり、代謝物としてグルホシネートが少量検出された。

なお、本試験において排泄物中に認められたグルホシネートの脱アミノ体である代謝物 G は、被験物質の不純物由来である可能性が考えられた。

代謝物 Z のラットにおける主要代謝経路は、脱アセチル化によるグルホシネートの生成、それに続く酸化的脱アミノ化後の脱炭酸による代謝物 B の生成であると考えられた。（参照 2、17、33）

表 86 尿、糞及び臓器等中における代謝物（代謝物 Z）(%TAR)

投与方法	投与量	試料採取時間	試料	性別	代謝物Z	代謝物
単回 経口	3 mg/kg 体重	投与後 24 時間	尿	雄	3.5	B(0.6)、G(0.6)
				雌	6.6	B(0.7)、G(0.6)、グルホシネート(0.1)
		投与 4 時間後	糞	雄	68.2	グルホシネート(10.2)、D(1.0)、B(0.6)
				雌	68.4	グルホシネート(9.0)、D(0.7)、B(0.2)
	1,000 mg/kg 体重	投与後 24 時間	胃内容物	雄	3.6	—
			腸内容物	雄	87.1	グルホシネート(2.4)、G(0.7)、B(0.5)
			尿	雄	4.8	D(0.07)、B(0.05)、F(0.03)、G(0.02)
				雌	4.2	D(0.08)、B(0.05)、G(0.02)
単回 静脈 内	3 mg/kg 体重	投与後 24 時間	糞	雄	55.4	グルホシネート(0.4)、B(0.4)、D(0.08)
				雌	63.9	グルホシネート(0.7)、B(0.3)
			尿	雄	84.8	G(1.1)
			糞	雄	1.7	グルホシネート(0.1)、G(0.02)
		投与 24 時間後	腎臓	雄	0.01	グルホシネート(0.06)、B(0.001)
			肝臓	雄	0.1	グルホシネート(0.013)、B(0.006)

注) 検出された代謝物 G については、被験物質の不純物由来である可能性が考えられた。

— : 検出されず

④ 排泄

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）に ¹⁴C-代謝物 Z を 3 mg/kg 体重で単回経口若しくは単回静脈内投与、又は 1,000 mg/kg 体重で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与後 96 時間における尿及び糞中排泄率は表 87 に示されている。

経口投与された放射能は雌雄ともに主に糞中に排泄された。排泄は速やかであり、3 mg/kg 体重投与群では、24 時間後には 95%TAR 以上が糞中に排泄された。1,000 mg/kg 体重投与群での排泄は、3 mg/kg 体重投与群と比較して遅延し、投与後 24 時間での糞中排泄は雄雌ともに 60%TAR 程度であったが、投与後 96 時間では、雌雄とも投与放射能のほぼ全てが排泄物を通じて体外に排泄された。尿中排泄率は低く、投与後 96 時間における尿中排泄量は約 5%TAR～約 8%TAR であった。

静脈内投与された放射能は、雌雄ともに主に尿中に排泄された。排泄は速やかであり、投与後 4 時間で 85%TAR 以上が尿中に排泄された。一方、糞中排泄率は低く、投与後 96 時間における糞中排泄量は、雄で約 2%TAR、雌で約 4%TAR であった。（参照 2、17、33）

表 87 投与後 96 時間における尿及び糞中排泄率（代謝物 Z）（%TAR）

投与方法	単回経口		単回静脈内		単回経口	
投与量	3 mg/kg 体重		3 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	5.2	5.9	96.8	94.8	7.5	6.7
糞	97.5	109	1.8	4.1	88.9	87.7
ケージ洗浄液	0.05	0.1	0.1	0.3	2.5	3.3

2. 急性毒性試験等

（1）急性毒性試験（経口投与及び腹腔内投与、代謝物 B、F 及び Z）

代謝物 B、F 及び Z の急性毒性試験（経口投与及び腹腔内投与）が実施された。

結果は表 88 に示されている。（参照 17、52、139、141）

表 88 急性毒性試験概要（経口投与及び腹腔内投与、代謝物 B、F 及び Z）

被験物質	投与経路	動物種性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
			雄	雌	
代謝物 B	経口	Wistar ラット 雌雄各 5 匹 ^a	2,840	1,900	活動低下、歩行異常、呼吸異常及びうずくまり 雄: 2,500 mg/kg 体重以上で死亡例 雌: 1,600 mg/kg 体重以上で死亡例
		SD ラット 雌 6 匹 ^b		>2,000	自発運動低下、過敏症及び体重減少 死亡例なし
		NMRI マウス 雌雄各 5 匹 ^c	3,050	3,070	活動低下、うずくまり、立毛、呼吸不整及び歩行異常 雄: 2,500 mg/kg 体重以上で死亡例 雌: 2,000 mg/kg 体重以上で死亡例
	腹腔内	Wistar ラット	275	250~500	経口投与試験で認められた所見と類似した症状
代謝物 F	経口	SD ラット 雌雄各 5 匹 ^a	>2,000	>2,000	下痢 死亡例なし
代謝物 Z	経口	Wistar ラット 雌雄各 5 匹 ^a	>2,900 ^d	>2,900 ^d	不規則呼吸、うずくまり姿勢及び活動性低下 死亡例なし
		NMRI マウス 雌雄各 5 匹 ^a	>2,900 ^d	>2,900 ^d	活動性低下及びうずくまり姿勢 死亡例なし
	腹腔内	Wistar ラット	>1,160	>1,160	詳細不明
		NMRI マウス	>2,030	>579	詳細不明

注) 溶媒として、^aは脱イオン水、^bは蒸留水、^cは 2%でんぶん含脱イオン水が用いられた。

^d : 有効成分換算値

(2) 皮膚感作性試験（代謝物 B 及び Z）

代謝物 B 及び Z のピルブライト白色種モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施された。その結果、代謝物 B 及び Z のモルモットに対する皮膚感作性は陰性であった。（参照 2、17、33）

3. 亜急性毒性試験

(1) 28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 B）

Wistar ラット（一群雌雄各 5 匹）に混餌投与（代謝物 B: 0、50、500、2,500 及び 5,000 ppm、平均検体摂取量は表 89 参照）して 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 89 28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 B）の平均検体摂取量

投与群		50 ppm	500 ppm	2,500 ppm	5,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	5.6	57	286	554
	雌	5.5	55	282	561

本試験において、5,000 ppm 投与群の雄で血中尿酸値増加、雌で血中 TG 増加及び肝臓の比重量増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 2,500 ppm（雄：286 mg/kg 体重/日、雌：282 mg/kg 体重/日）であると考えられた。

（参照 17）

（2）90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 B）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（代謝物 B：0、400、1,600 及び 6,400 ppm、平均検体摂取量は表 90 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、0、1,600 及び 6,400 ppm 投与群には 4 週間回復群（一群雌雄各 10 匹）が設けられた。

表 90 90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 B）の平均検体摂取量

投与群		400 ppm	1,600 ppm	6,400 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	33.5	127	546
	雌	36.4	141	570

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 6,400 ppm（雄：546 mg/kg 体重/日、雌：570 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、17、33）

（3）90 日間亜急性毒性試験（マウス、代謝物 B）

NMRI マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（代謝物 B：0、320、1,600、3,200 及び 8,000 ppm、平均検体摂取量は表 91 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 91 90 日間亜急性毒性試験（マウス、代謝物 B）の平均検体摂取量

投与群		320 ppm	1,600 ppm	3,200 ppm	8,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	54.7	264	522	1,290
	雌	56.9	279	590	1,540

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 8,000 ppm

(雄：1,290 mg/kg 体重/日、雌：1,540 mg/kg 体重/日) であると考えられた。
(参照 2、33)

(4) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ、代謝物 B）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌投与（代謝物 B : 0、100、400 及び 1,600 ppm、平均検体摂取量は表 92 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、0、400 及び 1,600 ppm 投与群には 4 週間回復群（一群雌雄各 2 匹）が設けられた。本試験において、肝機能の指標として BSP 排泄速度が、腎機能の指標として PSP 排泄速度がそれぞれ測定され、最終投与終了時及び回復期間終了時に脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性が測定された。

表 92 90 日間亜急性毒性試験（イヌ、代謝物 B）の平均検体摂取量

投与群	100 ppm	400 ppm	1,600 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 7.3	29.5	115
	雌 6.4	25.4	103

脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性並びに BSP 及び PSP 排泄速度に検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,600 ppm (雄：115 mg/kg 体重/日、雌：103 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 2、10、17、33）

(5) 90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 F）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（代謝物 F : 0、500、2,000 及び 10,000 ppm、平均検体摂取量は表 93 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 93 90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 F）の平均検体摂取量

投与群	500 ppm	2,000 ppm	10,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 34	140	684
	雌 38	156	772

本試験において、いずれの投与群においても投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 10,000 ppm (雄：684 mg/kg 体重/日、雌：772 mg/kg 体重/日) であると考えられた。（参照 2、33）

(6) 90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 Z）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与〔代謝物 Z : 0、400、2,000 及び 10,000 ppm、平均検体摂取量（有効成分換算）は表 94 参照〕による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、0、2,000 及び 10,000 ppm 投与群には 4 週間回復群（一群雌雄各 10 匹）が設けられた。本試験において、最終投与終了時及び回復期間終了時に脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性が測定された。

表 94 90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 Z）の平均検体摂取量

投与群		400 ppm	2,000 ppm	10,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	29.1	147	738
	雌	31.7	162	800

グルタミン合成酵素活性について、脳では 2,000 ppm 以上投与群の雄及び 10,000 ppm 投与群の雌、肝臓では 400 ppm 以上投与群の雌雄、腎臓では 400 ppm 以上投与群の雄において、統計学的に有意な低下が認められた。いずれの活性についても回復群においては回復傾向が認められた。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 10,000 ppm（雄 : 738 mg/kg 体重/日、雌 : 800 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参考 2、33）

(7) 90 日間亜急性毒性試験（マウス、代謝物 Z）

NMRI マウス（一群雌雄各 20 匹）を用いた混餌投与〔代謝物 Z : 0、500、2,000 及び 8,000 ppm、平均検体摂取量（有効成分換算）は表 95 参照〕による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。本試験において、最終投与終了時に脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性が測定された。

表 95 90 日間亜急性毒性試験（マウス、代謝物 Z）の平均検体摂取量

投与群		500 ppm	2,000 ppm	8,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	82.9	324	1,300
	雌	110	436	1,740

グルタミン合成酵素活性は、脳では 500 ppm 以上投与群の雄及び 2,000 ppm 以上投与群の雌、肝臓では 2,000 ppm 以上投与群の雌雄、腎臓では 500 ppm 以上投与群の雌雄において、統計学的に有意に低下した。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は

認められなかつたことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 8,000 ppm (雄: 1,300 mg/kg 体重/日、雌: 1,740 mg/kg 体重/日) であると考えられた。
(参照 2、33)

(8) 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ、代謝物 Z)

ビーグル犬 (一群雌雄各 4 匹) を用いた混餌投与 [代謝物 Z: 0、500、2,000 及び 8,000 ppm、平均検体摂取量 (有効成分換算) は表 96 参照] による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。なお、全投与群において 4 週間回復群 (一群雌雄各 2 匹) が設けられた。本試験において、最終投与終了時及び回復期間終了時に脳 (大脳皮質、中脳、小脳及び脳幹部)、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性が測定された。

表 96 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ、代謝物 Z) の平均検体摂取量

投与群	500 ppm	2,000 ppm	8,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 18.8	72.3	289
	雌 20.6	79.0	300

グルタミン合成酵素活性については、脳では 2,000 ppm 以上投与群の雌雄、肝臓では 500 ppm 以上投与群の雄及び 2,000 ppm 以上投与群の雌において統計学的有意に低下した。腎臓では影響は認められなかつた。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかつたことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 8,000 ppm (雄: 289 mg/kg 体重/日、雌: 300 mg/kg 体重/日) であると考えられた。
(参照 2、33)

4. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1 年間慢性毒性試験 (イヌ、代謝物 Z)

ビーグル犬 (一群雌雄各 6 匹) を用いた混餌投与 [代謝物 Z: 0、100、1,000 及び 8,000 ppm、平均検体摂取量 (有効成分換算) は表 97 参照] による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

表 97 1 年間慢性毒性試験 (イヌ、代謝物 Z) の平均検体摂取量

投与群	100 ppm	1,000 ppm	8,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄 4.0	44	325
	雌 4.3	43	346

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められなかつたことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 8,000 ppm

(雄 : 325 mg/kg 体重/日、雌 : 346 mg/kg 体重/日) であると考えられた。 (参考 2、33)

(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、代謝物 Z)

SD ラット [1 年間慢性毒性試験群 : 一群雌雄各 10 匹、2 年間発がん性試験群 : 一群雌雄各 70 匹、2 年間衛星試験群 (血液及び尿採取用) : 一群雌雄各 20 匹] を用いた混餌投与 [代謝物 Z : 0、200、2,000 及び 20,000 ppm、平均検体摂取量 (有効成分換算) は表 98 参照] による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表 98 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、代謝物 Z) の平均検体摂取量

投与群		200 ppm	2,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	9	91	998
	雌	11	108	1,210

各投与群で認められた毒性所見 (非腫瘍性病変) は表 99 に示されている。検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。本試験において、20,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 2,000 ppm (雄 : 91 mg/kg 体重/日、雌 : 108 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。 (参考 2、33)

表 99 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット、代謝物 Z) で認められた
毒性所見 (非腫瘍性病変)

投与群	雄	雌
20,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 軟便、摂餌量増加、体重増加抑制 腎絶対及び比重量増加 腎孟結石 脾臓髓外造血亢進 	<ul style="list-style-type: none"> 軟便、摂餌量増加、体重増加抑制 腎絶対及び比重量増加 腎孟結石 脾臓髓外造血亢進
2,000 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

(3) 2年間発がん性試験 (マウス、代謝物 Z)

ICR マウス (1 年間慢性毒性試験群 : 一群雌雄各 20 匹、2 年間発がん性試験群 : 一群雌雄各 70 匹) を用いた混餌投与 [代謝物 Z : 0、100、1,000 及び 8,000 ppm、平均検体摂取量 (有効成分換算) は表 100 参照] による 2 年間発がん性試験が実施された。

表 100 2年間発がん性試験（マウス、代謝物 Z）の平均検体摂取量

投与群		100 ppm	1,000 ppm	8,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	15	148	1,190
	雌	19	187	1,460

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 8,000 ppm（雄：1,190 mg/kg 体重/日、雌：1,460 mg/kg 体重/日）と考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、33）

5. 神経毒性試験

（1）急性神経毒性試験（ラット、代謝物 Z）（FOB 観察）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口投与 [代謝物 Z : 0、100、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重（有効成分換算）、溶媒：蒸留水] による急性神経毒性試験が実施された。なお、本試験において、神経病理組織学的検査は実施されなかった。

2,000 mg/kg 体重投与群の雌雄において、一般状態観察で鎮静、立毛及び下痢が認められたことから、一般毒性における無毒性量は 1,000 mg/kg 体重であると考えられた。（参照 33）

（2）急性神経毒性試験（ラット、代謝物 Z）（水迷路試験）

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口投与 [代謝物 Z : 0、100、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重（有効成分換算）、溶媒：蒸留水] による急性神経毒性試験が実施された。

神経病理組織学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

水迷路試験では、検体投与による影響は認められなかった。2,000 mg/kg 体重投与群の雌雄において、一般状態観察で鎮静、立毛及び下痢が認められたことから、一般毒性における無毒性量は 1,000 mg/kg 体重であると考えられた。

（参照 33）

（3）5週間亜急性神経毒性試験（ラット、代謝物 Z）

Wistar ラット（神経毒性観察群：一群雌雄各 10 匹、グルタミン合成酵素活性測定群：一群雌雄各 5 匹）を用いた混餌投与 [代謝物 Z : 0、20、200 及び 2,000 ppm : 平均検体摂取量（有効成分換算）は表 101 参照] による 5 週間亜急性神経毒性試験が実施された。本試験において、最終投与終了時に脳、肝臓及び腎臓のグルタミン合成酵素活性が測定された。

表 101 5 週間亜急性神経毒性試験（ラット、代謝物 Z）の平均検体摂取量

投与群		20 ppm	200 ppm	2,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.6	15.5	159
	雌	1.75	17.7	179

グルタミン合成酵素活性に関して、代謝物 Z では阻害の程度は軽く、肝臓（200 ppm 以上投与群の雄及び 2,000 ppm 投与群の雌）及び腎臓（20 及び 2,000 ppm 投与群）で統計学的な有意差が認められた。

神経病理組織学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 2,000 ppm（雄：159 mg/kg 体重/日、雌：179 mg/kg 体重/日）であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。（参照 2、33）

6. 生殖発生毒性試験

（1）2 世代繁殖試験（ラット、代謝物 Z）

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）に混餌投与〔代謝物 Z : 0、200、2,000 及び 10,000 ppm、平均検体摂取量（有効成分換算）は表 102 参照〕による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 102 2 世代繁殖試験（ラット、代謝物 Z）の平均検体摂取量

投与群			200 ppm	2,000 ppm	10,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	13.4	137	702
		雌	17.5	173	890
	F ₁ 世代	雄	16.1	162	821
		雌	19.3	197	1,010

本試験において、いずれの投与群の親動物及び児動物においても検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は親動物及び児動物とも本試験の最高用量 10,000 ppm（P 雄：702 mg/kg 体重/日、P 雌：890 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：821 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：1,010 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 2、33）

（2）発生毒性試験（ラット、代謝物 B）

Wistar ラット（一群雌 20 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口投与（代謝物 B : 0、100、300 及び 900 mg/kg 体重/日、溶媒：蒸留水）して、発生毒性試験が実施された。

900 mg/kg 体重/日投与群の母動物で、死亡が 1 例、排尿行動増加、立毛、体

重増加抑制、腎絶対重量増加、全同腹児死亡（3腹）が認められた。同群の胎児では、波状肋骨及び肋骨肥厚の発生頻度が有意に増加（14.6%）したが、この発生頻度は背景データ（0%～18.6%）の範囲内であり、また、この変異を持つ胎児を有する母動物数（各群4～6例）には有意な増加はみられなかったことから、これは検体投与によるものとは考えられなかった。

本試験において、900 mg/kg 体重/日投与群の母動物で体重増加抑制等が認められ、胎児には毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物で300 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 900 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照2、33）

（3）発生毒性試験（ウサギ、代謝物B）

ヒマラヤウサギ（一群雌15匹）の妊娠6～18日に強制経口投与（代謝物B：0、50、100及び200 mg/kg 体重/日、溶媒：蒸留水）して、発生毒性試験が実施された。

100 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で、糞排泄減少、うずくまり、赤色尿排泄、摂餌及び飲水行動減少が認められ、100 mg/kg 体重/日投与群では流産が1例、死亡が1例、200 mg/kg 体重/日投与群では流産が4例、死亡が5例認められた。胎児ではいずれの投与群においても毒性影響は観察されなかった。

本試験において、100 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で流産、死亡等が認められ、胎児では検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物で50 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量200 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照2、33）

（4）発生毒性試験（ラット、代謝物Z）

Wistarラット（一群雌20～21匹）の妊娠6～15日に強制経口投与〔代謝物Z：0及び1,000 mg/kg 体重/日（有効成分換算）、溶媒：脱イオン水〕し、発生毒性試験が実施された。

本試験において、母動物及び胎児に検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照2、17、33）

（5）発生毒性試験（ウサギ、代謝物Z）

ヒマラヤウサギ（一群雌15匹）の妊娠6～18日に強制経口投与〔代謝物Z：0、64、160及び400 mg/kg 体重/日（有効成分換算）、溶媒：蒸留水〕して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、160 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物で摂餌量減少が、胎児で片側性又は両側性の腰肋の発生頻度増加が認められたことから、無毒性量は母動物及び胎児とも64 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認め

られなかった。（参照 2、5、17、33）

7. 遺伝毒性試験（代謝物 B、F 及び Z）

代謝物 B（動物、植物、土壤及び水中由来）、F（動物、植物及び土壤由来）及び Z（動物及び植物由来）について、*in vitro* では細菌を用いた復帰突然変異試験、分裂酵母を用いた前進突然変異試験、チャイニーズハムスター肺由来細胞（V79）を用いた遺伝子突然変異試験及び染色体異常試験、ヒト A549 細胞を用いた UDS 試験並びにヒト末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験、*in vivo* ではチャイニーズハムスターを用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験が実施された。

表 103 に示されているとおり、いずれの試験においても結果は全て陰性であったことから、代謝物 B、F 及び Z に遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 2、17、33、40、52、140）

表 103 遺伝毒性試験概要（代謝物）

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
代謝物 B	<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験 <i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、 TA1535、TA1537、 TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	4～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性 ^a
		復帰突然変異試験 <i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、 TA1535、TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	313～5,000 µg/プレート (-S9) 156～5,000 µg/プレート (+S9) (プレインキュベーション法)	陰性
		前進突然変異試験 <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (<i>P1</i> 株)	313～10,000 mg/mL (+/-S9)	陰性
		遺伝子突然変異試験 (<i>Hprt</i>) チャイニーズハムスター肺由来細胞 (V79)	100～1,000 µg/mL (+/-S9)	陰性
		UDS 試験 ヒト A549 細胞	1～2,000 µg/mL (+/-S9)	陰性
	染色体異常試験 ヒト末梢血リンパ球	0.1～1.52 mg/mL : 4 時間処理、 24 時間後標本作製 (+/-S9) 1.52 mg/mL : 4 時間処理、48 時間後標本作製 (+/-S9)	陰性	
<i>in vivo</i>	染色体異常試験 チャイニーズハムスター(骨髄細胞) (一群雌雄各 6 匹)	0、100、333、1,000 mg/kg 体重 (単回経口投与)	陰性	

被験物質	試験		対象	処理濃度・投与量	結果
	小核試験		NMRI マウス (骨髓細胞) (一群雌雄各 5 匹)	0、200、600、2,000 mg/kg 体重 (単回経口投与)	陰性
代謝物 F	in vitro	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、 TA1535、TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	1.6~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
		染色体異常試験	ヒト末梢血リンパ球	24.3~1,820 µg/mL : 3 時間処理 (+/-S9) 100~1,820 µg/mL : 20 時間処理 (-S9) 24.3~1,820 µg/mL : 20 時間処理 (+S9)	陰性
代謝物 Z	in vitro	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、 TA1535、TA1537、 TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	2.3~5,820 µg/プレート (+/-S9)	陰性
		遺伝子突然変異試験	チャイニーズハムスター 肺由来細胞 (V79)	582~1,550 µg/mL (+/-S9)	陰性
		遺伝子突然変異試験 (<i>Hprt</i>)	チャイニーズハムスター 肺由来細胞 (V79)	444~1,190 µg/mL (+/-S9)	陰性
		UDS 試験	ヒト A549 細胞	1.3~1,330 µg/mL (+/-S9)	陰性
		UDS 試験	ヒト A549 細胞	0.6~582 µg/mL (+/-S9)	陰性
		染色体異常試験	ヒト末梢血リンパ球	0.6~5.0 mg/mL : 24 時間 (+/-S9) 5.0 mg/mL : 48 時間 (+/-S9)	陰性
		染色体異常試験	ヒト末梢血リンパ球	3~5,000 mg/mL (-S9) 3~4,750 mg/mL (+S9) (4 時間処理、24 及び 48 時間後標本作製)	陰性
		染色体異常試験	チャイニーズハムスター 肺由来細胞 (V79)	1,550 µg/mL : 4 時間処理、7 及び 28 時間後標本作製 (+/-S9) 155~1,550 µg/mL : 4 時間処理、18 時間後標本作製 (+/-S9)	陰性
	in vivo	小核試験	NMRI マウス (骨髓細胞) (一群雌雄各 5 匹)	222~2,220 mg/kg 体重 (単回経口投与 24、48 及び 72 時間後に骨髓採取)	陰性

+/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

a : 500 µg/プレート以上で弱い抗菌性あり

IV. 食品健康影響評価

参考に挙げた資料を用いて農薬「グルホシネート」の食品健康影響評価を実施した。第6版の改訂に当たっては、消費者庁から作物残留試験（国内：小麦、たまねぎ等、海外：綿実及びホップ）、90日間亜急性神経毒性試験（ラット）、発生毒性試験（ラット及びウサギ）の成績等が新たに提出された。

^{14}C で標識したグルホシネートの植物代謝試験の結果、非遺伝子組換え作物における主要代謝物はBであり、ほかに代謝物Cが10%TRRを超えて認められた。グルホシネート耐性遺伝子組換え作物における主要代謝物はZであり、遺伝子組換え作物に特有であった。また、非遺伝子組換え作物と同様の代謝物B及びFも10%TRRを超えて認められた。

国内におけるグルホシネート及び代謝物Bを分析対象化合物とした作物残留試験の結果、最大残留値はグルホシネートが0.56 mg/kg（だいず乾燥子実）であり、代謝物Bが0.17 mg/kg（稻わら）、可食部で0.16 mg/kg（さんしょう果実）であった。海外におけるグルホシネート並びに代謝物B及びZを分析対象化合物とした作物残留試験の結果、最大残留値はグルホシネートが0.262 mg/kg（ホップ乾花）、代謝物Bが0.872 mg/kg（綿実）〔グルホシネート（遊離酸体）換算値〕、代謝物Zが7.43 mg/kg（綿実）〔グルホシネート（遊離酸体）換算値〕であった。

^{14}C で標識したグルホシネートのヤギ及びニワトリを用いた家畜代謝試験の結果、主要残留成分はグルホシネート及び代謝物Bであった。また、 ^{14}C で標識した代謝物Zのヤギ及びニワトリでの家畜代謝試験の結果、主要残留成分はグルホシネート並びに代謝物B及びZであった。

グルホシネート及び代謝物Bを分析対象化合物とした乳汁移行試験、畜産物残留試験の結果、乳汁におけるグルホシネートの最大残留値は0.03 $\mu\text{g/g}$ であり、代謝物Bはいずれも定量限界（0.02 $\mu\text{g/g}$ ）未満であった。卵におけるグルホシネートの最大残留値は0.07 $\mu\text{g/g}$ であり、代謝物Bはいずれも定量限界（0.05 $\mu\text{g/g}$ ）未満であった。臓器及び組織中における最大残留値は、グルホシネートは0.25 $\mu\text{g/g}$ （ニワトリ腎臓）、代謝物Bは10.7 $\mu\text{g/g}$ （ウシ肝臓）であった。

^{14}C で標識したグルホシネートのラットを用いた動物体内動態試験の結果、経口投与されたグルホシネートの吸収率は雄で6.9%～30.7%、雌で7.8%～27.5%と算出され、ほとんどが未変化のグルホシネートとして主に糞中に排泄された。体内に吸収されたグルホシネートは主に腎臓、肝臓及び脾臓に分布し、経時的に減少した。主要代謝物はB、G及びZであった。 ^{14}C で標識した代謝物B及びZのラットを用いた動物体内動態試験では、Bの消化管吸収率は高く90%程度であったが、Zの吸収率は5%～6%と低かった。

各種毒性試験結果から、グルホシネート投与による影響は、主に中枢神経系（鎮静、円背位、自発運動亢進等）、腎臓（重量増加等）及び血液（貧血等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認めら

れなかつた。

中枢神経系への影響については、本剤のグルタミン合成酵素活性阻害が関連している可能性が示唆され、メカニズム試験が実施された。その結果、中枢神経系の病理組織学的変化又は神経症状の変化と、グルタミン合成酵素活性低下並びにアンモニア及びグルタミン酸の蓄積との関係性は明らかにならなかつた。

植物代謝試験及び家畜代謝試験の結果、代謝物 B、C、F 及び Z が 10%TRR を超えて認められた。これらの代謝物のうち、代謝物 C はラットにおいて認められず、稻わらにおいてのみ 10%TRR を超えて認められたが、植物代謝試験及び作物残留試験の結果から、残留値は僅かと考えられた。代謝物 F は、とうもろこしの穂軸及び皮でのみ 10%TRR を超えて認められ、急性毒性試験及び亜急性毒性試験の結果から毒性はグルホシネートより弱く、遺伝毒性試験の結果は陰性であった。植物における主要代謝物 B のラット及びウサギを用いた発生毒性試験において毒性影響がみられた。また、グルホシネート耐性遺伝子組換え作物の主要代謝物 Z のラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験において、グルホシネートと同様に腎臓への影響がみられ、ウサギを用いた発生毒性試験においても毒性影響が認められた。これらの毒性影響はいずれもグルホシネートより弱いものであったが、代謝物 B 及び Z は植物代謝試験又は作物残留試験及び家畜代謝試験又は畜産物残留試験においてグルホシネートより高い残留が認められる場合があることから、農産物及び畜産物中のがく露評価対象物質をグルホシネート並びに代謝物 B 及び Z と設定した。

各試験における無毒性量等は表 104 に、単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等は表 105 にそれぞれ示されている。

ラットを用いた 90 日間亜急性毒性試験②及び 2 年間発がん性試験において無毒性量が設定できなかつたが、より低用量で実施されたラットを用いた 2 年 6 か月間慢性毒性/発がん性併合試験で無毒性量（雄：1.9 mg/kg 体重/日、雌：2.4 mg/kg 体重/日）が得られていることから、ラットにおける無毒性量は得られていると考えられた。

マウスを用いた 90 日間亜急性毒性試験②において無毒性量が設定できなかつたが、より低用量で実施されたマウスを用いた 90 日間亜急性毒性試験①及び 2 年間発がん性試験において無毒性量が得られていることから、マウスにおける無毒性量は得られていると考えられた。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値はイヌを用いた 28 日間強制経口投与毒性及びメカニズム試験の雌の 1 mg/kg 体重/日であり、最小毒性量は 8 mg/kg 体重/日であった。より長期の試験であるイヌを用いた 90 日間亜急性毒性試験①の無毒性量は雄で 2.1 mg/kg 体重/日、雌で 2.0 mg/kg 体重/日、1 年間慢性毒性試験①の無毒性量は雄で 5.0 mg/kg 体重/日、雌で 5.5 mg/kg 体重/日であり、各試験における無毒性量の差は用量設定の違いによるもので、イヌにおける無毒性量は 5.0 mg/kg 体重/日であると考えられた。

以上のことから、食品安全委員会は、各動物種で得られた無毒性量のうち最小

値は、ラットを用いた2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験の1.9 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.019 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量(ADI)と設定した。

また、グルホシネートの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験②の無毒性量5 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.05 mg/kg 体重を急性参考用量(ARfD)と設定した。

ADI	0.019 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2年6か月間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	1.9 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD	0.05 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	発生毒性試験②
(動物種)	ウサギ
(期間)	妊娠6~28日
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	5 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

<参考>

< JMPR (2012年) >

ADI	0.01 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	強制経口投与毒性及びメカニズム試験
(動物種)	イヌ
(期間)	28日間
(投与方法)	カプセル経口
(無毒性量)	1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD	0.01 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	強制経口投与毒性及びメカニズム試験
(動物種)	イヌ

(期間)	28 日間
(投与方法)	カプセル経口
(無毒性量)	1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

<EPA (2017 年) >

cRfD	0.006 mg/kg 体重/日
(cRfD 設定根拠資料)	グルタミン合成酵素活性測定 ^a
(動物種)	ラット
(期間)	90 日間
(投与方法)	混餌
(最小毒性量)	6 mg/kg 体重/日
(不確実係数)	1,000 ^b

^a : Weight of Evidence (WOE) approachに基づき、ラットの亜急性及び慢性毒性試験において、最小毒性量で脳のグルタミン合成酵素活性阻害がみられること、イヌの慢性毒性試験において、最小毒性量で心電図の変化と死亡がみられること、ラットの発達神経毒性試験において、最小毒性量で脳の形態計測的変化がみられたことが考慮された。

^b : ラットの発達神経毒性試験において無毒性量が得られていないことから、追加の不確実係数 10 が考慮された。

aRfD (一般の集団) 設定の必要なし

aRfD (13~49 歳の女性)	0.063 mg/kg 体重
(aRfD 設定根拠資料)	発生毒性試験
(動物種)	ウサギ
(期間)	妊娠 7~19 日
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	6.3 mg/kg 体重/日
(不確実係数)	100

<APVMA (2024 年) >

ADI	0.01 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	強制経口投与毒性及びメカニズム試験
(動物種)	イヌ
(期間)	28 日間
(投与方法)	カプセル経口
(無毒性量)	1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD 0.01 mg/kg 体重

(ARfD 設定根拠資料)	強制経口投与毒性及びメカニズム試験
(動物種)	イヌ
(期間)	28 日間
(投与方法)	カプセル経口
(無毒性量)	1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

<EFSA (2015 年) >

ADI	0.021 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	発生毒性試験
(動物種)	ウサギ
(期間)	妊娠 7~19 日
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	6.3 mg/kg 体重/日
(安全係数)	300 (毒性の重篤度による追加係数 3)

ARfD	0.021 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	発生毒性試験
(動物種)	ウサギ
(期間)	妊娠 7~19 日
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	6.3 mg/kg 体重/日
(安全係数)	300 (毒性の重篤度による追加係数 3) (参照 17、44~46、150~153)

表 104 各評価機関の評価結果及び各試験における無毒性量の比較

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録又はドシエ)
ラット	90 日間 亜急性 毒性試験 ①	0、8、64、500、 4,000 ppm	263	毒性影響なし	0.67	雄: 4.1 雌: 39	雄: 4.1 雌: 39
		雄: 0、0.52、4.1、 32、263 雌: 0、0.63、4.8、 39、311	腎、胸腺重量增加等		雌雄: 腎絶対及び比重 量增加等	雌雄: 腎絶対及び比重 量增加	
	90 日間 亜急性 毒性試験 ②	0、7,500、10,000、 20,000 ppm	521 未満	雄: 体重增加抑制、摂 餌量減少等 雌: 緩瞳、探索行動減 少等	520 未満	雄: 521 未満 雌: 574 未満	雄: 522 未満 雌: 574 未満
		雄: 0、521、686、 1,350 雌: 0、574、741、 1,440	血液生化学検査値変化		雄: 緩瞳及び RBC 減少 雌: 注意力低下及び驚 愕反応低下	雌雄: 緩瞳、無気力等	
	90 日間 亜急性 毒性試験 ③	0、100、500、2,500 ppm				雄: 36.5 雌: 40.5	雄: 189 雌: 205
		雄: 0、7.35、36.5、 189 雌: 0、8.18、40.5、 205				雌雄: 体重增加抑制、 摂餌量減少等	雌雄: 毒性所見なし
	2 年間慢性 毒性/発が ん性併合 試験	0、40、400、4,000 ppm				雄: 18.8 雌: 21.5	雄: 18.8 雌: 21.5
		慢性毒性試験群 雄: 0、2.32、23.1、 235 雌: 0、2.59、25.9、 265 発がん性試験群 雄: 0、1.88、18.8、 193 雌: 0、2.20、21.5、 219				雌雄: 自発運動亢進、 立毛等 (発がん性は認められ ない)	雌雄: 自発運動亢進、 立毛等 (発がん性は認められ ない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録又はドシエ)
2年6か月間慢性毒性/発がん性併合試験	0、40、140、500 ppm	7.6	雄: 24.4 雌: 8.2	2.1	雄: 1.9 雌: 2.4	雄: 2.1 雌: 2.5	雄: 腎絶対及び比重量増加 雌: 腎絶対及び比重量増加 (発がん性は認められない)
	慢性毒性試験群 雄: 0、2.1、7.6、26.7 雌: 0、2.5、8.9、31.5 発がん性試験群 雄: 0、1.9、6.8、24.4 雌: 0、2.4、8.2、28.7	RBC、Hb、Ht減少、脳グルタミン合成酵素活性阻害等 (発がん性は認められない)	雄: 毒性所見なし 雌: 脳グルタミン合成酵素活性阻害 (発がん性は認められない)	腎グルタミン合成酵素活性上昇、腎重量増加、脳グルタミン合成酵素活性阻害、肝及び血中還元型グルタチオン濃度減少 (発がん性は認められない)	雄: 死亡率増加 (発がん性は認められない)	雄: 腎絶対及び比重量増加 雌: 死亡率増加 (発がん性は認められない)	雄: 腎絶対及び比重量増加 雌: 死亡率増加 (発がん性は認められない)
2年間発がん性試験	0、1,000、5,000、10,000 ppm 雄: 0、45.4、229、466 雌: 0、57.1、282、579	45 網膜萎縮 (発がん性は認められない)	雄: 45.4 雌: 57.1 雌雄: 網膜萎縮 (発がん性は認められない)	45 網膜萎縮 (雌で皮膚腫瘍発生頻度増加)	雄: 45.4 未満 雌: 57.1 未満 雌雄: 腎絶対及び比重量増加 (発がん性は認められない)	雄: 45.4 未満 雌: 57.1 未満 雌雄: 腎絶対及び比重量増加 (発がん性は認められない)	雄: 45.4 未満 雌: 57.1 未満 雌雄: 腎絶対及び比重量増加 (発がん性は認められない)
	0、20、200、2,000 ppm 雄: 0、1.5、14.9、143 雌: 0、1.8、17.1、162	1.5 雄: 肝グルタミン合成酵素活性阻害	雄: 1.5 雌: 1.8 脳グルタミン合成酵素活性阻害		雄: 143 雌: 162 雌雄: 毒性所見なし (亜急性神経毒性は認められない)	雄: 143 雌: 162 雌雄: 毒性所見なし	雄: 143 雌: 162 雌雄: 毒性所見なし

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾					参考 (農薬抄録又はドシエ)
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会		
90日間 亜急性神経 毒性試験	0、100、500、2,500 ppm	雄: 0、7.94、39.9、 198 雌: 0、8.60、42.7、 210				雄: 39.9 雌: 42.7 雌雄: 自発運動亢進等	雄: 198 雌: 210 雌雄: 毒性所見なし	
	0、200、1,000、 4,500 ppm							
発達神経 毒性試験	0、14、69、292	母動物: 69 児動物: 14 母動物: 体重增加抑制 及び摂餌量減少 児動物: 体重增加抑制、 自発運動亢進等	母動物: 69 児動物: 14 未満 母動物: 体重增加抑制 等 児動物: 歯状回の腹側 脚の長さの減少			母動物及び児動物: 14 母動物: 体重增加抑制 等 児動物: 自発運動量増 加等	母動物及び児動物: 14 母動物: 体重增加抑制 等 児動物: 自発運動量増 加等	
	0、40、120、360 ppm							
2世代 繁殖試験①	P 雄: 0、2.7、8.1、 24 P 雌: 0、4.2、12、 36 F ₁ 雄: 0、2.7、8.1、 24 F ₁ 雌: 0、3、12、33	親動物: 18 児動物: 18 繁殖能: 8.7 親動物及び児動物 毒性所見なし 繁殖能 同腹児数減少	親動物: 18 児動物: 6.0 繁殖能: 6.0 親動物: 毒性所見なし 児動物: 生存児数減少 繁殖能: 生存児数減少	4 着床前及び着床後胚死 亡率上昇等	親動物 P 及び F ₁ 雄: 24 P 及び F ₁ 雌: 12 児動物 P 及び F ₁ 雄: 8.1 P 及び F ₁ 雌: 12 親動物 雄: 毒性所見なし 雌: 摂餌量減少 児動物: 生産児数減少 (繁殖能に対する影響 は認められない)	親動物 P 及び F ₁ 雄: 8.1 P 及び F ₁ 雌: 12 児動物 P 及び F ₁ 雄: 8.1 P 及び F ₁ 雌: 12 親動物: 哺育期間中摂餌量減少 児動物: 生産児数減少		

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録又はドシエ)
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会	
	2 世代 繁殖試験②	0、40、120、360 ppm P 雄 : 0、2.85、 8.47、25.0 P 雌 : 0、3.20、 9.58、29.3 F ₁ 雄 : 0、4.02、 11.9、35.7 F ₁ 雌 : 0、4.49、 12.9、39.1				親動物 P 雄 : 25.0 P 雌 : 9.58 F ₁ 雄 : 35.7 F ₁ 雌 : 12.9 児動物 P 雄 : 25.0 P 雌 : 29.3 F ₁ 雄 : 35.7 F ₁ 雌 : 39.1	親動物 P 雄 : 25.0 P 雌 : 29.3 F ₁ 雄 : 35.7 F ₁ 雌 : 39.1 児動物 P 雄 : 25.0 P 雌 : 11.3 F ₁ 雄 : 35.7 F ₁ 雌 : 13.3
	発生毒性 試験①	0、10、50、250	母動物及び胎児 : 10 母動物 : 一般状態の変化、流産 胎児 : 子宮内死亡、腎孟及び尿管拡張の発生頻度増加 (催奇形性は認められない)	①②③試験の総合評価 母動物 : 10 胎児 : 50 母動物 : 膀胱出血及び活動性亢進 胎児 : 腎孟拡張	10 未満 母動物 : 運動心拍等 胎児 : 腎孟及び尿管拡張の発生頻度増加	①②③試験の総合評価 母動物 : 10 胎児 : 50 母動物 : 膀胱出血、粗毛等 胎児 : 腎孟及び尿管の両部位の拡張の発生頻度増加	母動物及び胎児 : 10 未満 母動物 : 活動性亢進等 胎児 : 腎孟または尿管拡張の発生頻度増加

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録又はドシエ)
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会	
	発生毒性 試験②	0、0.5、2.2、10	母動物及び胎児：10 母動物及び胎児：毒性影響なし		2.2	(催奇形性は認められない)	母動物及び胎児：10 母動物及び胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
	発生毒性 試験③	0、0.5、2.2、10	母動物及び胎児：10 母動物及び胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)				母動物及び胎児：10 母動物及び胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
	発生毒性 試験④	0、10、20、40				母動物及び胎児：40 母動物及び胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物及び胎児：40 母動物及び胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
90日間混餌投与後のグルタミン合成酵素活性測定		0、100及び1,000 ppm 雄：0、6.21、63.6	雄：6.2 雄：肝グルタミン合成酵素活性阻害(50%以上)及び脳グルタミン合成酵素活性阻害(10%以上)	雄：6.2～8.8 雄：脳グルタミン合成酵素阻害	(無毒性量について言及なし)	(無毒性量について言及なし)	(無毒性量について言及なし)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾					参考 (農薬抄録又はドシエ)
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会		
マウス	90日間 亜急性 毒性試験 ①	0、80、320、1,280 ppm	雄: 278 雌: 288 毒性所見なし	雄: 48 雌: 192 雄: 生化学検査値及び 肝重量の変化 雌: 毒性所見なし		雄: 17 雌: 19 雄: カリウム增加 雌: RBC 及び Ht 減少	雄: 17 雌: 19 雄: カリウム增加等 雌: RBC 及び Ht 減少	
		雄: 0、17、67、278 雌: 0、19、87、288						
	90日間 亜急性 毒性試験 ②	0、1,750、3,500、 7,000 ppm	雄: 274 未満 雌: 356 未満 雌雄: 体重及び摂餌量 減少等		雄: 274 未満 雌: 356 未満 雌雄: 体重及び摂餌量 減少等	雄: 274 未満 雌: 356 未満 雌雄: 体重及び摂餌量 減少等	雄: 274 未満 雌: 356 未満 雌雄: 体重及び摂餌量 減少等	
		雄: 0、274、561 雌: 0、356、644						
マウス	90日間 亜急性 毒性試験 ③	0、50、200、800 ppm				雄: 28.4 雌: 32.4 雌雄: 体重增加抑制、 摂餌量減少等	雄: 108 雌: 126 雌雄: 毒性所見なし	
		雄: 0、7.28、28.4、 108 雌: 0、8.84、32.4、 126						
	18か月間 発がん性 試験	0、50、200、800 ppm				雄: 113 雌: 32.0 雄: 毒性所見なし 雌: 体重增加抑制 (発がん性は認められ ない)	雄: 113 雌: 32.0 雄: 毒性所見なし 雌: 体重增加抑制 (発がん性は認められ ない)	
		衛星群 雄: 0、7.95、31.6、 122 雌: 0、8.81、33.5、 144 発がん性試験群 雄: 0、7.25、28.3、 113 雌: 0、7.85、32.0、 129						

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録又はドシエ)
	2年間 発がん性 試験	雄: 0、20、80、160 ppm 雌: 0、20、80、320 ppm	10.8 雄: 死亡率增加、体重 增加抑制等 雌: グルコース、AST 増加等 (発がん性は認められ ない)	雄: 10.82 雌: 16.19 雄: 死亡率上昇、Glu 増加等 雌: Glu 増加、Alb 減 少等 (発がん性は認められ ない)	11 死亡率上昇、体重增加 抑制、還元型グルタチ オン濃度減少 (発がん性は認められ ない)	雄: 10.8 雌: 16.2 雌雄: 体重增加抑制等 (発がん性は認められ ない)	雄: 10.8 雌: 16.2 雌雄: 体重增加抑制等 (発がん性は認められ ない)
ウサギ	発生毒性 試験①	0、2、6.3、20	母動物及び胎児: 6.3 母動物: 体重增加抑 制、腎重量增加等 胎児: 死亡率增加及び 低体重 (催奇形性は認められ ない)	母動物及び胎児: 6.3 母動物: 体重增加抑 制、摂餌量減少胎児: 死亡率增加、低体重 (催奇形性は認められ ない)	母動物及び胎児: 6.3 母動物: 体重增加抑 制、腎重量增加等 胎児: 死亡率增加及び 低体重 (催奇形性は認められ ない)	母動物及び胎児: 6.3 母動物: 流産又は早産 及び体重增加抑制 胎児: 死亡数增加 (催奇形性は認められ ない)	母動物及び胎児: 6.3 母動物: 体重增加抑制 胎児: 死亡率增加 (催奇形性は認められ ない)
	発生毒性 試験②	0、2.5、5、10				母動物及び胎児: 5 母動物: 流産、体重減 少等 胎児: 低体重 (催奇形性は認められ ない)	母動物及び胎児: 5 母動物: 体重及び摂餌 量減少等 胎児: 平均体重減少 (催奇形性は認められ ない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	米国	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録又はドシエ)
イヌ	90日間 亜急性 毒性試験①	0、4、8、16、64、 256 ppm 雄: 0、0.13、0.26、 0.57、2.1、8.0 雌: 0、0.13、0.25、 0.49、2.0、7.6	2 雌; 体重增加抑制、摂 餌量減少等		1 甲状腺重量減少等	雄: 2.1 雌: 2.0 雄: 摂餌量減少傾向 雌: 体重增加抑制及び 摂餌量減少傾向	雄: 2.1 雌: 2.0 雌雄: 体重增加抑制
		0、1、3、6				雌雄: 6 雌雄: 毒性所見なし	雌雄: 6 雌雄: 毒性所見なし
	1年間慢性 毒性試験①	0、60、150、 375/250 ppm 雄: 0、2.0、5.0、 8.5 雌: 0、2.0、5.5、 9.0	4.5 一般状態の変化等	5.0 死亡、心電図の変化	5 死亡率上昇、体重增加 抑制等	雄: 5.0 雌: 5.5 雌雄: 一般状態の変化	雌雄: 5 雌雄: 一般状態の変化
		0、2、4、8/10/16				雌雄: 8 雌雄: 毒性所見なし	雌雄: 8 雌雄: 毒性所見なし
	28日間強 制経口投与 毒性及びメ カニズム試 験	0、1、8	1 中枢神経系におけるグ ルタミン合成酵素阻 害、自発運動亢進(輕 度)、体重增加抑制、 摂餌量減少		1 脳におけるグルタミン 合成酵素阻害	雄: 8 雌: 1 雄: 毒性所見なし 雌: 体重增加抑制及び 摂餌量減少傾向	1 摂餌量低下及び体重增 加抑制
ADI(cRfD)		NOAEL: 1 SF: 100 ADI: 0.01	NOAEL: 6.0 ^a UF: 1,000 ^b cRfD: 0.006	NOEL: 1 SF: 100 ADI: 0.01	NOAEL: 1.9 SF: 100 ADI: 0.019	NOAEL: 2.1 SF: 100 ADI: 0.021	
ADI(cRfD)設定根拠資料		イヌ 28日間強制経口 投与毒性及びメカニズ ム試験	ラット 90日間混餌投 与後のグルタミン合成 酵素活性測定	イヌ 28日間強制経口 投与毒性及びメカニズ ム試験	ラット 2年6か月間慢 性毒性/発がん性併合 試験	ラット 2年6か月間慢 性毒性/発がん性併合 試験	

ADI：許容一日摂取量 cRfD：慢性参考用量 NOAEL：無毒性量 NOEL：無影響量 SF：安全係数 UF：不確実係数 /：試験記載なし

1) 無毒性量の欄には最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

2) 豪州では全て NOEL が示されている。

a : Weight of Evidence (WOE) approach に基づき、ラットの亜急性及び慢性毒性試験において、最小毒性量で脳のグルタミン合成酵素活性阻害がみられること、イヌの慢性毒性試験において、最小毒性量で心電図の変化と死亡がみられること、ラットの発達神経毒性試験において、最小毒性量で脳の形態計測的変化がみられたことが考慮された。

b : ラットの発達神経毒性試験において無毒性量が得られていないことから、追加の不確実係数 10 が考慮された。

表 105 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参考用量 設定に関連するエンドポイント (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日) ¹⁾
ラット	急性毒性試験①	雄：1,000、1,170、1,370、 1,600、1,870、2,190、2,570 雌：1,000、1,170、1,370、 1,600、1,870、2,190、 2,570、3,000	雌雄：－ 雌雄：鎮静、触刺激反応亢進、流涎、流涙等
	急性毒性試験②	雄：630、1,000、1,600、 2,500、3,150 雌：630、1,000、1,600、 1,800、2,000	雄：630 雌：1,000 雄：うずくまり、反射低下、粗毛等 雌：平衡失調、運動失調、間代性痙攣等
	急性毒性試験③	雌：2,000	雌：－ 自発運動亢進及び立毛(軽度)
	2年間慢性毒性/ 発がん性併合試験	0、40、400、4,000 ppm 雄：0、1.88、18.8、193 雌：0、2.20、21.5、219	雄：18.8 雌：21.5 雌雄：自発運動亢進等
	急性神経毒性試験 (FOB 観察)	雌雄：0、10、100、500	雄：500 雌：100 雄：症状なし 雌：円背位、立毛等
	急性神経毒性試験 (水迷路試験)	雌雄：0、10、100、500	雌雄：500 雌雄：症状なし
	急性神経毒性試験	雌雄：0、300、600、1,200	雌雄：300 雌雄：自発運動亢進等
	90日間亜急性 神経毒性試験	0、100、500、2,500 ppm 雄：0、7.94、39.9、198 雌：0、8.60、42.7、210	雄：39.9 雌：42.7 雌雄：反応性亢進、覚醒レベル上昇等
	2世代繁殖試験①	0、40、120、360 ppm P 雄：0、2.7、8.1、24 P 雌：0、4.2、12、36 F ₁ 雄：0、2.7、8.1、24 F ₁ 雌：0、3、12、33	P 及び F ₁ 雌：12 F ₁ 及び F ₂ 児動物：生産児数減少
	発生毒性試験①	0、10、50、250	母動物：10 母動物：活動性の亢進
	発生毒性試験②	0、0.5、2.2、10	母動物：10 母動物：症状なし

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参考用量 設定に関連するエンドポイント (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日) ¹⁾
マウス	発生毒性試験③	0、0.5、2.2、10	母動物：10 母動物：症状なし
	発生毒性試験①～③の総合評価		母動物：10
	単回経口投与後の各臓器におけるグルタミン合成酵素活性、グルタミン酸及びアンモニア濃度測定	雌：0、200、800、1,600	雌：— 雌：自発運動亢進
	一般薬理試験 (多元観察)	雌雄：200、400、800、1,600	雌雄：200 雄：疼痛刺激反応亢進及びぴくつき 雌：死亡、刺激(接触、音及び疼痛)反応亢進、間代性痙攣等
ウサギ	急性毒性試験①	雄：231、300、390、507、659 雌：300、390、507、659、857	雌雄：— 雄：間代性痙攣及び自発運動低下 雌：自発運動低下及び立毛
	急性毒性試験②	雌雄：315、500、800	雌雄：— 雌雄：死亡
ウサギ	発生毒性試験②	母動物：0、2.5、5、10	母動物：5 母動物：体重減少及び摂餌量減少
イヌ	急性毒性試験	雌雄：350、400	雌雄：— 雌雄：振戦、強直性痙攣、運動失調等
	1年間慢性毒性試験①	0、60、150、375/250 ppm	雄：8.5 雌：9.0
		雄：0、2.0、5.0、8.5 雌：0、2.0、5.5、9.0	単回投与による影響なし
	28日間強制経口投与毒性及びメカニズム試験	雌雄：0、1、8	雄：8 雌：1 雄：毒性影響なし 雌：体重増加抑制
	総合評価		5.5 ^a
ARfD			NOAEL：5 SF：100 ARfD：0.05
ARfD 設定根拠資料			ウサギ発生毒性試験②

ARfD：急性参考用量、NOAEL：無毒性量、SF：安全係数

—：無毒性量は設定できなかった。

¹⁾ : 最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

^a : イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験において、雌の無毒性量 5.5 mg/kg 体重/日が得られており、当該投与群において、体重への影響は認められていないことから総合的に判断し、イヌに対する無毒性量を 5.5 mg/kg 体重/日と判断した。

<別紙1：代謝物/分解物略称>

記号	化学名
B	3-メチルホスフィニコプロピオン酸
C	3-メチルホスフィニコアクリル酸
D	2-ヒドロキシ-4-メチルホスフィナートブチラート二ナトリウム塩 (生体内では遊離酸)
E	3-メチルホスフィニコ-3-オキソプロピオン酸
F	2-メチルホスフィニコ酢酸
G	4-メチルホスフィニコ酪酸
Z	L-2-アセトアミド-4-メチルホスフィナートブチラート二ナトリウム塩 (生体内では遊離酸)

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
AChE	アセチルコリンエステラーゼ
ai	有効成分量 (active ingredient)
ALP	アルカリホスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT)]
APTT	活性化部分トロンボプラスチン時間
APVMA	オーストラリア農薬・動物用医薬品局
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT)]
AUC	薬物濃度曲線下面積
BBCH	Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt and Chemical industry 植物成長の段階を表す
Bil	ビリルビン
BSP	プロモスルホフタレイン
CK	クレアチンキナーゼ
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
EFSA	欧州食品安全機関
EPA	米国環境保護庁
FOB	機能観察総合検査
GABA	γ-アミノ酪酸
GGT	γ-グルタミルトランスフェラーゼ [=γ-グルタミルトランスペプチダーゼ (γ-GTP)]
Glu	グルコース (血糖)
GLDH	グルタミン酸デヒドロゲナーゼ
Hb	ヘモグロビン (血色素量)
Ht	ヘマトクリット値
Ig	免疫グロブリン
JMPR	FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
LDH	乳酸脱水素酵素
PSP	フェノールスルホフタレイン
PT	プロトロンビン時間
RBC	赤血球数
SRBC	ヒツジ赤血球
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与 (処理) 放射能
TG	トリグリセリド
T _{max}	最高濃度到達時間
TOCP	リン酸トリ- σ クレジル
TRR	総残留放射能
UDS	不定期 DNA 合成

<別紙3：作物残留試験成績（国内）>

①グルホシネート換算値

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 場 所 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関				合計	
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
水稻 (玄米) 1986年度	2	1,850 ^L	1	121	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.05	<0.01	<0.01	0.06	0.05	0.06
				142	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.05	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.05
水稻 (稻わら) 1986年度	2	1,850 ^L	1	121	<0.02	<0.02	0.17	0.17	0.19	<0.02	<0.02	0.15	0.15	0.17
				142	<0.02	<0.02	0.12	0.12	0.14	<0.02	<0.02	0.08	0.08	0.10
水稻 (玄米) 1988年度	2	1,850 ^L	3*	50	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				84	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
小麦 (玄麦) 1986年度	2	1,390 ^L	1	297	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.03
				185	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
小麦 (玄麦) 2006年度	2	1,390 ^L	4*	7	<0.01	<0.01	0.013	0.012	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02
				14	<0.01	<0.01	0.016	0.016	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03
				21	<0.01	<0.01	0.017	0.017	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03
				9	<0.01	<0.01	0.023	0.022	0.03	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04
				18	<0.01	<0.01	0.021	0.018	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03
大麦 (種子) 2005年度	2	1,390 ^L	4*	7	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2
				14	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2
				22	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2
				7	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2
				10	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2
				21	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2
そば (種子) 2007年度	2	925 ^L	3	1	<0.05	<0.05	<0.04	<0.04	<0.09					
				3	<0.05	<0.05	<0.04	<0.04	<0.09					
				7	<0.05	<0.05	<0.04	<0.04	<0.09					
				1	<0.05	<0.05	<0.04	<0.04	<0.09					
				3	<0.05	<0.05	<0.04	<0.04	<0.09					
				7	<0.05	<0.05	<0.04	<0.04	<0.09					
だいす (乾燥子実) 1986年度	2	1,390 ^L	1	139	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
			2	89	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
			1	126	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
			2	70	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
だいす (乾燥子実) 2003年度	2	925 ^L	3	34	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				41	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				35	0.05	0.05	0.03	0.03	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03
				43	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
だいす (乾燥子実) 2009年度	2	925 ^L	3	28	0.10	0.10	<0.03	<0.03	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.26
				35	0.14	0.14	<0.03	<0.03	0.17	0.12	0.12	<0.02	<0.02	0.14
				42	0.08	0.08	<0.03	<0.03	0.11	0.20	0.20	0.06	0.06	0.26
			3	27*	0.66	0.66	0.14	0.13	0.79	0.48	0.48	0.05	0.05	0.53
			3	34	0.15	0.14	<0.03	<0.03	0.17	0.20	0.20	0.03	0.03	0.23
			3	40	0.56	0.54	0.05	0.05	0.59	0.48	0.48	0.05	0.04	0.52

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)										
					公的分析機関				社内分析機関						
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値		
いんげん まめ (乾燥子実) 2009年度	2	925 ^L	3	28	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05						
				35	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05						
				41	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05						
				28	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05						
				35	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05						
				42	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05						
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
				14	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
				20	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
らっかせい (子実) 2005年度	2	925 ^L	3	8	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
				14	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
				20	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
				14	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
				20	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02						
ばれい しょ (塊茎) 1985年度	2	463 ^L	1	82	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
			1	88	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
		925 ^L	1	3	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
			1	3	27	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
ばれい しょ (塊茎) 2010年度	2	370 ^L + 925 ^L	1	35	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
			1	3	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
			1	3	28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
			1	35	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
さといも (球茎) 1986年度	1	925 ^L	3	31	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
かんしょ (塊根) 1986年度	2	925 ^L	2	83	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
				88	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
かんしょ (塊根) 2004、 2005年度	2	555 ^L	2	21	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009	
				29	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				35	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				21	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009	
				28	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				35	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				21	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				28	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				35	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
かんしょ (塊根) 2013年度	2	925 ^L	2	14	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2						
				21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2						
				27	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2						
				14	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2						
				21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2						
				28	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2						
やまのいも (塊根) 1986年度	1	925 ^L	3	36	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04	

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
こんにゃく いも (球茎) 1986年度	1	925 ^L	3	26*	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04
	1			29*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
だいこん (根部) 1986年度	2	925 ^L	2	42*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				40*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
だいこん (葉部) 1986年度	2	925 ^L	2	42*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				40*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
はつか だいこん (根部) 2004年度	2	925 ^L	2	7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
				17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
はつか だいこん (葉部) 2004年度	2	925 ^L	2	7	0.05	0.05	<0.01	<0.01	0.06					
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
かぶ (根部) 2004年度	2	925 ^L	2	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
				28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
かぶ (葉部) 2004年度	2	925 ^L	2	35	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
かぶ (葉部) 2004年度	2	925 ^L	2	28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
				35	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
はくさい (茎葉) 1986年度	2	925 ^L	2	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
キャベツ (葉球) 1984年度	2	925 ^L	2	35	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
ブロッコリ 一 (花蕾) 2004年度	2	925 ^L	2	37*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				42*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02
				3							0.01	0.01	<0.01	0.02
				7							<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
なばな (花蕾) 2003年度	2	925 ^L	2	21	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				28	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				21	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				28	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				35	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				7	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				21	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
たかな (かつおな) (茎葉) 2011年度	2	925 ^L	2	7	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				21	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				7	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				21	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
ごぼう (根部) 2003年度	2	925 ^L	2	7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05
				33	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
レタス (茎葉) 1986年度	1	925 ^L	2	14	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.12					
				14	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.12					
				14	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.12					
				30	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
食用ぎく (花全体) 2004年度	2	925 ^L	2	37	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				44	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				30	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				37	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				44	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				30	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				37	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
				44	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05					
たまねぎ (鱗茎) 1986年度	2	925 ^L	2	85	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				84	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				1	0.04	0.04	<0.007	<0.007	0.05	0.04	0.04	<0.01	<0.01	0.05
				3	0.02	0.02	<0.007	<0.007	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
たまねぎ (鱗茎) 2006、 2007年度	2	925 ^L	2	7	0.02	0.02	<0.007	<0.007	0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.03
				1	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
ねぎ (茎葉) 1986年度	2	925 ^L	2	55	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03
				59	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
ねぎ (茎葉) 2006年度	2	925 ^L	2	1	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.10					
				1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.10					
				1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.10					
にら (茎葉) 2004年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	45	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
アスパラ ガス (若茎) 1986年度	2	1,390 ^L	1	2	31	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
				1	20	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
			2	2	20	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
				1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
アスパラ ガス (若茎) 2004年度	2	925 ^L	2	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04					
				1	32	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
にんじん (根部) 1986年度	2	925 ^L	2	30	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				32	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
にんじん (根部) 2005年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
パセリ (茎葉) 2007年度	2	925 ^L	2	3	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.3					
				7	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.3					
				14	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.3					
				3	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.3					
				7	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.3					
				14	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.3					
				14	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.3					
セルリー (茎葉) 2004年度	2	925 ^L	3	7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.03
				14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
みつば (茎葉) 2008年度	2	925 ^L	3	7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02					
				14	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02					
				21	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02					
				7	0.02	0.02	0.011	0.009	0.03					
				14	0.02	0.02	<0.007	<0.007	0.03					
				21	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02					
トマト (果実) 1986年度	2	925 ^L	4*	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
ピーマン (果実) 1986年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
なす (果実) 1986年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
きゅうり (果実) 1986年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
かぼちゃ (果実) 1986年度	1	925 ^L	3*	31	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
しろうり (果実) 2008年度	2	925 ^L	1	21	<0.03	<0.03	<0.04	<0.04	<0.07					
				28	<0.03	<0.03	<0.04	<0.04	<0.07					
				35	<0.03	<0.03	<0.04	<0.04	<0.07					
				21	<0.03	<0.03	<0.04	<0.04	<0.07					
				28	<0.03	<0.03	<0.04	<0.04	<0.07					
				35	<0.03	<0.03	<0.04	<0.04	<0.07					
すいか (果実) 1985年度	2	925 ^L	2	48	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				62	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
すいか (果実) 2006年度	2	925 ^L	2	1	0.01	0.01	<0.007	<0.007	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02
				3	<0.01	<0.01	0.008	0.008	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
メロン (果実) 1986年度	1	925 ^L	2	30	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
にがうり (果実) 2008年度	2	925 ^L	2	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				3	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				3	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
ほうれん そう (茎葉) 2005年度	2	925 ^L	1	62	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				14	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
			2	84	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				14	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
オクラ (果実) 2002年度	1	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	0.008	0.008	0.02					
しょうが (塊茎) 2004年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				4	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04
			2	3	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.07	0.06	0.04	0.04	0.10
				7	0.06	0.06	<0.02	<0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04
				14	<0.004	<0.004	0.043	0.042	0.05					
				21	<0.004	<0.004	0.034	0.030	0.03					
葉しよう が (根茎) 2006年度	2	925 ^L	2	28	<0.004	<0.004	<0.006	<0.006	<0.01					
				14	<0.004	<0.004	0.035	0.032	0.04					
				21	<0.004	<0.004	0.026	0.022	0.03					
				28	<0.004	<0.004	<0.006	<0.006	<0.01					
			3	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
さやえん どう (さや) 2005年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
			2	1	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009
				1	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009
				1	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009
				1	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009
えだまめ (さや) 1986年度	2	1,390 ^L	1	104	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03
				54	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04
				1	94	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				2	38	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
			2	20	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				18	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02
				26	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					
いちょう (種子) 2004年度	1	1,850 ^L	3	14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02					

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)											
					公的分析機関					社内分析機関						
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計		
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値			
さんしょう (果実) 2005年度	2	1,390L	2	7	<0.01	<0.01	0.15	0.15	0.16							
				14	<0.01	<0.01	0.14	0.14	0.15							
				21	<0.01	<0.01	0.16	0.16	0.17							
				35	<0.01	<0.01	0.16	0.16	0.17							
				7	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03							
	2			14	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03							
				21	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03							
				7	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03							
しそ (花穂) 2004年度	2	925L	2	14	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.12							
				14	<0.05	<0.05	<0.07	<0.07	<0.12							
食用桑 (葉) 2005年度	2	925L	3	45	0.009	0.008	<0.004	<0.004	0.012							
				52	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009							
				45	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009							
				52	<0.005	<0.005	<0.004	<0.004	<0.009							
食用桑 (果実) 2005、 2006年度	2	925L	3	51	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				45	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				52	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				51	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
未成熟 そらまめ (豆) 2006年度	2	925L	3	1	<0.005	<0.005	0.009	0.009	0.014							
				3	<0.005	<0.005	0.009	0.009	0.014							
				7	<0.005	<0.005	0.008	0.008	0.013							
				1	<0.005	<0.005	0.008	0.008	0.013							
				3	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.012							
				7	<0.005	<0.005	0.008	0.008	0.013							
				1	<0.005	<0.005	<0.02	<0.02	<0.03							
ふき (可食部) 2008、 2009 年度	2	925L	2	106	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				113	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				120	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				117	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04							
				124	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.05							
				133	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04							
ふき (ふきのと う) (可食部) 2008年度	2	925L	2	43	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				50	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				57	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				75	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				82	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
				89	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03							
たけのこ (幼茎) 2009年度	2	925L	2	30	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05		
				45	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05		
				59	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05		
				30	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05		
				32	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05		
				43	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05		
たらのき (新芽) 2012年度	2	281L + 278L	2	36*	<0.04	<0.04	<0.06	<0.06	<0.10							
				36*	<0.04	<0.04	<0.06	<0.06	<0.10							

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
ほうきぎ (胞果) 2012年度	2	925 ^L	2	21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				35	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				20*	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				35	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
温州みかん (果肉) 1983年度	2	1,850 ^L	2	72	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				67	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
温州みかん (果肉) 1986年度	2	1,850 ^L	3	17	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				27	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				20	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				30	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
温州みかん (果肉) 1995年度	2	1,000 WDG	2	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
温州みかん (果皮) 1983年度	2	1,850 ^L	2	72	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				67	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
温州みかん (果皮) 1986年度	2	1,850 ^L	3	17	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				27	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				20	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				30	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
温州みかん (果皮) 1995年度	2	1,000 WDG	2	21	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.08
				21	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.08
かんきつ (果実) 1998年度	4	1,540 WDG	2	21						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
りんご (果実) 1983年度	2	1,850 ^L	2	22	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				30	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
りんご (果実) 1988年度	1	1,850 ^L	3	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
なし (果実) 1985年度	2	1,390 ^L	3	19	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				16	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
なし (果実) 2003年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
				21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				25	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03					
				20	<0.01	<0.01	0.04	0.03	0.04	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.05
もも (果肉) 1986年度	2	1,390～ 1,850 ^L	3	19	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				20	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.05
				19	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
もも (果皮) 1986年度	2	1,390～ 1,850 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				1	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04
もも (果肉) 2004年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	0.012					
ネクタリン (果実) 2004年度	2	1,850 ^L	3	3	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
すもも (果実) 2005年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.005	<0.005	0.010	0.010	0.015					
				3	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
				7	<0.005	<0.005	0.008	0.008	0.013					
うめ (果実) 1986年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
				3	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
				7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
うめ (果実) 2004年度	2	1,850 ^L	3	19						<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				22						<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
うめ (果実) 2004年度	2	1,850 ^L	3	3	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
				7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.012					
				1	<0.005	<0.005	0.018	0.017	0.027					
おうとう (果実) 1986年度	2	1,850 ^L	3	3	<0.005	<0.005	0.038	0.037	0.053					
				7	<0.005	<0.005	0.019	0.018	0.029					
				1	<0.005	<0.005	0.029	0.029	0.05					

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)										
					公的分析機関				社内分析機関						
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B		合計	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値		
とうとう (果実) 2003年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	/		/		/	
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	/		/		/	
いちご (果実) 1986年度	2	925 ^L	2	178	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
				163	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
いちご (果実) 2005、 2007年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				3	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				7	<0.01	<0.01	<0.007	<0.007	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
ブルーベリ ー (果実) 2004年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	/		/		/	
				3	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	/		/		/	
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	/		/		/	
ぶどう (果実) 1986年度	2	1,390 ^L	3	17	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
				20	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
ぶどう (果実) 2003年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
ぶどう (果実) 1995年度	2	1,000 WDG	2	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				31	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
かき (果実) 1985年度	2	1,390 ^L	3	20	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
				53	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
かき (果実) 1988年度	1	1,390 ^L	3	20	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	
かき (果実) 2003年度	2	1,850 ^L	4	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	
				7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (gai /ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)								
					公的分析機関				社内分析機関				
					グルホシ ネート		代謝物 B		合計	グルホシ ネート		代謝物 B	合計
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	
キウイ フルーツ (果実) 1990年度	2	1,390 ^L	3	19	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
				21	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04				
いちじく (可食部) 2003年度	2	925 ^L	3	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02				
				1	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03				
なたね (種子) 2014年度	2	925 ^L	1	32	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2				
				47	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2				
				62	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2				
				32	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2				
				49	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2				
				64	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2				
くり (果実) 1985、 1986年度	1	1,850 ^L	3	31	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
茶 (荒茶) 1986年度	1	1,390 ^L	2	7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
茶 (浸出液) 1986年度	1	1,390 ^L	2	7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.03
とうき (根部) 2016年度	1	925 ^L	3	30	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
とうき (根部) 2017年度	1	925 ^L	3	45	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
とうき (葉部) 2016年度	1	925 ^L	3	60	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
とうき (葉部) 2017年度	1	925 ^L	3	7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
とうき (葉部) 2017年度	1	925 ^L	3	14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
				21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				

注) L : 液剤、WDG : 顆粒水和剤、/ : 該当なし

- 全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。
- 農薬の使用回数が申請された使用方法より多い場合、また、PHI が申請された方法より短い場合、使用回数あるいは PHI に*を付した。
- 残留値はオルト酢酸トリメチルで誘導体化して定量された。
- 代謝物 B の残留値はグルホシネートに換算して記載した。換算係数は、グルホシネート/B = 1.3

②グルホシネート（遊離酸体）換算値

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稻 (玄米) 2017 年度	2	1,850 ^L	2	6	<0.009		<0.012	<0.021
				14	<0.009		<0.012	<0.021
				20	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				13	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
水稻 (もみ米) 2017 年度	2	1,850 ^L	2	6	<0.009		<0.012	<0.021
				14	<0.009		<0.012	<0.021
				20	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				13	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
水稻 (稻わら) 2017 年度	2	1,850 ^L	2	6	<0.009		<0.012	<0.021
				14	<0.009		<0.012	<0.021
				20	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				13	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
水稻 (玄米) 2020 年度	1	1,850 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
水稻 (もみ米) 2020 年度	1	1,850 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
水稻 (稻わら) 2020 年度	1	1,850 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
水稻 (玄米) 2021 年度	2	1,850 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
水稻 (もみ米) 2021 年度	2	1,850 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稻 (稻わら) 2021 年度	2	1,850 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
水稻 (WCS) 2022 年度	2	1,850 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				6	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
小麦 (脱穀種子) 2015 年度	2	1,390 ^L	4	7		<0.009		<0.012
				14		<0.009		<0.012
				21		<0.009		<0.012
				7		<0.009		<0.012
				13		<0.009		<0.012
				21		<0.009		<0.012
小麦 (脱穀種子) 2016 年度	4	1,390 ^L	4	7		<0.009		<0.012
				7		<0.009		<0.012
				7		<0.009		<0.012
				7		<0.009		<0.012
未成熟とう もろこし (種子) 2020 年度	3	925 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
飼料用とう もろこし (乾燥種実) 2020 年度	2	925 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				6	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				13	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
飼料用とう もろこし (青刈り) 2020 年度	2	925 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
飼料用とう もろこし (乾燥種実) 2021年度	4	925 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
飼料用とう もろこし (青刈り) 2021年度	4	925 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
さとうきび (茎) 2020年度	3	3,700 ^L	4	14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				29	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
ひまわり (種子) 2020年度	2	925 ^L	3	30	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007
					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007
					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007
				45	<0.005	<0.005	0.008	0.008
					<0.005	<0.005	0.010	0.010
					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007
ホップ (乾花) 2020年度	1	925 ^L	3	1	0.009	0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
ホップ (乾花) 2021年度	1	925 ^L	3	1	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
ばれいしょ (塊茎) 2016年度	2	①370 ^L ②925 ^L	①1 ②2	21	<0.009		<0.012	<0.021
				27	<0.009		<0.012	<0.021
				35	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
				35	<0.009		<0.012	<0.021
ばれいしょ (塊茎) 2017年度	4	①370 ^L ②925 ^L	①1 ②2	21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
さといも (葉柄) 2020年度	2	925 ^L	3	7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				14	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				21	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
				14	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
				21	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
かんしょ (塊根) 2018年度	2	925 ^L	2	13	<0.009		<0.012	<0.021
				19	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
				14	0.009		<0.012	0.021
				21	0.018		<0.012	0.030
				28	<0.009		<0.012	<0.021
かんしょ (塊根) 2019年度	4	925 ^L	2	14	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
				14	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
				13	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				30	<0.009		<0.012	<0.021
				14	<0.009		<0.012	<0.021
だいこん (葉部) 2015年度	2	925 ^L	2	38*	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				52	<0.009		<0.012	<0.021
				38*	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				52	<0.009		<0.012	<0.021
だいこん (根部) 2015年度	1	925 ^L	2	38*	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				52	<0.009		<0.012	<0.021
				38*	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				52	<0.009		<0.012	<0.021

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
だいこん (葉部) 2016 年度	4	925 ^L	2	45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
だいこん (根部) 2016 年度	4	925 ^L	2	45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
はくさい (茎葉) 2015 年度	2	925 ^L	2	38*	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				51	<0.009		<0.012	<0.021
				38*	<0.009		<0.012	<0.021
はくさい (茎葉) 2016 年度	4	925 ^L	2	45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				44	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
キャベツ (葉球) 2015 年度	2	925 ^L	2	38*	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				52	<0.009		<0.012	<0.021
				38*	<0.009		<0.012	<0.021
キャベツ (葉球) 2016 年度	4	925 ^L	2	45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				45	<0.009		<0.012	<0.021
				44	<0.009		<0.012	<0.021
ブロッコ リー (花蕾) 2016 年	3	925 ^L	2	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
レタス (茎葉) 2017 年度	2	925 ^L	2	30	<0.009		<0.012	<0.021
				37	<0.009		<0.012	<0.021
				23*	<0.009		<0.012	<0.021
				30	<0.009		<0.012	<0.021
レタス (茎葉) 2018 年度	2	925 ^L	2	37	<0.009		<0.012	<0.021
				30	<0.009		<0.012	<0.021
				30	<0.009		<0.012	<0.021
				30	<0.009		<0.012	<0.021

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
レタス (茎葉) 2019年度	2	925 ^L	2	30	<0.009		<0.012	
				30	<0.009		<0.012	
ヤング コーン (幼果) 2020年度	2	925 ^L	3	1	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				3	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				1	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				3	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
たまねぎ (鱗茎) 2016年度	2	925 ^L	2	1	<0.009		<0.012	
				3	<0.009		<0.012	
				7	<0.009		<0.012	
				1	<0.009		<0.012	
				3	<0.009		<0.012	
				7	<0.009		<0.012	
たまねぎ (鱗茎) 2017年度	4	925 ^L	2	1	<0.009		<0.012	
				1	<0.009		<0.012	
				1	<0.009		<0.012	
				1	<0.009		<0.012	
たまねぎ (鱗茎) 2020年度	4	925 ^L	2	1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				3	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				7	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				3	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				7	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				3	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				7	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
				1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
ねぎ (茎葉) 2016年度	1	925 ^L	2	1	<0.009		<0.012	
				3	<0.009		<0.012	
				7	<0.009		<0.012	
ねぎ (茎葉) 2018年度	3	925 ^L	2	1	<0.009		<0.012	
				1	<0.009		<0.012	
				1	<0.009		<0.012	
ねぎ (茎葉) 2018年度	1	925 ^L	2	1	<0.009		<0.012	
ねぎ (茎葉) 2020年度	1	925 ^L	2	1	<0.009	<0.012		<0.012
				3	<0.009	<0.012		<0.012
				8	<0.009	<0.012		<0.012

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
ねぎ (茎葉) 2020 年度	4	925 ^L	2	1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.006
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
				1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
				1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
				1	<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
					<0.009	<0.009	<0.006	<0.015
ぎぼうし 2021 年度	1	925 ^L	3	59*	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				75	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				90	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
ぎぼうし 2022 年度	1	925 ^L	3	60	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				75	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				90	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
セルリー (茎葉) 2020 年度	1	925 ^L	3	7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				14	<0.009	<0.009	<0.012	<0.012
				21	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
みつば (茎葉) 2020 年度	1	925 ^L	3	7	0.044	0.044	<0.006	<0.006
				14	0.035	0.035	<0.006	<0.006
				21	0.022	0.022	<0.006	0.028
トマト (果実) 2019 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
ミニトマト (果実) 2016 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
ミニトマト (果実) 2018 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
ピーマン (果実) 2016 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
ピーマン (果実) 2018 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
なす (果実) 2016 年度	2	925 ^L	3	1 3 7	<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
				1 3 7	<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
なす (果実) 2018 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
なす (果実) 2019 年度	1	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
なす (果実) 2020 年度	1	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
きゅうり (果実) 2016 年度	2	925 ^L	3	1 3 7	<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
				1 3 7	<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
					<0.009		<0.012	<0.021
きゅうり (果実) 2018 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
きゅうり (果実) 2019 年度	2	925 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
きゅうり (果実) 2020 年度	4	925 ^L	3	1 3 7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				1 3 7	<0.009	<0.009	0.012	0.021
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
				1 3 7	<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
					<0.009	<0.009	<0.012	<0.021
ズッキーニ (果実) 2020、 2021 年度	3	925 ^L	3	1	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
				3	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
				7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
				1	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
				3	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011
				7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.011

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
ほうれん そう (茎葉) 2016 年度	2	925 ^L	2	7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.006 <0.006 <0.006
ほうれん そう (茎葉) 2017 年度	2	925 ^L	2	7 7		<0.009 <0.009		<0.012 <0.012
ほうれん そう (茎葉) 2018 年度	2	925 ^L	2	7 7		<0.009 <0.009		<0.012 <0.012
さやえん どう (さや) 2017 年度	2	925 ^L	3	1 3 7 1 3 7		<0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009		<0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
さやいん げん (さや) 2016 年度	3	925 ^L	3	1 3 7 1 3 7 1 3 7		<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005		<0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
さやいん げん (さや) 2020 年度	1	925 ^L	3	1 3 7	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.004 <0.004 <0.004	<0.004 <0.004 <0.004
えだまめ (さや) 2016 年度	3	925 ^L	3	14 21 28 14 21 28 14 21 28		<0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009		<0.012 <0.012 <0.012 0.024 0.024 0.024 <0.012 <0.012 <0.012

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					公的分析機関				
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
えだまめ (さや) 2020 年度	3	925 ^L	3	1 3 7	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.006 <0.006 <0.006	<0.011 <0.011 <0.011
					1 3 7	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.011 <0.011 <0.011
					1 3 7	0.005 0.009 <0.005	0.005 0.009 <0.005	0.007 0.007 <0.007	0.012 0.016 <0.011
				7 14 21 7 14 21	0.013 0.012 0.009	0.013 0.011 0.009	<0.006 <0.006 <0.006	<0.006 <0.006 <0.006	0.019 0.017 0.015
					<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.006 <0.006 <0.006	<0.011 <0.011 <0.011
					7 14 21	0.006 0.006 <0.005	0.005 0.005 <0.005	0.007 0.015 0.011	0.012 0.019 0.015
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.006 <0.006 <0.006
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.011 <0.011 <0.011
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.011 <0.011 <0.011
しそ (葉) 2020 年度	2	925 ^L	2	7 14 21	0.013 0.012 0.009	0.013 0.011 0.009	<0.006 <0.006 <0.006	<0.006 <0.006 <0.006	0.019 0.017 0.015
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.011 <0.011 <0.011
					7 14 21	0.006 0.006 <0.005	0.005 0.005 <0.005	0.007 0.015 0.011	0.012 0.019 0.015
				7 14 21 7 3 7	0.006 0.006 0.005	0.005 0.005 0.005	0.007 0.015 0.024	0.007 0.014 0.024	0.012 0.019 0.042
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.024	<0.006 <0.006 0.024
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.011 <0.011 0.042
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.011 <0.011 0.042
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.011 <0.011 0.042
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.011 <0.011 0.042
みょうが (花穂) 2021 年度	2	925 ^L	2	7 14 21	0.013 0.012 0.009	0.013 0.011 0.009	<0.006 <0.006 <0.006	<0.006 <0.006 <0.006	0.019 0.017 0.015
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 <0.006	<0.011 <0.011 <0.011
					7 14 21	0.006 0.006 0.005	0.005 0.005 0.005	0.007 0.015 0.011	0.012 0.019 0.015
				7 14 21 7 3 7	0.006 0.006 0.005	0.005 0.005 0.005	0.007 0.015 0.024	0.007 0.014 0.024	0.012 0.019 0.042
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.006 <0.006 0.024
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.006 <0.006 0.024
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.006 <0.006 0.024
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.006 <0.006 0.024
					7 14 21	<0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005	<0.006 <0.006 0.024	<0.006 <0.006 0.024
モロヘイヤ (茎葉) 2020、 2021 年度	2	925 ^L	2	1 3 7	<0.018 <0.018 <0.018	<0.018 <0.018 <0.018	0.036 0.048 0.036	0.036 0.048 0.036	0.054 0.066 0.054
					1 3 7	<0.018 <0.018 <0.018	<0.018 <0.018 <0.018	<0.024 0.024 0.024	<0.024 0.024 0.024
					1 3 7	<0.018 <0.018 <0.018	<0.018 <0.018 <0.018	0.024 0.024 0.024	0.042 0.042 0.042
				14 21 28 14 21 28	0.009 0.009 0.009	<0.009 <0.009 <0.009	0.024 0.024 0.024	0.024 0.024 0.024	0.033 0.033 0.033
					14 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.009 0.009 0.009	0.024 0.024 0.024	0.033 0.033 0.033
					14 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.009 0.009 0.009	0.024 0.024 0.024	0.036 0.036 0.036
					14 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.009 0.009 0.009	0.024 0.024 0.024	0.045 0.045 0.045
					14 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.009 0.009 0.009	0.024 0.024 0.024	0.033 0.033 0.033
					14 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.009 0.009 0.009	0.024 0.024 0.024	0.036 0.036 0.036
温州みかん (果肉) 2018 年度	3	1,850 ^L	3	14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
					14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
					14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
				14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
					14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
					14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
					14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
					14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021
					14* 21 28	<0.009 0.009 0.009	<0.012 0.012 0.012	<0.012 0.012 0.012	<0.021 0.021 0.021

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
温州みかん (果皮) 2018 年度	3	1,850 ^L	3	14*	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
				14*	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
				14*	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
温州みかん (果肉) 2019 年度	3	1,850 ^L	3	21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
温州みかん (果皮) 2019 年度	3	1,850 ^L	3	21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
かぼす (全果) 2019 年度	1	1,850 ^L	3	14*	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
かぼす (全果) 2020 年度	1	1,850 ^L	3	21	<0.009		0.024	0.033
ゆず (果実) 2019 年度	1	1,850 ^L	3	14*	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
りんご (果実) 2018 年度	2	1,850 ^L	3	14*	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				28	<0.009		<0.012	<0.021
				14*	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
りんご (果実) 2019 年度	4	1,850 ^L	3	21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
				21	<0.009		<0.012	<0.021
なし (全果) 2019 年度	3	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					公的分析機関			
					グルホシネート (遊離酸体)		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
なし (全果) 2020 年度	3	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
もも (果実) 2018 年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
もも (果肉) 2018 年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
もも (果実) 2020 年度	1	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
もも (果肉) 2020 年度	1	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
ぶどう (果実) 2016 年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
ぶどう (果実) 2018 年度	1	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
かき (果実) 2016 年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				3	<0.009		<0.012	<0.021
				7	<0.009		<0.012	<0.021
かき (果実) 2017 年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
かき (果実) 2018 年度	2	1,850 ^L	3	1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021
				1	<0.009		<0.012	<0.021

注) L: 液剤、WCS: ホイールクロップサイレージ、/: 該当なし

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界の平均に<を付して記載した。

・PHI が申請された方法より短い場合、PHI に*を付した。

- ・残留値はオルト酢酸トリメチルで誘導体化して定量された。
- ・代謝物 B の残留値はグルホシネート（遊離酸体）に換算して記載した。換算係数は、グルホシネート（遊離酸体）/B = 1.2

<別紙4：作物残留試験成績（海外）>

①グルホシネート換算値

作物名 (分析部位) 実施年	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					グルホシ ネート	代謝物Z	代謝物B	合量 ^a	合量 平均値
ホップ (乾花) 2017年	1	943～ 1166	3	9	0.0385 0.0336	<0.01 <0.01	0.0217 0.0206	0.0702 0.0642	/
ホップ (乾花) 2017年	1	943～ 1166	3	10	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.03 <0.03	/
ホップ (乾花) 2017年	1	943～ 1166	3	11	0.0505 0.0476	<0.01 <0.01	0.175 0.166	0.235 0.223	/
ホップ (乾花) 2017年	1	943～ 1166	3	10	0.0531 0.0865	<0.01 <0.01	0.313 0.392	0.374 0.489	/
ホップ (乾花) 2017年	1	943～ 1166	3	10	0.167 0.161	<0.01 <0.01	0.0700 0.0771	0.247 0.248	/
ホップ (乾花) 2017年	1	943～ 1166	3	11	0.262 0.253	<0.01 ^b <0.01 ^b	0.0384 ^b 0.0396 ^b	0.311 0.304	/
ホップ (乾花) 2017年	1	943～ 1166	3	10	0.0449 0.0600	<0.01 <0.01	0.271 0.315	0.326 0.385	/

/: 該当なし

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

・代謝物 Z 及び B の残留値はグルホシネートに換算して記載した。

^a : 各化合物の残留濃度の合量として、グルホシネート、代謝物 Z 及び B の残留値をグルホシネートに換算した合量値を記載した。

^b : 繰り返し分析の平均値

② グルホシネット (遊離酸体) 換算値

作物名 (分析部位) 実施年	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					グルホシ ネット	代謝物Z	代謝物B	含量 ^a	含量 平均値
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	111	<0.01 <0.01	0.112 0.122	0.0157 0.0151	0.14 0.15	0.14
			1	111	<0.01 <0.01	0.113 0.0654	0.0170 0.0388	0.14 0.11	0.13
			2	90	0.0162 0.0141	1.95 1.85	0.107 0.107	2.1 2.0	2.0
			1	90	0.0147 0.0340	1.79 2.37	0.0922 0.0917	1.9 2.5	2.2
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	105	<0.010 0.0124	0.441 0.738	0.0258 0.0330	0.48 0.78	0.63
			1	105	0.0184 0.0124	1.38 0.841	0.0712 0.0482	1.5 0.90	1.2
			2	91	0.0362 0.0362	2.79 2.60	0.0516 0.0458	2.9 2.7	2.8
			1	91	0.0145 0.0115	0.471 0.0133	<0.010 <0.010	0.50 0.035	0.27
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	113	<0.010 <0.010	0.0965 0.0879	<0.010 <0.010	0.12 0.11	0.11
			1	113	<0.010 <0.010	0.0539 0.0788	<0.010 <0.010	0.074 0.099	0.086
			2	95	0.0185 0.0181	0.894 0.821	0.0508 0.0310	0.96 0.87	0.92
			1	95	0.0394 0.0493	1.58 2.07	0.0454 0.0441	1.7 2.2	1.9
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	115	<0.010 <0.010	0.451 0.407	0.0384 0.0457	0.50 0.46	0.48
			1	115	<0.010 <0.010	0.245 0.229	0.0303 0.0402	0.29 0.28	0.28
			2	97	0.0214 0.0179	3.44 2.74	0.206 0.171	3.7 2.9	3.3
			1	97	0.0249 0.0146	3.43 1.89	0.218 0.160	3.7 2.1	2.9
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	116	<0.010 <0.010	0.101 0.0728	0.200 0.222	0.31 0.30	0.31
				122	<0.010 <0.010	0.0620 0.0280	0.235 0.0913	0.31 0.13	0.22
				128	<0.010 <0.010	0.128 0.0699	0.249 0.167	0.39 0.25	0.32
				134	<0.010 <0.010	0.147 0.0542	0.261 0.212	0.42 0.28	0.35
				148	<0.010 <0.010	0.0707 0.171	0.122 0.249	0.20 0.43	0.32
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L	1	116	<0.010 <0.010	0.193 0.223	0.231 0.0909	0.43 0.32	0.38
				122	0.0126 0.0122	0.728 0.654	0.131 0.152	0.87 0.82	0.85
				128	0.0146 0.0111	0.533 0.372	0.149 0.157	0.70 0.54	0.62

作物名 (分析部位) 実施年	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					グルホシ ネット	代謝物Z	代謝物B	合量 ^a	合量 平均値
					134	0.0136 0.0124	0.589 0.522	0.129 0.127	0.73 0.66
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	148	0.0133 0.0113	0.611 0.384	0.123 0.173	0.75 0.57	0.66
				99	0.0163 0.0128	0.639 0.541	0.213 0.185	0.87 0.74	0.80
				105	0.0179 0.0232	0.777 1.21	0.390 0.622	1.2 1.9	1.5
				111	0.0135 0.0139	0.552 0.801	0.171 0.154	0.74 0.97	0.85
				117	0.0128 0.0134	0.511 0.700	0.226 0.250	0.75 0.96	0.86
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	1	131	0.0133 0.0208	0.541 1.02	0.210 0.453	0.76 1.5	1.1
				99	0.0365 0.0219	1.80 1.48	0.497 0.335	2.3 1.8	2.1
				105	0.0788 0.0413	3.63 2.60	0.219 0.181	3.9 2.8	3.4
				111	0.0614 0.0725	3.44 4.19	0.228 0.275	3.7 4.5	4.1
				117	0.0613 0.0550	3.03 2.53	0.333 0.361	3.4 3.0	3.2
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	131	0.0507 0.0414	2.84 2.29	0.323 0.287	3.2 2.6	2.9
				124	<0.010 <0.010	0.121 0.0731	0.0289 0.0204	0.16 1.10	0.13
				133	<0.010 <0.010	0.0709 0.0847	0.0198 0.0213	0.10 0.12	0.11
				138	<0.010 <0.010	0.140 0.0838	0.0386 0.0311	0.19 0.12	0.16
				151	<0.010 <0.010	0.0766 0.0897	0.0188 0.0215	0.11 0.12	0.11
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	1	155	<0.010 <0.010	0.0950 0.0958	0.0270 0.0195	0.13 0.13	0.13
				124	<0.010 <0.010	0.380 0.366	0.0952 0.131	0.49 0.51	0.50
				133	<0.010 <0.010	0.255 0.181	0.0661 0.0534	0.33 0.24	0.29
				138	<0.010 <0.010	0.235 0.336	0.0787 0.139	0.32 0.48	0.40
				151	0.0122 0.0111	0.482 0.352	0.0965 0.0709	0.59 0.43	0.51
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	155	<0.010 <0.010	0.397 0.359	0.111 0.0920	0.52 0.46	0.49
				104	0.0415 0.0224	1.59 0.693	0.0863 0.0405	1.7 0.76	1.2
				113	0.0192 0.0138	1.73 1.36	0.0782 0.0663	1.8 1.4	1.6
				118	0.0432 0.0370	2.49 2.44	0.102 0.107	2.6 2.6	2.6
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	131	0.0131 0.0163	0.719 1.61	0.0269 0.0247	0.54 0.56	0.55

作物名 (分析部位) 実施年	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					グルホシ ネット	代謝物Z	代謝物B	合量 ^a	合量 平均値
					135	0.0200 0.0386	0.719 1.61	0.0348 0.0814	0.77 1.7
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L	1	104	0.0490 0.0483	3.44 2.51	0.114 0.0907	3.6 2.6	3.1
				113	0.0595 0.0482	3.57 3.10	0.0954 0.0784	3.7 3.2	3.5
				118	0.0572 0.0700	3.61 4.72	0.114 0.113	3.8 4.9	4.3
				131	0.0637 0.0742	3.81 3.55	0.125 0.102	4.0 3.7	3.9
				135	0.0575 0.0690	2.71 4.38	0.0838 0.0990	2.8 4.6	3.7
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	83	<0.010 <0.010	0.460 0.327	0.0912 0.0859	0.56 0.42	0.49
				90	<0.010 <0.010	0.454 0.481	0.0821 0.0745	0.55 0.57	0.56
				97	<0.010 0.0127	0.342 0.581	0.0527 0.104	0.40 0.70	0.55
				103	0.0150 0.0159	0.701 0.829	0.123 0.158	0.84 1.0	0.92
				109	0.0245 0.0377	1.12 1.16	0.179 0.146	1.3 1.3	1.3
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L	1	83	0.0228 0.0149	1.58 1.03	0.236 0.169	1.8 1.2	1.5
				90	0.0258 0.0473	1.98 3.52	0.244 0.353	2.2 3.9	3.1
				97	0.0944 0.0534	4.39 2.20	0.421 0.235	4.9 2.5	3.7
				103	0.0444 0.0710	1.76 2.55	0.200 0.274	2.0 2.9	2.5
				109	0.0204 0.0541	0.797 2.38	0.0929 0.250	0.91 2.7	1.8
綿 (綿実) 2015年度	1	1,800 ^L (合計)	2	70	0.0587 0.0916	4.34 6.95	0.572 0.872	5.0 7.9	6.4
				77	0.102 0.105	7.36 7.30	0.747 0.671	8.2 8.1	8.1
				84	0.106 0.159	5.21 7.38	0.561 0.712	5.9 8.2	7.1
				90	0.172 0.107	7.09 4.40	0.647 0.453	7.9 5.0	6.4
				96	0.139 0.163	6.05 7.43	0.580 0.707	6.8 8.3	7.5
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L	1	70	0.0169 0.0889	0.934 6.92	0.0845 0.630	1.0 7.6	4.3
				77	0.0183 0.0276	0.918 2.06	0.0821 0.0745	1.0 2.2	1.6
				84	0.0280 0.0412	1.18 1.85	0.0928 0.121	1.3 2.0	1.7
				90	0.0362 0.0643	1.30 2.98	0.0927 0.196	1.4 3.2	2.3
				96	0.0483 0.0705	1.98 2.76	0.155 0.183	2.2 3.0	2.6

作物名 (分析部位) 実施年	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					グルホシ ネート	代謝物Z	代謝物B	合量 ^a	合量 平均値
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	124	0.0163 0.0146	0.636 0.653	0.0695 0.0667	0.72 0.73	0.73
			1	124	0.0209 0.0195	1.06 1.12	0.0983 0.112	1.2 1.3	1.2
			2	106	0.0576 0.0743	4.48 4.13	0.275 0.297	4.8 4.5	4.7
			1	106	0.0503 0.0472	3.19 3.45	0.207 0.237	3.4 3.7	3.6
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	118	<0.010 <0.010	0.209 0.160	<0.010 0.0203	0.23 0.19	0.21
			1	118	<0.010 <0.010	0.417 0.358	0.0294 0.0306	0.46 0.40	0.43
			2	98	0.0478 0.0517	4.19 4.13	0.312 0.253	4.6 4.4	4.5
			1	98	0.0530 0.0466	3.88 2.99	0.266 0.260	4.2 3.3	3.7
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	108	<0.010 <0.010	0.0854 0.162	0.0835 0.143	0.18 0.31	0.25
			1	108	<0.010 <0.010	0.163 0.234	0.0392 0.0493	0.21 0.29	0.25
			2	84	0.0304 0.0355	1.45 1.56	0.168 0.192	1.6 1.8	1.7
			1	84	0.0367 0.0234	1.43 1.16	0.226 0.163	1.7 1.3	1.5
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	103	<0.010 <0.010	0.255 0.257	0.0393 0.0332	0.30 0.30	0.30
				110	0.0430 ^b <0.010	2.79 ^b 0.175	0.224 ^b 0.0558	3.1 ^b 0.24	1.6
				117	<0.010 <0.010	0.235 0.195	0.0615 0.0990	0.31 0.30	0.31
				124	<0.010 <0.010	0.238 0.226	0.0458 0.0637	0.29 0.30	0.30
				131	<0.010 <0.010	0.295 0.243	0.0455 0.0511	0.35 0.30	0.33
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	1	103	0.0103 <0.010	0.832 0.507	0.0674 0.0517	0.91 0.57	0.74
				110	<0.010 <0.010	0.187 0.411	0.0209 0.0566	0.22 0.48	0.35
				117	<0.010 <0.010	0.367 0.169	0.0328 0.0186	0.41 0.20	0.30
				124	<0.010 0.0124	0.334 0.532	0.0287 0.0464	0.37 0.59	0.48
				131	<0.010 <0.010	0.378 0.294	0.0354 0.0298	0.42 0.33	0.38
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	79	0.0518 0.0499	4.89 4.06	0.346 0.300	5.3 4.4	4.9
				86	0.0107 ^b 0.0490	0.167 ^b 3.44	0.0582 ^b 0.290	0.24 ^b 3.8	2.0
				93	0.0704 0.0519	3.86 3.15	0.294 0.297	4.2 3.5	3.9
				100	0.0624 0.0747	4.10 4.46	0.273 0.321	4.4 4.9	4.6

作物名 (分析部位) 実施年	試験 ほ場 数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					グルホシ ネート	代謝物Z	代謝物B	合量 ^a	合量 平均値
					107	0.0803 0.0669	4.50 3.86	0.232 0.238	4.8 4.2
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L	1	79	0.0536 0.0594	5.26 6.11	0.269 0.348	5.6 6.5	6.1
				86	0.0686 0.0747	5.81 6.14	0.238 0.331	6.1 6.5	6.3
				93	0.0642 0.0738	4.86 4.96	0.193 0.248	5.1 5.3	5.2
				100	0.114 0.0397	6.92 2.48	0.258 0.104	7.3 2.6	5.0
				107	0.106 0.0448	6.96 2.14	0.284 0.102	7.4 2.3	4.8
綿 (綿実) 2015年	1	1,800 ^L (合計)	2	100	<0.010 0.0115	0.256 0.623	0.0675 0.110	0.33 0.74	0.54
			1	100	0.0111 0.0150	1.15 1.16	0.175 0.122	1.3 1.3	1.3
			2	96	0.0157 0.0171	0.444 0.561	0.0744 0.0889	0.53 0.67	0.60
			1	96	0.0138 0.0176	0.585 0.750	0.107 0.0910	0.71 0.86	0.78

注) L : 液剤

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

・代謝物 Z 及び B の残留値はグルホシネート (遊離酸体) に換算して記載した。

^a : 各化合物の残留濃度の合量として、グルホシネート (遊離酸体) 、代謝物 Z 及び B の残留値をグルホシネート (遊離酸体) に換算した合量値を記載した。

^b : 繰り返し分析の平均値

＜別紙5：畜産物残留試験成績＞

①ウシ

・乳汁（グルホシネート）

投与群	グルホシネート残留量 (μg/g)										
	4.3 mg/kg 飼料投与群			12.9 mg/kg 飼料投与群			43.0 mg/kg 飼料投与群				
個体番号	73	89	96	61*	71	76	93	54*	59	86	87
投与 1 日	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
3 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
4 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
5 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
6 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
9 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
13 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
16 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
20 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
23 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
27 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
28 日				<0.02							
休薬 1 日								<0.02			
3 日				<0.02				<0.02			
4 日				<0.02				<0.02			
5 日				<0.02				<0.02			
6 日				<0.02				<0.02			

* : 休薬期間設定個体、/ : 該当なし

・対照群では、投与 9 日の 1 頭 (0.03 μg/g) を除き、全て定量限界 (0.02 μg/g) 未満であった。

・乳汁（代謝物 B）

投与群	代謝物 B 残留量 ^a (μg/g)										
	4.3 mg/kg 飼料投与群			12.9 mg/kg 飼料投与群				43.0 mg/kg 飼料投与群			
個体番号	73	89	96	61*	71	76	93	54*	59	86	87
投与 1 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
3 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
4 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
5 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
6 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
9 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
13 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
16 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
20 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
23 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
27 日	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
28 日	/	/	/	<0.02	/	/	/	/	/	/	/
休薬 1 日	/	/	/	/	/	/	/	<0.02	/	/	/
3 日	/	/	/	/	<0.02	/	/	<0.02	/	/	/
4 日	/	/	/	/	<0.02	/	/	<0.02	/	/	/
5 日	/	/	/	/	<0.02	/	/	<0.02	/	/	/
6 日	/	/	/	/	<0.02	/	/	<0.02	/	/	/

^a : 代謝物 B の残留値はグルホシネートに換算した値 (換算係数 : グルホシネート/B = 1.3)。

* : 休薬期間設定個体、/ : 該当なし

・対照群では全て定量限界 (0.02 μg/g) 未満であった。

・臓器及び組織 (グルホシネート)

投与群	グルホシネート残留量 (μg/g)										
	4.3 mg/kg 飼料投与群			12.9 mg/kg 飼料投与群			43.0 mg/kg 飼料投与群				
個体番号	73	89	96	61*	71	76	93	54*	59	86	87
筋肉	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
脂肪	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
肝臓	0.13	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
腎臓	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.13

* : 休薬期間設定個体

・対照群では全ての臓器及び組織で定量限界 (肝臓及び腎臓 : 0.10 μg/g、筋肉及び脂肪 : 0.05 μg/g) 未満であった。

・臓器及び組織 (代謝物 B)

投与群	代謝物 B 残留量 ^a (μg/g)										
	4.3 mg/kg 飼料投与群			12.9 mg/kg 飼料投与群			43.0 mg/kg 飼料投与群				
個体番号	73	89	96	61*	71	76	93	54*	59	86	87
筋肉	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
脂肪	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.08	<0.05	0.16	0.07	0.08
肝臓	1.5	1.3	0.62	0.51	3.9	3.9	4.2	0.86	10.7	9.0	7.1
腎臓	0.34	0.41	0.38	0.24	0.77	2.0	1.5	0.21	4.8	3.8	7.4

^a : 代謝物 B の残留値はグルホシネートに換算した値 (換算係数 : グルホシネート/B=1.3)。

* : 休薬期間設定個体

・対照群では全ての臓器及び組織で定量限界 (肝臓及び腎臓 : 0.10 μg/g、筋肉及び脂肪 : 0.05 μg/g) 未満であった。

②ニワトリ

・卵 (グルホシネット)

投与群	グルホシネット残留量 (μg/g)		
	4.8 mg/kg 飼料投与群	14.4 mg/kg 飼料投与群	48.0 mg/kg 飼料投与群
投与 1 日	<0.05	<0.05	<0.05
2 日	<0.05	<0.05	<0.05
3 日	<0.05	<0.05	<0.05
4 日	<0.05	<0.05	<0.05
5 日	<0.05	<0.05	<0.05
6 日	<0.05	<0.05	<0.05
7 日	<0.05	<0.05	0.07
8 日	<0.05	<0.05	0.07
9 日	<0.05	<0.05	0.07
10 日	<0.05	<0.05	0.07
11 日	<0.05	<0.05	0.07
12 日	<0.05	<0.05	0.07
13 日	<0.05	<0.05	0.07
14 日	<0.05	<0.05	0.06
15 日	<0.05	<0.05	<0.05
16 日	<0.05	<0.05	<0.05
17 日	<0.05	<0.05	0.06
18 日	<0.05	<0.05	<0.05
19 日	<0.05	<0.05	<0.05
20 日	<0.05	<0.05	<0.05
21 日	<0.05	<0.05	<0.05
22 日	<0.05	<0.05	0.05
23 日	<0.05	<0.05	0.05
24 日	<0.05	<0.05	0.06
25 日	<0.05	<0.05	<0.05
26 日	<0.05	<0.05	<0.05
27 日	<0.05	<0.05	<0.05
28 日	<0.05	<0.05	<0.05
休薬 1 日	<0.05	<0.05	<0.05
2 日	<0.05	<0.05	0.05
3 日	<0.05	<0.05	<0.05
4 日	<0.05	<0.05	<0.05
5 日	<0.05	<0.05	<0.05
6 日	<0.05	<0.05	<0.05

・対照群では全て定量限界 (0.05 μg/g) 未満であった。

・卵 (代謝物 B)

投与群	代謝物 B 残留量 ^a (μg/g)		
	4.8 mg/kg 飼料投与群	14.4 mg/kg 飼料投与群	48.0 mg/kg 飼料投与群
投与 1 日	<0.05	<0.05	<0.05
2 日	<0.05	<0.05	<0.05
3 日	<0.05	<0.05	<0.05
4 日	<0.05	<0.05	<0.05
5 日	<0.05	<0.05	<0.05
6 日	<0.05	<0.05	<0.05
7 日	<0.05	<0.05	<0.05
8 日	<0.05	<0.05	<0.05
9 日	<0.05	<0.05	<0.05
10 日	<0.05	<0.05	<0.05
11 日	<0.05	<0.05	<0.05
12 日	<0.05	<0.05	<0.05
13 日	<0.05	<0.05	<0.05
14 日	<0.05	<0.05	<0.05
15 日	<0.05	<0.05	<0.05
16 日	<0.05	<0.05	<0.05
17 日	<0.05	<0.05	<0.05
18 日	<0.05	<0.05	<0.05
19 日	<0.05	<0.05	<0.05
20 日	<0.05	<0.05	<0.05
21 日	<0.05	<0.05	<0.05
22 日	<0.05	<0.05	<0.05
23 日	<0.05	<0.05	<0.05
24 日	<0.05	<0.05	<0.05
25 日	<0.05	<0.05	<0.05
26 日	<0.05	<0.05	<0.05
27 日	<0.05	<0.05	<0.05
28 日	<0.05	<0.05	<0.05
休薬 1 日	<0.05	<0.05	<0.05
2 日	<0.05	<0.05	<0.05
3 日	<0.05	<0.05	<0.05
4 日	<0.05	<0.05	<0.05
5 日	<0.05	<0.05	<0.05
6 日	<0.05	<0.05	<0.05

^a : 代謝物 B の残留値はグルホシネートに換算した値 (換算係数 : グルホシネート/B = 1.3)。

・対照群では全て定量限界 (0.05 μg/g) 未満であった。

②産卵鶏

・臓器及び組織 (グルホシネート)

投与群		グルホシネート残留量 (μg/g)		
		4.8 mg/kg 飼料 投与群	14.4 mg/kg 飼料 投与群	48.0 mg/kg 飼料 投与群
投与 期間 終了後	筋肉	<0.05	<0.05	<0.05
	脂肪	<0.05	<0.05	<0.05
	肝臓	<0.10	<0.10	<0.10
	腎臓	<0.05	0.08	0.25
休葉 期間 終了後	筋肉	<0.05	<0.05	<0.05
	脂肪	<0.05	<0.05	<0.05
	肝臓	<0.10	<0.10	<0.10
	腎臓	<0.05	<0.05	<0.05

・対照群では全て定量限界 (肝臓 : 0.10 μg/g、腎臓、筋肉及び脂肪 : 0.05 μg/g) 未満であった。

・臓器及び組織 (代謝物 B)

投与群		代謝物 B 残留量 ^a (μg/g)		
		4.8 mg/kg 飼料 投与群	14.4 mg/kg 飼料 投与群	48.0 mg/kg 飼料 投与群
投与 期間 終了後	筋肉	<0.05	<0.05	<0.05
	脂肪	<0.05	<0.05	<0.05
	肝臓	<0.10	<0.10	<0.10
	腎臓	0.69	2.00	7.80
休葉 期間 終了後	筋肉	<0.05	<0.05	<0.05
	脂肪	<0.05	<0.05	<0.05
	肝臓	<0.10	<0.10	<0.10
	腎臓	0.05	0.19	0.66

^a : 代謝物 B の残留値はグルホシネートに換算した値 (換算係数 : グルホシネート/B = 1.3)。

・対照群では全て定量限界 (肝臓 : 0.10 μg/g、腎臓、筋肉及び脂肪 : 0.05 μg/g) 未満であった。

<参考>

1. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付、厚生労働省告示第 499 号）
2. 農薬抄録 グルホシネート（除草剤）（平成 21 年 4 月 9 日改訂）：バイエルクロップサイエンス株式会社、一部公表
3. JMPR① : 828. Glufosinate Ammonium (Pesticide residues in food - 1991. Evaluations. PartII - Toxicology)
4. JMPR ② : Glufosinate Ammonium (Pesticide residues in food - 1999 Toxicological evaluations)
5. US EPA① : HED Records Center Series 361 Science Review - File R051615
6. US EPA② : DATA EVALUATION RECORD - Metabolism study in Rats
7. US EPA③ : DATA EVALUATION RECORD - Rodent *In Vivo* Dermal Penetration Study - Rat
8. US EPA④ : DATA EVALUATION RECORD - Subchronic Oral Toxicity Feeding Beagle Dogs
9. US EPA⑤ : DATA EVALUATION RECORD - Developmental Neurotoxicity Study - Rat
10. US EPA⑥ : Glufosinate-Ammonium : Review of toxicity studies on the metabolites
11. US EPA⑦ : Glufosinate-Ammonium : Review of metabolism studies
12. US EPA⑧ : Glufosinate-Ammonium : Review of two subchronic toxicity studies on the L-glufosinate ammonium
13. US EPA⑨ : Evaluation of Residue Data and Analytical Methods (Glufosinate Ammonium on Potatoes, Transgenic Sugar Beets and Transgenic Canola)
14. US EPA⑩ : Federal Register / Vol. 68, No. 188 / September 29, 2003
15. US EPA⑪ : Request to Waive Requirement for Glutamine Synthetase Measurements and Other Data Requirements (2008)
16. US EPA⑫ : Glufosinate Final Work Plan Registration Review August 2008
17. APVMA① : JAPANESE POSITIVE LIST RESPONSE IN SUPPORT OF AUSTRALIAN MRLs FOR : Glufosinate
18. 食品健康影響評価について（平成 19 年 7 月 13 日付け厚生労働省発食安第 0713006 号）
19. 食品健康影響評価の通知について（平成 22 年 2 月 25 日付け府食第 139 号）
20. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示 370 号）の一部を改正する件（平成 23 年厚生労働省告示第 52 号）について
21. グルホシネート 飼料中残留農薬基準設定関係資料（平成 13、18 年）：バイエルクロップサイエンス株式会社、未公表
22. JMPR③ : “Glufosinate-ammonium” Pesticide residues in food - 1998. Evaluations. PartI - Residues, Volume2. p.695-700 (1998)
23. グルホシネート 作物残留試験成績（平成 20、21 年）：バイエルクロップサイ

エンス株式会社、未公表

24. 農薬抄録 グルホシネート（除草剤）（平成 23 年 9 月 9 日改訂）：バイエルクロップサイエンス株式会社、一部公表
25. 食品健康影響評価について（平成 23 年 11 月 15 日付け厚生労働省発食安 1115 第 2 号）
26. 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 24 年 3 月 8 日付け府食第 254 号）
27. 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 24 年 3 月 8 日付け府食第 255 号）
28. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示 370 号）の一部を改正する件（平成 24 年 6 月 7 日付け厚生労働省告示第 382 号）について
29. 食品健康影響評価について（平成 25 年 6 月 11 日付け厚生労働省発食安 0611 第 3 号）
30. 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 25 年 7 月 29 日付け府食第 615 号）
31. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示 370 号）の一部を改正する件（平成 26 年厚生労働省告示第 390 号）について
32. 食品健康影響評価について（令和 3 年 8 月 25 日付け厚生労働省発生食 0825 第 3 号）
33. 農薬抄録 グルホシネート（除草剤）（令和 2 年 10 月 14 日改訂）：BASF ジャパン株式会社、一部公表
34. Metabolism of [¹⁴C]-Glufosinate in Laying Hens (GLP 対応): AgrEvo USA Company, 1995, 未公表
35. "Glufosinate-ammonium" Ruminant feeding study (GLP 対応): Hoechst Aktingesellschaft (ドイツ), 1989, 未公表
36. "Glufosinate-ammonium" Poultry feeding study (GLP 対応): Hoechst Aktingesellschaft (ドイツ), 1989, 未公表
37. Acute oral toxicity study with glufosinate-ammonium technical concentrate 50% in rats (GLP 対応): LAB Research Ltd. (ハンガリー), 2011, 未公表
38. Evaluation of symptomatology of "Glufosinate-ammonium" technical following single oral administration to dogs (GLP 対応): RCC Research and Consulting Company AG (イス), 1986, 未公表
39. Acute inhalation toxicity study (nose-only) in the rat Glufosinate- ammonium technical concentrate 50% (GLP 対応): LAB Research Ltd. (ハンガリー), 2011, 未公表
40. "Metabolite Z" substance technical Chromosome aberrations in vitro in V79 Chinese hamster cells (GLP 対応): Hoechst Aktiengesellschaft (ドイツ), 1989, 未公表
41. N-acetyl-L-glufosinate disodium; substance, technical abbreviated NAG and glufosinate-ammonium; technical concentrate abbreviated GA in vitro

investigations comparison of the inhibition of Glutamine Synthetase (GLP 対応): RCC Ltd. (イス), 1999, 未公表

42. "Glufosinate-ammonium" Effect on serum glutamine level in the pregnant female rat following single oral administration by gavage (GLP 対応): Bayer CropScience (フランス), 2003, 未公表

43. Glufosinate-Ammonium 28-day immunotoxicity study in the rat by dietary administration (GLP 対応): Bayer CropScience (フランス), 2011, 未公表

44. JMPR ④ : Glufosinate Ammonium、Pesticide residues in food, 2012 Toxicological evaluations. p547-652

45. US EPA⑬ : Memorandum: Glufosinate Ammonium. Human Health Risk Assessment for the Label Amendment Increasing the Use Rate in/on Canola, Corn (Field and Sweet), and Soybean; and Incorporate 6(a)(2) Data on Pistachio, 2017

46. US EPA⑭ : Glufosinate Ammonium; Pesticide Tolerances : Federal Register Vol. 84, No. 94, 21706-21708, 2019.

47. 食品健康影響評価の結果の通知について（令和 4 年 3 月 9 日付け府食第 108 号）

48. 食品健康影響評価について（令和 4 年 11 月 24 日付け厚生労働省発行第 1124 号）

49. 食品健康影響評価の結果の通知について（令和 5 年 2 月 1 日付け府食第 31 号）

50. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示 370 号）の一部を改正する件（令和 5 年厚生労働省告示第 370 号）について

51. 食品健康影響評価について（令和 6 年 6 月 12 日付け消費者庁発行第 71 号）

52. グルホシネート安全性評価資料 試験成績の概要及び考察、日本アグロサービス株式会社、2022 年、一部公表

53. Metabolism of ¹⁴C-glufosinate-ammonium in rice plant (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2021.

54. Metabolism of ¹⁴C-glufosinate-ammonium in cabbage plant (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2021.

55. Metabolism of ¹⁴C-glufosinate-ammonium in tomato plant (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2021.

56. グルホシネート (SCC-010) の水田畠畔への作物残留試験（試験番号: 16C-N079): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2019.

57. グルホシネート (SCC-010) の小麦への作物残留試験（試験番号: 15C-G080) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

58. グルホシネート (SCC-010) の小麦への作物残留試験(試験番号: 16C-G039) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

59. グルホシネート (SCC-010) のばれいしょへの作物残留試験(試験番号: 16C-G050) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

60. グルホシネート (SCC-010) のばれいしょへの作物残留試験(試験番号: 17C-G031) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
61. グルホシネート (SCC-010) のかんしょへの作物残留試験(試験番号: 18C-G029) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
62. グルホシネート (SCC-010) のかんしょへの作物残留試験(試験番号: 19C-G075) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
63. グルホシネート (SCC-010) のかんしょへの作物残留試験(試験番号: 19C-G046) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
64. グルホシネート (SCC-010) のだいこんへの作物残留試験(試験番号: 15C-G010) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
65. グルホシネート (SCC-010) のだいこんへの作物残留試験(試験番号: 16C-G038) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
66. グルホシネート (SCC-010) のはくさいへの作物残留試験(試験番号: 15C-G084) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
67. グルホシネート (SCC-010) のはくさいへの作物残留試験(試験番号: 16C-G037) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
68. グルホシネート (SCC-010) のキャベツへの作物残留試験(試験番号: 15C-G083) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2019.
69. グルホシネート (SCC-010) のキャベツへの作物残留試験(試験番号: 16C-G040) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2019.
70. グルホシネート (SCC-010) のブロッコリーへの作物残留試験(試験番号: 16C-G056) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
71. グルホシネート (SCC-010) の結球レタスへの作物残留試験(試験番号: 16C-G051) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
72. グルホシネート (SCC-010) の結球レタスへの作物残留試験(試験番号: 18C-G021) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
73. グルホシネート (SCC-010) の結球レタスへの作物残留試験(試験番号: 19C-G043) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
74. グルホシネート (SCC-010) のたまねぎへの作物残留試験(試験番号: 15C-G082) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2018.
75. グルホシネート (SCC-010) のたまねぎへの作物残留試験(試験番号: 16C-G041) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
76. グルホシネート (SCC-010) のねぎへの作物残留試験(試験番号: 16C-G052) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
77. グルホシネート (SCC-010) のねぎへの作物残留試験(試験番号: 18C-G022) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
78. グルホシネート (SCC-010) のねぎへの作物残留試験(試験番号: 19C-G074) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
79. グルホシネート (SCC-010) のねぎへの作物残留試験(試験番号: 20C-G072) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2021.

80. グルホシネート (SCC-010) のトマトへの作物残留試験(試験番号: 19C-G045) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
81. グルホシネート (SCC-010) のミニトマトへの作物残留試験(試験番号: 16C-G046) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
82. グルホシネート (SCC-010) のミニトマトへの作物残留試験(試験番号: 18C-G017) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
83. グルホシネート (SCC-010) のピーマンへの作物残留試験(試験番号: 16C-G048) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
84. グルホシネート (SCC-010) のピーマンへの作物残留試験(試験番号: 18C-G019) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
85. グルホシネート (SCC-010) のなすへの作物残留試験(試験番号: 16C-G047) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
86. グルホシネート (SCC-010) のなすへの作物残留試験(試験番号: 18C-G018) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
87. グルホシネート (SCC-010) のなすへの作物残留試験(試験番号: 19C-G044) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2021.
88. グルホシネート (SCC-010) のきゅうりへの作物残留試験(試験番号: 16C-G049) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
89. グルホシネート (SCC-010) のきゅうりへの作物残留試験(試験番号: 18C-G020) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
90. グルホシネート (SCC-010) のきゅうりへの作物残留試験(試験番号: 19C-G042) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
91. グルホシネート (SCC-010) のほうれんそうへの作物残留試験(試験番号: 16C-G053) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
92. グルホシネート (SCC-010) のほうれんそうへの作物残留試験(試験番号: 17C-G060) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
93. グルホシネート (SCC-010) のほうれんそうへの作物残留試験(試験番号: 18C-G023) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
94. グルホシネート (SCC-010) のさやえんどうへの作物残留試験(試験番号: 16C-N057): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2018.
95. グルホシネート (SCC-010) のさやいんげんへの作物残留試験(試験番号: 16C-G058) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
96. グルホシネート (SCC-010) のえだまめへの作物残留試験(試験番号: 16C-G055) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
97. グルホシネート (SCC-010) の温州みかんへの作物残留試験(試験番号: 18C-G025) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
98. グルホシネート (SCC-010) の温州みかんへの作物残留試験(試験番号: 19C-G039) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.
99. グルホシネート (SCC-010) のかぼすへの作物残留試験(試験番号: 19C-N084): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

100. グルホシネート (SCC-010) のかぼすへの作物残留試験(試験番号: 20C-N060): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

101. グルホシネート (SCC-010) のゆずへの作物残留試験(試験番号: 19C-N086): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

102. グルホシネート (SCC-010) のりんごへの作物残留試験(試験番号: 18C-G026) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

103. グルホシネート (SCC-010) のりんごへの作物残留試験(試験番号: 18C-G041) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

104. グルホシネート (SCC-010) のなしへの作物残留試験(試験番号: 18C-G027) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

105. グルホシネート (SCC-010) のなしへの作物残留試験(試験番号: 19C-G040) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

106. グルホシネート (SCC-010) のももへの作物残留試験(試験番号: 18C-G028) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

107. グルホシネート (SCC-010) のももへの作物残留試験(試験番号: 20C-G061) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2021.

108. グルホシネート (SCC-010) のぶどうへの作物残留試験(試験番号: 16C-G044) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

109. グルホシネート (SCC-010) のぶどうへの作物残留試験(試験番号: 18C-G016) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

110. グルホシネート (SCC-010) のかきへの作物残留試験(試験番号: 16C-G042) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

111. グルホシネート (SCC-010) のかきへの作物残留試験(試験番号: 17C-G059) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

112. グルホシネート (SCC-010) のかきへの作物残留試験(試験番号: 18C-G014) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2020.

113. Glufosinate ammonium: pharmacokinetic study following a single oral gavage administration in male and female rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2019.

114. [¹⁴C]Glufosinate ammonium: Tissue distribution study following a single oral gavage administration in male and female Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2019.

115. [¹⁴C]Glufosinate ammonium: Mass/excretion balance study following a single oral gavage administration in male and female Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2020.

116. [¹⁴C]Glufosinate ammonium: Biliary excretion study following a single oral gavage administration in male and female Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2020.

117. Glufosinate ammonium technical: Acute oral toxicity study (acute toxic class method) in Wistar rats (GLP 対応): Advinus Therapeutics Limited, 2014.

118. Glufosinate ammonium technical: Acute dermal toxicity study in Wistar rats (GLP 対応): Advinus Therapeutics Limited, 2014.

119. Glufosinate ammonium technical: Acute inhalation toxicity study in Wistar rats (GLP 対応): Advinus Therapeutics Limited, 2014.

120. Glufosinate ammonium technical: Acute inhalation toxicity study in Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2021.

121. Glufosinate ammonium technical: Skin sensitization study (Magnusson and Kligman test) in Guinea pigs (GLP 対応): Advinus Therapeutics Limited, 2014.

122. Glufosinate ammonium technical: 90-Day dietary toxicity study in Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2017.

123. Glufosinate ammonium technical: 28-Day dietary dose range finding study in Wistar rats: Advinus Therapeutics Limited, 2015.

124. Glufosinate ammonium technical: 90-Day dietary dose range finding toxicity study in Swiss albino mice (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2017.

125. Glufosinate ammonium technical: 28-Day dietary toxicity study in Swiss albino mice: Eurofins Advinus Limited, 2017.

126. A 13-week oral toxicity study in beagle dogs (GLP 対応): ITR Laboratories Canada Inc., 2017.

127. Glufosinate ammonium technical: A 28-Day repeated dose oral (capsule) range finding toxicity study in beagle dogs: ITR Laboratories Canada Inc., 2016.

128. Glufosinate ammonium technical: A 52-week oral toxicity study in beagle dogs (GLP 対応): ITR Laboratories Canada Inc., 2018.

129. Glufosinate ammonium technical: Combind chronic toxicity and carcinogenicity study in the Wistar rat (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2019.

130. Glufosinate ammonium technical: 18 Months oral carcinogenicity study in Swiss albino mice (GLP 対応): Combind chronic toxicity and carcinogenicity study in the Wistar rat (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2019.

131. Glufosinate ammonium technical: Acute neurotoxicity study in Wistar rats: Eurofins Advinus Limited, 2018.

132. Glufosinate ammonium technical: 90-Day dietary neurotoxicity study in Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2018.

133. Glufosinate ammonium technical: Two generation reproduction toxicity study through diet in Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2020.

134. Glufosinate ammonium technical: Embryo-fetal developmental toxicity study in Wistar rats (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2018.

135. Glufosinate ammonium technical: Embryo-fetal developmental toxicity study in New Zealand white rabbits (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2018.

136. Glufosinate ammonium technical: Bacterial reverse mutation test (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2014.

137. Glufosinate ammonium technical: *In vitro* mammalian chromosome aberration test in CHO cells (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2015.

138. Mammalian erythrocyte micronucleus test following oral administration of glufosinate ammonium technical to Swiss albino mice (GLP 対応): Eurofins Advinus Limited, 2015.

139. Acute oral toxicity study of glufosinate ammonium metabolite in rats (GLP 対応): Bozo Research Center Inc., 2017.

140. A bacterial reverse mutation test of glufosinate ammonium metabolite (GLP 対応): Bozo Research Center Inc., 2017.

141. 農薬抄録 グルホシネート (除草剤) (令和 5 年 6 月 30 日改訂) : BASF ジャパン株式会社、一部公表

142. グルホシネートのたまねぎへの作物残留試験(試験番号: 20C-G015) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2021.

143. グルホシネートのたまねぎへの作物残留試験(試験番号: 20C-G016) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2021.

144. グルホシネートのひまわり (種子) への作物残留試験(試験番号: 20C-N019) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2022

145. グルホシネートのたまねぎへの作物残留試験(試験番号: 20C-G016) (GLP 対応): 公益財団法人日本植物調節剤研究協会, 2021

146. Liberty 280 SL (Glufosinate-ammonium): Magnitude of Residues in/on Cotton (GLP 対応): Bayer CropScienc, 2017.

147. Glufosinate: Magnitude of the Residue on Hops (GLP 対応): Rutgers, The State University of New Jersey, 2019.

148. Hydrolysis as a Function of pH of Glufosinate Ammonium Technical (GLP 対応): Analytical R&D Department Advinus Therapeutics Limited, 2014

149. Aqueous Photolysis of [¹⁴C]Glufosinate Ammonium in Sterile Buffers Under Artificial Sunlight (GLP 対応) : Concord Biosciences,LCC、 2019

150. APVMA② : Acceptable daily intakes (ADI) for agricultural and veterinary chemicals used in food producing crops or animals、 2024 年

151. APVMA③ : Acute reference doses (ARfD) for agricultural and veterinary chemicals used in food producing crops or animals、 2024 年

152. EFSA ① : Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance、 2005 年

153. EFSA② : Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for glufosinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005、 2015 年

第二部
農薬評価書

グルホシネートP
(第6版)

令和7年(2025年)2月
食品安全委員会

目 次

	頁
○ 審議の経緯.....	3
○ 食品安全委員会委員名簿.....	5
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	5
○ 食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿.....	7
○ 要 約.....	9
 I. 評価対象農薬の概要.....	 10
1. 用途.....	10
2. 有効成分の一般名.....	10
3. 化学名.....	10
4. 分子式.....	10
5. 分子量.....	10
6. 構造式.....	10
7. 開発の経緯.....	10
 II. 安全性に係る試験の概要.....	 12
1. 土壤中動態試験.....	12
(1) 好気的湛水土壤中動態試験	12
(2) 好気的土壤中動態試験	12
(3) 土壤吸着試験	13
2. 水中動態試験.....	13
(1) 加水分解試験	13
(2) 水中光分解試験（滅菌緩衝液及び自然水）	13
3. 土壤残留試験.....	14
4. 植物、家畜等における代謝及び残留試験.....	14
(1) 植物代謝試験	14
(2) 作物残留試験	16
5. 動物体内動態試験.....	16
(1) ラット	16
6. 急性毒性試験等.....	18
(1) 急性毒性試験（経口投与）	18
(2) 一般薬理試験	19
7. 亜急性毒性試験.....	20
(1) 90日間亜急性毒性試験（ラット）	20
(2) 90日間亜急性毒性試験（マウス）	21
(3) 90日間亜急性毒性試験（イヌ）	21

8. 慢性毒性試験及び発がん性試験.....	22
(1) 1年間慢性毒性試験（ラット）	22
(2) 1年間慢性毒性試験（イヌ）	22
(3) 2年間発がん性試験（ラット）	22
(4) 18か月間発がん性試験（マウス）	23
9. 神経毒性試験.....	24
(1) 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）	24
10. 生殖発生毒性試験.....	24
(1) 2世代繁殖試験（ラット）	24
(2) 発生毒性試験（ラット）	25
(3) 発生毒性試験（ウサギ）	26
11. 遺伝毒性試験.....	26
12. 経皮投与、吸入ばく露等試験.....	27
(1) 急性毒性試験（経皮投与及び吸入ばく露）	27
(2) 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	27
III. 安全性に係る試験の概要（代謝物）	28
1. 急性毒性試験等.....	28
(1) 急性毒性試験（経口投与、代謝物B、原体混在物AHI-B及びAHI-Cの混合物並びに原体混在物AHI-D）	28
2. 遺伝毒性試験（代謝物B、原体混在物AHI-B及びAHI-Cの混合物並びに原体混在物AHI-D）	28
IV. 食品健康影響評価.....	30
・別紙1：代謝物/分解物/原体混在物略称.....	35
・別紙2：検査値等略称.....	36
・別紙3：作物残留試験.....	37
・参照.....	44

＜審議の経緯＞

－第1版関係－

2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照1）

2007年 6月 21日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（新規：かんきつ、なす、トマト等）

2007年 7月 13日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0713006号）

2007年 7月 17日 関係書類の接受（参照2、3）

2007年 7月 19日 第199回食品安全委員会（要請事項説明）

2008年 3月 25日 第13回農薬専門調査会確認評価第三部会

2008年 9月 1日 追加資料受理（参照4）

2008年 12月 12日 第18回農薬専門調査会確認評価第二部会

2009年 8月 21日 第54回農薬専門調査会幹事会

2009年 9月 17日 第302回食品安全委員会（報告）

2009年 9月 17日 から10月16日まで 国民からの意見・情報の募集

2009年 11月 13日 第57回農薬専門調査会幹事会

2010年 2月 12日 第60回農薬専門調査会幹事会

2010年 2月 23日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2010年 2月 25日 第321回食品安全委員会

2010年 2月 25日 厚生労働大臣へ通知（参照5）

2011年 3月 15日 残留農薬基準告示（参照6）

－第2版関係－

2011年 10月 13日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：ホップ）

2011年 11月 15日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安1115第2号）

2011年 11月 18日 関係書類の接受（参照7～9）

2011年 11月 24日 第408回食品安全委員会（要請事項説明）

2012年 3月 2日 第81回農薬専門調査会幹事会

2012年 3月 6日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2012年 3月 8日 第422回食品安全委員会（報告）
(同日付け農林水産大臣及び厚生労働大臣へ通知)（参照10、11）

2012年 6月 7日 残留農薬基準告示（参照12）

－第3版関係－

2013年 3月 19日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び

基準値設定依頼（適用拡大：ぎばうし）

2013年 6月 11日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0611 第 3 号）

2013年 6月 12日 関係書類の接受（参照 13～15）

2013年 6月 17日 第 478 回食品安全委員会（要請事項説明）

2013年 7月 29日 第 483 回食品安全委員会（審議）
(同日付け厚生労働大臣へ通知) (参照 16)

2014年 10月 3日 残留農薬基準告示（参照 17）

—第 4 版関係—

2021年 7月 28日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：さとうきび）

2021年 8月 25日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食 0825 第 3 号）、関係書類の接受（参照 18～23）

2021年 8月 31日 第 830 回食品安全委員会（要請事項説明）

2021年 10月 13日 第 13 回農薬第二専門調査会

2021年 11月 8日 第 14 回農薬第二専門調査会

2021年 12月 6日 第 15 回農薬第二専門調査会

2022年 1月 18日 第 844 回食品安全委員会（報告）

2022年 1月 19日 から 2 月 17 日まで 国民からの意見・情報の募集

2022年 2月 28日 農薬第二専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2022年 3月 8日 第 850 回食品安全委員会（報告）
(3 月 9 日付け厚生労働大臣へ通知) (参照 24)

2023年 10月 18日 残留農薬基準告示（参照 28）

—第 5 版関係—

2022年 9月 1日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：ごま）

2022年 11月 24日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食 1124 第 1 号）、関係書類の接受（参照 25～27）

2022年 11月 29日 第 880 回食品安全委員会（要請事項説明）

2023年 1月 31日 第 887 回食品安全委員会（審議）
(2 月 1 日付け厚生労働大臣へ通知)

2023年 10月 18日 残留農薬基準告示（参照 28）

—第 6 版関係—

2024年 6月 12日 内閣総理大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（消食基第71号）（参照29）
2024年 6月 18日 第943回食品安全委員会（要請事項説明）
2024年 10月 21日 第34回農薬第二専門調査会
2024年 11月 18日 第35回農薬第二専門調査会
2025年 1月 27日 農薬第二専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
2025年 2月 4日 第971回食品安全委員会（報告）
（2月6日付け内閣総理大臣へ通知）

＜食品安全委員会委員名簿＞

(2009年6月30日まで)	(2011年1月6日まで)	(2012年6月30日まで)
見上 彪（委員長）	小泉直子（委員長）	小泉直子（委員長）
小泉直子（委員長代理*）	見上 彪（委員長代理*）	熊谷 進（委員長代理*）
長尾 拓	長尾 拓	長尾 拓
野村一正	野村一正	野村一正
畠江敬子	畠江敬子	畠江敬子
廣瀬雅雄**	廣瀬雅雄	廣瀬雅雄
本間清一	村田容常	村田容常
* : 2007年2月1日から	* : 2009年7月9日から	* : 2011年1月13日から
** : 2007年4月1日から		

(2015年6月30日まで)	(2024年6月30日まで)
熊谷 進（委員長）	山本茂貴（委員長）
佐藤 洋（委員長代理）	浅野 哲（委員長代理 第一順位）
山添 康（委員長代理）	川西 徹（委員長代理 第二順位）
三森国敏（委員長代理）	脇 昌子（委員長代理 第三順位）
石井克枝	香西みどり
上安平冽子	松永 和紀
村田容常	吉田 充

(2024年7月1日から)
山本茂貴（委員長）
浅野 哲（委員長代理 第一順位）
祖父江友孝（委員長代理 第二順位）
頭金正博（委員長代理 第三順位）
小島登貴子
杉山久仁子
松永和紀

＜食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿＞

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	三枝順三	西川秋佳**
林 真 (座長代理*)	佐々木有	布柴達男
赤池昭紀	代田眞理子****	根岸友惠
石井康雄	高木篤也	平塚 明
泉 啓介	玉井郁巳	藤本成明
上路雅子	田村廣人	細川正清
臼井健二	津田修治	松本清司
江馬 真	津田洋幸	柳井徳磨
大澤貫寿	出川雅邦	山崎浩史
太田敏博	長尾哲二	山手丈至
大谷 浩	中澤憲一	與語靖洋
小澤正吾	納屋聖人	吉田 緑
小林裕子	成瀬一郎***	若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	佐々木有	平塚 明
林 真 (座長代理)	代田眞理子	藤本成明
相磯成敏	高木篤也	細川正清
赤池昭紀	玉井郁巳	堀本政夫
石井康雄	田村廣人	松本清司
泉 啓介	津田修治	本間正充
今井田克己	津田洋幸	柳井徳磨
上路雅子	長尾哲二	山崎浩史
臼井健二	中澤憲一*	山手丈至
太田敏博	永田 清	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	義澤克彦**
小澤正吾	西川秋佳	吉田 緑
川合是彰	布柴達男	若栗 忍
小林裕子	根岸友惠	
三枝順三***	根本信雄	

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

(2012年3月31日まで)

納屋聖人 (座長)	佐々木有	平塚 明
林 真 (座長代理)	代田眞理子	福井義浩
相磯成敏	高木篤也	藤本成明
赤池昭紀	玉井郁巳	細川正清

浅野 哲**	田村廣人	堀本政夫
石井康雄	津田修治	本間正充
泉 啓介	津田洋幸	増村健一**
上路雅子	長尾哲二	松本清司
臼井健二	永田 清	柳井徳磨
太田敏博	長野嘉介*	山崎浩史
小澤正吾	西川秋佳	山手丈至
川合是彰	布柴達男	與語靖洋
川口博明	根岸友惠	義澤克彦
葉形麻樹子***	根本信雄	吉田 緑
小林裕子	八田稔久	若栗 忍
三枝順三		

* : 2011年3月1日まで

** : 2011年3月1日から

*** : 2011年6月23日から

＜食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿＞

(2022年3月31日まで)

浅野 哲* (座長)	篠原厚子
赤池昭紀 (座長**)	清家伸康
平塚 明 (座長代理)	田中徹也
稻見圭子	豊田武士
佐藤順子***	中塚敏夫

野村崇人

藤本成明

森田 健

* : 2021年6月30日まで

** : 2021年7月5日から

*** : 2021年8月4日から

(2024年4月1日から)

堀本政夫 (座長)	金田勝幸
義澤克彦 (座長代理)	佐藤順子
安部賀央里	田中徹也
稻見圭子	野村崇人

藤本成明

安彦行人

山折 大

＜第13回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

久米利明 (農薬第五専門調査会専門委員)

堀本政夫 (元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授)

＜第14回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

久米利明 (農薬第五専門調査会専門委員)

堀本政夫 (元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授)

＜第15回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

久米利明 (農薬第五専門調査会専門委員)

堀本政夫 (元千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授)

＜第34回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

篠原厚子（清泉女子大学人文科学研究所教授）
清家伸康（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門グループ長）
平塚 明（東京薬科大学名誉教授）
森田 健（独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター上席技術専門官）

＜第35回農薬第二専門調査会専門参考人名簿＞

篠原厚子（清泉女子大学人文科学研究所教授）
清家伸康（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門グループ長）
平塚 明（東京薬科大学名誉教授）
森田 健（独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター上席技術専門官）

要 約

アミノ酸系除草剤である「グルホシネートP」（CAS No. 70033-13-5）について、各種資料用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に用いた試験成績は、植物代謝（水稻、キャベツ等）、作物残留、動物体内動態（ラット）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（ラット及びイヌ）、発がん性（ラット及びマウス）、亜急性神経毒性（ラット）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等である。

各種毒性試験結果から、グルホシネートP投与による影響は、主に腎臓（重量増加等）及び中枢神経系（大脳の神経網空胞化等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物中のはく露評価対象物質をグルホシネートP及び代謝物Bと設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた2世代繁殖試験の0.91 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.0091 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、グルホシネートPの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験の1 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.01 mg/kg 体重を急性参考用量（ARfD）と設定した。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

除草剤

2. 有効成分の一般名

和名：グルホシネート P ナトリウム塩

英名：glufosinate-P sodium salt (ISO 名)

3. 化学名

IUPAC

和名：ナトリウム=[(3*S*)-3-アミノ-3-カルボキシプロピル]

メチルホスフィナート

英名：sodium [(3*S*)-3-amino-3-carboxypropyl]

methylphosphinate

CAS (No. 70033-13-5)

和名：(2*S*)-2-アミノ-4-(ヒドロキシメチルホスフィニル)ブタン酸
ナトリウム塩

英名：(2*S*)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid
sodium salt


4. 分子式

C₅H₁₁NO₄PNa

5. 分子量

203.11

6. 構造式



7. 開発の経緯

グルホシネート P ナトリウム塩は、明治製菓株式会社（現 三井化学クロップ＆ライフソリューション株式会社）によって開発されたアミノ酸系除草剤である。グ

ルタミン合成酵素阻害によりアンモニアが蓄積し、植物の生理機能を阻害して殺草活性を示すと考えられている。先に国内で登録されたグルホシネートが、光学異性体 (*R* 体及び *S* 体) のラセミ体であるのに対して、グルホシネート P ナトリウム塩は活性本体である *S* 体を選択的に製造したものである。グルホシネート P ナトリウム塩は、我が国で 2011 年に農薬登録された。

II. 安全性に係る試験の概要

各種動態試験 [II. 1、2、4及び5] には、グルホシネートPの3及び4位の炭素を¹⁴Cで標識したもの（以下 [II. 1、2、4及び5]において「¹⁴C-グルホシネートP」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からグルホシネートPの濃度（mg/kg又は μ g/g）に換算した値として示した。

代謝物/分解物/原体混在物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。

1. 土壤中動態試験

(1) 好気的湛水土壤中動態試験

¹⁴C-グルホシネートPを、水深約1cmで湛水状態にした埴壌土（埼玉）に940g ai/haとなるように処理し、25±1°Cの暗所で、非滅菌土壤は119日間、滅菌土壤は32日間インキュベートして、好気的湛水土壤中動態試験が実施された。

非滅菌土壤では、グルホシネートPは極めて急速に分解され、処理7日後で65.7%TAR、14日後で10.3%TAR、59日後では1.0%TARにまで低下した。主要分解物はB及びCO₂であった。分解物Bは、処理32日後に最高値の33.9%TARに到達したが、その後は急速に分解し、119日後には8.6%TARであった。CO₂の生成量は経時的に増大し、処理119日後までに50.7%TARに達した。この分解は主に土壤微生物によると推定され、滅菌土壤では32日間で未変化のグルホシネートPは81.7%TARに低下したのみであった。

好気的湛水条件の非滅菌土壤におけるグルホシネートPの推定半減期は6.9日、主要分解物であるBの推定半減期は30.1日であった。

好気的湛水土壤における主要分解経路は、土壤微生物により分解物H及びBを経由して急速に分解され、最終的にCO₂に無機化されるほか、結合性残留物を生成するものと推測された。（参照2、19）

(2) 好気的土壤中動態試験

最大容水量の50%に調整した埴壌土（埼玉）に¹⁴C-グルホシネートPを710g ai/haとなるように処理し、25±1°Cの暗所で、非滅菌土壤は120日間、滅菌土壤は30日間インキュベートして、好気的土壤中動態試験が実施された。

非滅菌土壤では、グルホシネートPは急速に分解され、処理3日後で50.9%TAR、120日後では0.2%TARまで低下した。主要分解物はB、F及びCO₂であった。分解物Bは、処理7日後に最高値の19.9%TARに到達したが、その後は急速に分解し、120日後には1.4%TARとなった。分解物Fも処理14日後に最高値の9.6%TARに到達したが、その後は急速に分解し、120日後には検出されなかつた。CO₂の生成量は経時的に増大し、処理120日後までに64.4%TARに達した。この分解は主に土壤微生物によると推定され、滅菌土壤では30日間で未変化のグルホシネートPは75.1%TARに低下したのみであった。

好気的条件の非滅菌土壤におけるグルホシネートPの推定半減期は3.3日、主要分解物であるBの推定半減期は27.1日であった。

好気的土壤における主要分解経路は、土壤微生物により分解物B及びFを経由して急速に分解され、最終的にCO₂に無機化されるほか、結合性残留物を生成するものと推測された。（参照2、19）

（3）土壤吸着試験

5種類の国内土壤〔砂壤土（青森）、壤土（福島）、シルト質壤土（栃木）、シルト質埴土（埼玉）及び砂土（徳島）〕を用いて、土壤吸着試験が実施された。

Freundlichの吸着係数K_{ads}は0.61～351、有機炭素含有率により補正した吸着係数K_{oc}は14.3～3,980であった。徳島土壤は吸着率が著しく低かったため、吸着係数の算出ができなかった。（参照2、19）

2. 水中動態試験

（1）加水分解試験

pH4（クエン酸緩衝液）、pH5（クエン酸緩衝液）、pH7（リン酸緩衝液）及びpH9（ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液に窒素ガスを通気した後、¹⁴C-グルホシネートPを5mg/Lとなるように添加し、25±1°Cで29日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

全ての緩衝液において、29日間のインキュベーションでグルホシネートPの有意な分解は認められなかった。したがって、推定半減期は算出できなかった。（参照2、19）

（2）水中光分解試験（滅菌緩衝液及び自然水）

pH5（酢酸緩衝液）、pH7（リン酸緩衝液）、pH9（ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液及び滅菌自然水〔湖水（米国）、pH8.3〕に¹⁴C-グルホシネートPを2mg/Lの用量で添加し、25±1°Cでキセノン光（光強度：455W/m²、波長範囲：300～800nm；光強度：48.4W/m²、波長範囲：300～400nm）を最長296時間連続照射して、水中光分解試験が実施された。

グルホシネートPの推定半減期はpH5で173日、pH7で852日、pH9で64.8日及び自然水で35.8日であった。東京における春の太陽光下での推定半減期に換算すると、pH5及び7で1年超、pH9で399日、自然水で220日であった。

pH5及び7の緩衝液中ではグルホシネートPの有意な分解は認められなかった。pH9の緩衝液及び自然水中で同定された分解物はBのみであった（pH9で8.7%TAR、自然水で12.9%TAR）。

水中における光分解経路は、酸化的脱アミノ化とそれに続く酸化的脱炭酸により分解物Bを生成する経路と推測された。（参照2、19）

3. 土壤残留試験

洪積土・砂壤土（福島）、火山灰土・軽埴土（茨城）及び沖積土・軽埴土（福岡）を用いて、グルホシネート P 及び分解物 B を分析対象化合物とした土壤残留試験（容器内及びほ場）が実施された。

結果は表 1 に示されている。（参照 2、19）

表 1 土壤残留試験成績

試験		濃度 ¹⁾	土壤	推定半減期(日)		
				グルホシネート P	グルホシネート P + 分解物 B	
容器内 試験	畑水分状態	2 mg/kg (1回)	洪積土・砂壤土	約 1.0	約 1.4	
			火山灰土・軽埴土	約 0.6	約 0.7	
	湛水状態	1 mg/kg (1回)	火山灰土・軽埴土	約 0.7	約 1.5	
			沖積土・軽埴土	約 1.5	約 4.9	
ほ場 試験	畠地状態	2,300 g ai/ha (3回)	洪積土・砂壤土	約 8.8	約 19.9	
			火山灰土・軽埴土	約 8.0	約 8.6	
	水田状態		火山灰土・軽埴土	約 4.3	約 4.8	
			沖積土・軽埴土	約 4.4	約 5.2	

¹⁾ 容器内試験では標準品、ほ場試験では 11.5% 液剤が使用された。

4. 植物、家畜等における代謝及び残留試験

(1) 植物代謝試験

① 水稻

¹⁴C-グルホシネート P を 4.77 mg/ポット（最大慣行施用量）で土壤表面に処理後、土壤混和し、処理 7 日後に約 3 cm の水深で湛水した。処理 10 日後に水稻（品種：コシヒカリ）の幼苗を移植して、植物代謝試験が実施された。

処理 66 日後（中間採取期）の茎葉部における総残留放射能濃度は 0.23 mg/kg であった。処理 127 日後（収穫期）では根部で最も高い残留放射能濃度が検出され、2.11 mg/kg であった。稻わら、玄米及びもみ殻では 0.31～0.55 mg/kg の範囲であり、大きな差はみられなかった。

中間採取期の茎葉部の抽出液からは主要代謝物として B (0.07 mg/kg、29.2%TRR) 及び Fr. 3 (未同定放射性代謝物 : 0.02 mg/kg、9.5%TRR) が検出された。収穫期の玄米及び稻わら抽出液中の主要代謝物も中間採取期の茎葉部と同様であり、B (玄米 : 0.042 mg/kg、13.7%TRR、稻わら : 0.21 mg/kg、38.2%TRR) 及び Fr. 3 (玄米 : 0.025 mg/kg、8.0%TRR、稻わら : 0.043 mg/kg、7.9%TRR) が検出された。未変化のグルホシネート P はいずれの試料からも検出されなかった。（参照 2、19）

② キャベツ

キャベツ（品種：Round Dutch）の幼苗（播種約 6.5 週間後）の定植 7 日前に ^{14}C -グルホシネート P を 770 g ai/ha（処理 1 回目）、さらに第 1 回処理 72 日後（最終収穫 14 日前）に 800 g ai/ha（処理 2 回目）で植物に飛散しないように畝間に散布（土壤処理）した。また、キャベツ 1 個当たり 3.4 mg の ^{14}C -グルホシネート P を、収穫 14 日前に植物体地上部に散布（茎葉処理）して、植物代謝試験が実施された。

土壤処理区のキャベツ中総残留放射能濃度は、第 1 回処理 72 日後で 0.036 mg/kg、第 2 回処理 14 日後で 0.043 mg/kg であったことから、土壤への処理放射能がキャベツに吸収されることが示唆された。一方、茎葉処理区のキャベツ中の総残留放射能濃度は、外葉で 2.72 mg/kg、内部葉で 0.063 mg/kg であり、多くが処理部位である外葉に分布していた。

第 1 回処理 72 日後のキャベツ抽出液からは、主要代謝物として B (0.02 mg/kg、54.2%TRR) 及び未同定代謝物 (0.008 mg/kg、21.6%TRR) が検出された。第 2 回処理 14 日後においても代謝物 B (0.02 mg/kg、46.4%TRR) 及び未同定代謝物 (0.009 mg/kg、20.2%TRR) が検出された。未同定代謝物は主に 3 種の混合物であり、その中で主要な代謝物の TRR は約 8% だった。茎葉処理区の外葉の抽出液を分析した結果、大部分が未変化のグルホシネート P であったが、一部代謝物 B が検出された。（参照 2、19）

③ トマト

トマト（品種：ACE55VF）の幼苗（播種約 11 週間後）の定植 7 日前に ^{14}C -グルホシネート P を 840 g ai/ha（処理 1 回目）、さらに第 1 回処理 84 日後（収穫 14 日前）に 820 g ai/ha（処理 2 回目）で植物に飛散しないように土壤表面に散布処理して、植物代謝試験が実施された。

トマト果実中総残留放射能濃度は、第 1 回処理 84 日後で 0.010 mg/kg、第 2 回処理 14 日後で 0.013 mg/kg であったことから、土壤への処理放射能がトマト中に吸収され、移行することが示唆された。収穫期茎葉部の総残留放射能濃度は果実よりも高く、0.068 mg/kg であった。

第 1 回処理 84 日後のトマト果実抽出液からは主要代謝物として B (0.006 mg/kg、65.6%TRR) 及び未同定代謝物 (0.002 mg/kg、22.2%TRR) が検出された。第 2 回処理 14 日後のトマト果実及び茎葉部でも代謝物 B (果実: 0.009 mg/kg、73.1%TRR、茎葉: 0.049 mg/kg、71.6%TRR) 及び未同定代謝物 (果実: 0.002 mg/kg、15.2%TRR、茎葉: 0.004 mg/kg、6.0%TRR) が検出された。（参照 2、19）

植物におけるグルホシネート P の主要代謝経路は、酸化的脱アミノ化とそれに続く酸化的脱炭酸による代謝物 B の生成であった。代謝物 B は、土壤中で生成

されたものが植物体に吸収された可能性も考えられた。水稻体内では、代謝物 B はさらなる代謝を受け、抽出残渣中から認められたデンプン、ヘミセルロース、セルロース等の植物体構成成分に大部分が取り込まれて結合性残留物を形成すると考えられた。

(2) 作物残留試験

グルホシネート P 及び代謝物 B を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

結果は別紙 3 に示されている。

グルホシネート P については、登録又は申請された使用方法においてはいずれも定量限界未満であった。代謝物 B の最大残留値は、最終散布 28 及び 42 日後に収穫した甘草（ほふく茎）で認められた 0.02 mg/kg であった。（参照 2、8、14、15、19~21、26、27）

5. 動物体内動態試験

(1) ラット

① 吸収

a. 血中濃度推移

Fischer ラット（一群雌雄各 8 匹）に ^{14}C -グルホシネート P を 2 mg/kg 体重（以下 [5. (1)] において「低用量」という。）又は 100 mg/kg 体重（以下 [5. (1)] において「高用量」という。）で単回経口投与して、血中濃度推移について検討された。

血漿中薬物動態学的パラメータは表 2 に示されている。

血漿中放射能は投与 1~2 時間後に C_{max} に達した。吸収されたグルホシネート P は少量であったが速やかに排泄され、 $\text{T}_{1/2}$ は約 4 時間であった。（参照 2、19）

表 2 血漿中薬物動態学的パラメータ

投与量	2 mg/kg 体重		100 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌
T_{max} (hr)	1.0	1.0	2.0	1.0
C_{max} ($\mu\text{g/g}$)	0.05	0.05	2.33	2.36
$\text{T}_{1/2}$ (hr)	4.28	3.94	3.95	4.03
$\text{AUC}_{0-\infty}$ (hr \cdot $\mu\text{g/g}$)	0.232	0.219	14.0	14.5

b. 吸収率

胆汁中排泄試験 [5. (1)④b.] における胆汁、尿、ケージ洗浄液及びカーカス¹に回収された放射能の合計量に基づいて算出された投与後 48 時間の消化管吸

¹ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ。）。

収率は、低用量群の雄で 10.6%、雌で 14.2%、高用量群の雄で 12.6%、雌で 13.2% であった。（参照 2、19）

② 分布

Fischer ラット（一群雌雄各 9 匹）に ^{14}C -グルホシネート P を低用量又は高用量で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。

両投与量で、投与 1 時間後 (T_{\max} 付近) の消化管（内容物を含む。）に 90%TAR 以上（低用量群：16.5～19.1 $\mu\text{g/g}$ 、高用量群：891～1,020 $\mu\text{g/g}$ ）が存在し、ほかの臓器及び組織では 1%TAR 未満であった。その後、精巣及び精巣上体を除く各臓器及び組織中における放射能濃度は、投与後 72 時間までに減衰する傾向が認められた。投与 72 時間後では、高用量群の雌雄の脾臓及び胸腺、雄の腎臓及び精巣で 1.0 $\mu\text{g/g}$ 以上の放射能濃度を示したが、ほかの臓器及び組織中放射能濃度は 1.0 $\mu\text{g/g}$ 未満であった。低用量群の雌雄の腎臓、肝臓及び胸腺並びに雄の精巣での放射能濃度は 0.04 $\mu\text{g/g}$ 以上であったが、その他の臓器及び組織中では 0.04 $\mu\text{g/g}$ 未満であった。体内分布に性差は認められなかった。（参照 2、19）

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験 [5. (1)④a.] における尿及び糞を用いて代謝物同定・定量試験が実施された。

投与放射能は主に糞中に排泄された。糞中では未変化のグルホシネート P が低用量群で 54.9%TAR、高用量群で 76.5%TAR～76.9%TAR 認められた。5%TAR を超える代謝物は D（低用量群：6.5%TAR～7.5%TAR、高用量群：2.3%TAR～2.4%TAR）及び Z（低用量群：23.6%TAR～26.4%TAR、高用量群：5.1%TAR～8.6%TAR）であった。尿中に排泄された放射能は僅かであり、代謝物 B（1.3%TAR～1.8%TAR）及び G（1.3%TAR～1.8%TAR）並びに未変化のグルホシネート P（2.3%TAR～3.7%TAR）が検出された。糞及び尿中へ排泄された代謝物の割合に顕著な性差はなかった。

動物体内での推定代謝経路として、N-アセチル抱合化による代謝物 Z の生成、酸化的脱アミノ化による代謝物 H（推定代謝中間体）を経由し、H の還元により代謝物 D を生成する経路又は代謝物 H の酸化的な脱炭酸により代謝物 B を生成する経路が考えられた。（参照 2、19）

④ 排泄

a. 尿及び糞中排泄試験

Fischer ラット（一群雌雄各 4 匹）に ^{14}C -グルホシネート P を低用量又は高用量で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

いずれの投与群においても速やかに体外に排泄され、排泄の経路と速度に顕著な性差及び用量差は認められなかった。投与放射能は、投与後 72 時間で

88.5%TAR～88.9%TAR が糞中に、7.8%TAR～9.1%TAR が尿中に排泄され、主に糞中に排泄された。 (参照 2、19)

b. 胆汁中排泄試験

胆管カニューレを挿入した Fischer ラット (一群雌雄各 4 匹) に ¹⁴C-グルホシネート P を低用量又は高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 48 時間で糞中に 82.1%TAR～87.2%TAR、尿中に 7.0%TAR～8.2%TAR が排泄された。胆汁中には 0.04%TAR～0.05%TAR が排泄されたのみであり、胆汁中排泄が主要な排泄経路ではないことが確認された。 (参照 2、19)

6. 急性毒性試験等

(1) 急性毒性試験 (経口投与)

グルホシネート P (原体 [酸]²) を用いた急性毒性試験 (経口投与) が実施された。

結果は表 3 に示されている。 (参照 2、19)

表 3 急性毒性試験概要 (経口投与、原体)

動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
Wistar ラット 雌 3 匹 ^a		300～ 2,000	投与量 : 300、2,000 mg/kg 体重 2,000 mg/kg 体重 : 横臥位、うずくまり姿勢、傾眠、鎮静、自発運動低下、痙攣、呼吸緩徐、流涎及び軟便 2,000 mg/kg 体重で全例死亡

/ : 該当なし

a : 毒性等級法により実施された。溶媒として注射用水が用いられた。

グルホシネート (R 体) の急性毒性試験 (経口投与) が実施された。

結果は表 4 に示されている。 (参照 2、19、22)

表 4 急性毒性試験概要 [経口投与、グルホシネート (R 体)] <参考資料³>

動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
Wistar ラット 雌 3 匹 ^a		>2,000	軟便及び肛門周囲の被毛の汚れ 死亡例なし

/ : 該当なし

a : 毒性等級法により実施された。溶媒として注射用水が用いられた。

² 急性毒性試験等～経皮投与、吸入ばく露等試験 [II. 6.～12.] では、グルホシネート P ナトリウム塩ではなく、活性本体であるグルホシネート P [酸] を用いて実施されている。

³ グルホシネート (R 体) を用いた試験であることから、参考資料とした。

(2) 一般薬理試験

マウス及びラットを用いたグルホシネートP(原体[酸])の一般薬理試験が実施された。

結果は表5に示されている。(参照2、19)

表5 一般薬理試験概要

試験の種類	動物種	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
一般状態	Irwin法 マウス	雄5 雌5	0、50、 100、200、 400 (経口)	雄:100 雌:50	雄:200 雌:100	400 mg/kg 体重: 雄:挙尾 雌:皮膚白色化 200 mg/kg 体重以上: 雄:眼瞼下垂、警戒性異常、視覚位置異常、常同行動、受動性消失、接触反応異常、疼痛反応異常、興奮した急激な動作、振戦、ぴくつき、間代性痙攣、姿勢異常、歩行失調又は不能、正向反射異常、筋緊張異常、筋力低下、同側性屈曲反射亢進、呼吸異常、体温低下、皮膚白色化、流涎及び体重減少 雌:眼瞼下垂、警戒性異常、視覚位置異常、自発運動亢進、接触反応亢進、疼痛反応異常、挙尾、振戦、間代性痙攣、姿勢異常、歩行失調又は不能、正向反射消失、筋力低下、同側性屈曲反射亢進、呼吸異常、体温低下、流涎及び体重減少 100 mg/kg 体重: 雄:影響なし 雌:死亡を除き影響なし 雄:200 mg/kg 体重以上で死亡例 雌:100 mg/kg 体重以上で死亡例
						600 mg/kg 体重: 流涎、反応性亢進、移動性異常、接触反応亢進、運動失調、接近反応異常、覚醒状態上昇(軽度)、呼吸不全、流涙、興奮状態、疼痛反応過敏、肢筋緊張及び体重減少 死亡例なし

試験の種類		動物種	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
中枢神経系	自発運動量	SD ラット	雄 8	0、60、 200、600 (経口)	60	200	200 mg/kg 体重以上： 自発運動量減少
	電撃痙攣	ICR マウス	雄 10	0、50、 100、200 (経口)	200	—	影響なし
	Pentetrazol 痙攣	ICR マウス	雄 10	0、50、 100、200 (経口)	100	200	200 mg/kg 体重： 間代性痙攣の誘発傾向
循環器系	血圧 心拍数	SD ラット	雄 6	0、60、 200、600 (経口)	200	600	600 mg/kg 体重： 心拍数減少傾向
腎機能	尿量・電解質・浸透圧	SD ラット	雄 6	0、60、 200、600 (経口)	60	200	600 mg/kg 体重： 尿中クロール、ナトリウム及びカリウム排泄量の増加傾向 200 mg/kg 体重以上： 尿浸透圧上昇
血液系	血液凝固	SD ラット	雄 6	0、60、 200、600 (経口)	600	—	影響なし

注) 検体は脱イオン水に懸濁して用いられた。

—：最小作用量は設定できなかった。

・循環器系及び腎機能への影響試験で認められた結果については、毒性学的意義が不明と考えられたことから、ARfD のエンドポイントとしなかった。

7. 亜急性毒性試験

(1) 90 日間亜急性毒性試験 (ラット)

Fischer ラット (一群雌雄各 10 匹) を用いた混餌投与 (原体 [酸] : 0、10、30、300 及び 3,000 ppm : 平均検体摂取量は表 6 参照) による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 6 90 日間亜急性毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	30 ppm	300 ppm	3,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.7	2.0	19.7	199
	雌	0.8	2.2	22.3	217

各投与群で認められた毒性所見は表 7 に示されている。

本試験において、300 ppm 以上投与群の雄及び 3,000 ppm 投与群の雌で腎臓の絶対及び比重量⁴増加等が認められたことから、無毒性量は雄で 30 ppm (2.0

⁴ 体重比重量を比重量という (以下同じ。)。

mg/kg 体重/日)、雌で 300 ppm (22.3 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2、19)

表 7 90 日間亜急性毒性試験 (ラット) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
3,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制(投与 2~4 週)及び摂餌量減少(投与 1~3 週) RBC 及び Lym 減少 MCH 増加 無機リン増加 中性脂肪減少 	<ul style="list-style-type: none"> 体重増加抑制(投与 2~5 週)及び摂餌量減少(投与 1~5 週) WBC 及び Lym 減少 腎絶対[§]及び比重量増加 無機リン増加
300 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> WBC 減少 腎絶対及び比重量増加 	300 ppm 以下 毒性所見なし
30 ppm 以下	毒性所見なし	

§：統計学的有意差はないが、検体投与による影響と考えられた。

(2) 90 日間亜急性毒性試験 (マウス)

ICR マウス (一群雌雄各 10 匹) を用いた混餌投与 (原体 [酸] : 0、30、100、300 及び 1,000 ppm : 平均検体摂取量は表 8 参照) による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 8 90 日間亜急性毒性試験 (マウス) の平均検体摂取量

投与群	30 ppm	100 ppm	300 ppm	1,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.70	12.5	36.4
	雌	4.36	15.2	44.6

本試験において、1,000 ppm 投与群の雌雄で大脳の尾状核及び被殻の神経網領域に空胞化、雌で摂餌量減少 (投与 6 週)、脳の絶対重量減少及び副腎皮質境界部褐色色素沈着が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 300 ppm (雄 : 36.4 mg/kg 体重/日、雌 : 44.6 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2、19)

(3) 90 日間亜急性毒性試験 (イヌ)

ビーグル犬 (一群雌雄各 4 匹) を用いたカプセル経口投与 (原体 [酸] : 0、0.5、1.5 及び 5 mg/kg 体重/日) による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、5 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で跛行 (雌雄 : 投与 8 週以降) 及び異常歩行 (雌雄 : 投与 8 週以降)、同投与群の雄で耳介反射低下 (投与 8~10 週) が 1 例認められたことから、無毒性量は雌雄とも 1.5 mg/kg 体重/日であると考えられた。(参照 2、19)

8. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1年間慢性毒性試験（ラット）

Fischer ラット（一群雌雄各 24 匹）を用いた混餌投与（原体〔酸〕：0、15、30、300 及び 3,000 ppm：平均検体摂取量は表 9 参照）による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

表 9 1 年間慢性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		15 ppm	30 ppm	300 ppm	3,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.8	1.6	16.0	162
	雌	0.9	1.9	18.6	185

本試験において、3,000 ppm 投与群の雌雄で腎臓の絶対及び比重量増加、300 ppm 以上投与群の雄で体重増加抑制（300 ppm 投与群：投与 10 週以降、3,000 ppm 投与群：投与 2 週以降）及び腎臓の比重量増加、雌で腎臓の絶対重量増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 30 ppm（雄：1.6 mg/kg 体重/日、雌：1.9 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、19）

(2) 1年間慢性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口投与（原体〔酸〕：0、0.5、1.5 及び 5/3 mg/kg 体重/日）による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

本試験において、5 mg/kg 体重/日投与群の雄 1 例で投与 10 週に強直性痙攣、流涎、流涙、疼痛反応消失、瞳孔縮小等の神経症状が観察されたため切迫と殺し、投与 12 週以降は高用量が 3 mg/kg 体重/日に変更された。

本試験において、投与量の変更後には、検体投与に関連した毒性影響は雌雄とも認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも 3 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 2、19）

(3) 2年間発がん性試験（ラット）

Fischer ラット（一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌投与（原体〔酸〕：0、30、300 及び 1,000 ppm：平均検体摂取量は表 10 参照）による 2 年間発がん性試験が実施された。

表 10 2 年間発がん性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		30 ppm	300 ppm	1,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.4	13.7	45.3
	雌	1.6	16.3	54.7

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

1,000 ppm 投与群の雌雄で近位尿細管上皮細胞肥大及び体重増加抑制（雌雄：投与 2 週以降）、300 ppm 以上投与群の雌雄で腎臓の絶対及び比重量増加が認められた。

本試験において、300 ppm 以上投与群雌雄で腎臓の絶対及び比重量増加が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 30 ppm（雄：1.4 mg/kg 体重/日、雌：1.6 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、19）

（4）18か月間発がん性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 52 匹）を用いた混餌投与（原体〔酸〕：0、100、300 及び 1,000/600/450 ppm：平均検体摂取量は表 11 参照）による 18 か月間発がん性試験が実施された。

表 11 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		100 ppm	300 ppm	1,000/600/450 ppm	1,000/600 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	9.18	28.1	/	69.5
	雌	9.06	27.6	66.0	/

/：該当なし

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

1,000 ppm 投与群で検体投与の影響が疑われる死亡又は瀕死動物が雄で投与 21 週以降、雌で投与 13 週以降に認められ、そのうち雄の 2 例では瀕死期（投与 21 及び 25 週）に触発運動、痙攣、跳躍又は挙尾が観察された。これらの死亡又は瀕死は検体投与に起因したものと考えられたため、雌では投与 19 週以降、雄では投与 26 週以降に用量を 1,000 ppm から 600 ppm に変更された。その後、雌では再び検体投与の影響が疑われる死亡又は瀕死動物が認められたため、投与 63 週以降に用量を再度変更し、450 ppm とされた。

300 及び 100 ppm 投与群の雌で悪性リンパ腫の発生頻度が統計学的に有意に低下したが、毒性学的意義はないと考えられた。

本試験において、1,000/600 ppm 投与群の雄で大脳の神経網空胞化及び神経細胞壞死、1,000/600/450 ppm 投与群の雌で大脳の神経網空胞化及び神経細胞壞死、腎臓の絶対及び比重量増加、近位尿細管直部上皮肥大及び副腎皮髄境界部褐色色素（セロイド色素又はリポフスチン）沈着、300 ppm 投与群の雌の死亡又は切迫と殺動物 13 例中 1 例で大脳の神経網空胞化が認められたことから、無毒性量は雄で 300 ppm（28.1 mg/kg 体重/日）、雌で 100 ppm（9.06 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、19）

9. 神経毒性試験

(1) 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット)

Fischer ラット (一群雌雄各 10 匹) を用いた混餌投与 (原体 [酸] : 0、30、300 及び 3,000 ppm : 平均検体摂取量は表 12 参照) による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

表 12 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群	30 ppm	300 ppm	3,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	1.74	17.8
	雌	2.07	20.7

各投与群で認められた毒性所見は表 13 に示されている。

神経病理組織学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、3,000 ppm 投与群の雌で瞳孔径縮小、前肢握力低下等、300 ppm 以上投与群の雄で自発運動量減少及び体重増加抑制が認められたことから、亜急性神経毒性に対する無毒性量は雄で 30 ppm (1.74 mg/kg 体重/日) 、雌で 300 ppm (20.7 mg/kg 体重/日) であると考えられた。 (参照 2、19)

表 13 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
3,000 ppm	・瞳孔径縮小(投与 8 週) ・瞳孔反射低下(投与 4 及び 13 週) ・摂餌量減少(投与 1~3 週)	・瞳孔径縮小(投与 4 週) ・瞳孔反射低下(投与 4 及び 13 週) ・前肢握力低下(投与 2 及び 4 週)
300 ppm 以上	・自発運動量減少(投与 2 週) ・体重増加抑制(投与 11~13 週 ^a)	300 ppm 以下 毒性所見なし
30 ppm	毒性所見なし	

^a : 3,000 ppm 投与群では投与 1 週以降。

10. 生殖発生毒性試験

(1) 2 世代繁殖試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 24 匹) を用いた混餌投与 (原体 [酸] : 0、15、120 及び 1,000 ppm : 平均検体摂取量は表 14 参照) による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 14 2 世代繁殖試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群	15 ppm	120 ppm	1,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	0.81
		雌	1.31
	F ₁ 世代	雄	0.91
		雌	1.36

各投与群で認められた毒性所見は表 15 に示されている。

本試験において親動物では、1,000 ppm 投与群の P 世代の雌雄で腎臓の絶対重量増加等、120 ppm 以上投与群の F₁ 世代の雌雄で腎臓の絶対及び比重量増加、児動物では、1,000 ppm 投与群の F₁ 世代で産児数減少等、120 ppm 以上投与群の F₂ 世代で腎臓の絶対及び比重量増加が認められたことから、無毒性量は親動物では P 世代の雌雄で 120 ppm (雄: 6.42 mg/kg 体重/日、雌: 10.3 mg/kg 体重/日)、F₁ 世代の雌雄で 15 ppm (雄: 0.91 mg/kg 体重/日、雌: 1.36 mg/kg 体重/日)、児動物では F₁ 世代で 120 ppm (雄: 6.42 mg/kg 体重/日、雌: 10.3 mg/kg 体重/日)、F₂ 世代で 15 ppm (雄: 0.91 mg/kg 体重/日、雌: 1.36 mg/kg 体重/日) であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。(参照 2、19)

表 15 2 世代繁殖試験 (ラット) で認められた毒性所見

投与群		親: P、児: F ₁		親: F ₁ 、児: F ₂	
		雄	雌	雄	雌
親動物	1,000 ppm	・腎絶対及び比重量増加	・腎絶対重量増加 ・妊娠期間延長	・肝絶対及び比重量増加	・肝絶対及び比重量増加 ・妊娠期間延長
	120 ppm 以上	120 ppm 以下 毒性所見なし	120 ppm 以下 毒性所見なし	・腎絶対及び比重量増加	・腎絶対及び比重量増加
	15 ppm			毒性所見なし	毒性所見なし
児動物	1,000 ppm	・産児数減少 ・腎比重量増加		・産児数減少	
	120 ppm 以上	120 ppm 以下 毒性所見なし		・腎絶対及び比重量増加	
	15 ppm			毒性所見なし	

(2) 発生毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌 24 匹) の妊娠 6~19 日に強制経口投与 (原体 [酸] : 0、1、10 及び 100 mg/kg 体重/日、溶媒: 脱イオン水) して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、母動物では 10 mg/kg 体重/日以上投与群で体重減少 (100 mg/kg 体重/日投与群: 妊娠 7~8 日) / 体重増加抑制 (10 mg/kg 体重/日投与群: 妊娠 11 日以降、100 mg/kg 体重/日投与群: 妊娠 8 日以降) 及び摂餌量減少 (10 mg/kg 体重/日投与群: 妊娠 6~9 日、100 mg/kg 体重/日投与群: 妊娠 6~9 日及び 9~12 日) が認められ、胎児では 100 mg/kg 体重/日投与群で低体重及び骨化遅延が認められたことから、無毒性量は母動物で 1 mg/kg 体重/日、胎児で 10 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。(参照 2、19)

(3) 発生毒性試験 (ウサギ)

NZW ウサギ (一群雌 22~24 匹) の妊娠 6~27 日に強制経口投与 (原体 [酸] : 0、0.5、1 及び 3 mg/kg 体重/日、溶媒: 脱イオン水) して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、母動物では 3 mg/kg 体重/日投与群で排糞量減少 (妊娠 9 日以降)、体重減少 (妊娠 6~9 日) /增加抑制及び摂餌量減少 (妊娠 9~15 日) が認められたが、胎児ではいずれの投与群においても投与に関連した毒性影響が認められなかったことから、無毒性量は母動物で 1 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 3 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。

(参照 2、19)

1.1. 遺伝毒性試験

グルホシネート P (原体 [酸]) について、細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター肺由来細胞 (CHL) を用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験が実施された。

結果は表 16 に示されているとおり、全て陰性であったことから、グルホシネート P (原体) に遺伝毒性はないものと考えられた。 (参照 2、19)

表 16 遺伝毒性試験結果概要 (原体)

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
in vitro	復帰突然変異試験 <i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株)	2.4~313 µg/プレート(-S9) 9.8~1,250 µg/プレート(+S9)	陰性
	<i>Escherichia coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	0.61~78.1 µg/プレート(-S9) 2.4~313 µg/プレート(+S9)	
染色体異常試験	チャイニーズハムスター肺由来細胞(CHL)	453~1,810 µg/mL(+/-S9)	陰性
in vivo	小核試験 ICR マウス(骨髄細胞) (一群雄 5 匹)	0、62.5、125、250 mg/kg 体重 (単回経口投与、投与 24 時間後に採取) 0、250 mg/kg 体重 (単回経口投与、投与 48 時間後に採取)	陰性

+/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

グルホシネート (R 体) について、細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。結果は表 17 に示されているとおり、いずれも陰性であった。 (参照 2、19、23)

表 17 遺伝毒性試験結果概要 [グルホシネット (R体)] <参考資料⁵>

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> 株)	61.7~5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性

12. 経皮投与、吸入ばく露等試験

(1) 急性毒性試験（経皮投与及び吸入ばく露）

グルホシネット P (原体 [酸]) を用いた急性毒性試験（経皮投与及び吸入ばく露）が実施された。

結果は表 18 に示されている。（参照 2、19）

表 18 急性毒性試験概要（経皮投与及び吸入ばく露、原体）

投与 経路	動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経皮	Wistar ラット 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし
吸入 ^a (全身)	Wistar ラット 雌雄各 5 匹	LC ₅₀ (mg/L)		うずくまり姿勢、鎮静、自発運動低下、呼吸緩徐、挙尾、振戦、痙攣及び触発運動
		1.07	1.58	雌雄 : 0.75 mg/L 以上で死亡例

^a : 4 時間ばく露 (ダスト)

(2) 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、眼に対して軽度の刺激性が認められ、皮膚に対しては刺激性が認められなかった。

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Maximization 法) が実施され、軽度の皮膚感作性が認められた。（参照 2、19）

⁵ グルホシネット (R体) を用いた試験であることから、参考資料とした。

III. 安全性に係る試験の概要（代謝物）

1. 急性毒性試験等

(1) 急性毒性試験（経口投与、代謝物 B、原体混在物 AHI-B 及び AHI-C の混合物並びに原体混在物 AHI-D）

代謝物 B、原体混在物 AHI-B 及び AHI-C の混合物並びに原体混在物 AHI-D の急性毒性試験（経口投与）が実施された。

結果は表 19 に示されている。（参照 2、19）

表 19 急性毒性試験概要（経口投与、代謝物 B、原体混在物 AHI-B 及び AHI-C の混合物並びに原体混在物 AHI-D）

被験物質 ^a	動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
代謝物 B	ICR マウス 雌 3 匹		>2,000	症状及び死亡例なし
AHI-B/AHI-C 混合物	ICR マウス 雌 3 匹		>2,000	症状及び死亡例なし
AHI-D	ICR マウス 雌 3 匹		300～ 2,000	横臥位、攻撃性、自発運動低下又は消失、呼吸緩徐、体温下降、口周囲被毛の汚れ及び流涎 2,000 mg/kg 体重で全例死亡

/ : 該当なし

^a : 毒性等級法により実施された。溶媒として注射用水が用いられた。

2. 遺伝毒性試験（代謝物 B、原体混在物 AHI-B 及び AHI-C の混合物並びに原体混在物 AHI-D）

代謝物 B（動物、植物、土壤及び水中由来）、原体混在物 AHI-B 及び AHI-C の混合物並びに原体混在物 AHI-D について、細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。

結果は表 20 に示されるとおり、いずれも陰性であった。（参照 2、19）

表 20 遺伝毒性試験結果概要 (代謝物 B、原体混在物 AHI-B 及び AHI-C の混合物
並びに原体混在物 AHI-D)

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
代謝物 B	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> /pKM101 株)	156～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
AHI-B/AHI-C 混合物	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株)	39.1～1,250 µg/プレート (-S9) 156～5,000 µg/プレート (+S9)	陰性
		<i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> /pKM101 株)	39.1～1,250 µg/プレート (+/-S9)	陰性
AHI-D	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98 株) <i>S. typhimurium</i> (TA100、TA1535、TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> /pKM101 株)	9.77～313 µg/プレート (+/-S9) 39.1～1,250 µg/プレート (+/-S9)	陰性

+/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

IV. 食品健康影響評価

参考に挙げた資料を用いて農薬「グルホシネート P」の食品健康影響評価を実施した。

¹⁴C で標識したグルホシネート P の水稻、キャベツ及びトマトを用いた植物代謝試験の結果、処理放射能は土壤を介して植物体に吸収され、植物体内成分に取り込まれるもの、未変化のグルホシネート P や一次代謝物の残留性は低いと考えられた。主要代謝物として B が 10%TRR を超えて認められた。

グルホシネート P 及び代謝物 B を分析対象化合物とした各種作物における作物残留試験の結果、グルホシネート P については、登録又は申請された使用方法においてはいずれも定量限界未満であった。代謝物 B の最大残留値は、甘草（ほふく茎）の 0.02 mg/kg であった。

¹⁴C で標識したグルホシネート P のラットを用いた動物体内動態試験の結果、単回経口投与されたグルホシネート P の消化管吸収率は 10.6%～14.2% と低かった。体内に吸収されたグルホシネート P の消失は速やかであり、血漿中放射能は投与 1 ～2 時間後に C_{max} に達し、T_{1/2} は約 4 時間であった。T_{max} 付近では、消化管（内容物を含む。）に 90%TAR 以上が存在し、その他の臓器及び組織では 1%TAR 未満であった。主な臓器及び組織中における放射能濃度は投与 72 時間後までに速やかに減衰する傾向が認められた。投与放射能は主に糞中に排泄され、大部分が未変化のグルホシネート P として排泄された。主要代謝物は糞中では Z、尿中では B であった。

各種毒性試験結果から、グルホシネート P 投与による影響は、主に腎臓（重量増加等）及び中枢神経系（大脳の神経網空胞化等）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

植物代謝試験の結果、10%TRR を超える代謝物として、B が認められた。代謝物 B はラットにおいても認められたが、植物代謝試験及び作物残留試験の結果からグルホシネート P が認められない条件下でも検出されていることから、農産物中のばく露評価対象物質をグルホシネート P 及び代謝物 B と設定した。

評価に用いた各試験における無毒性量等は表 21 に、単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等は表 22 に示されている。

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値はラットを用いた 2 世代繁殖試験の 0.91 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.0091 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、グルホシネート P の単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験の 1 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.01 mg/kg 体重を急性参考用量（ARfD）と設定した。

ADI

0.0091 mg/kg 体重/日

(ADI 設定根拠資料)	繁殖試験
(動物種)	ラット
(期間)	2 世代
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	0.91 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD	0.01 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	発生毒性試験
(動物種)	ウサギ
(期間)	妊娠 6~27 日
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

表 21 各試験における無毒性量の比較

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日) ¹⁾	
			食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
ラット	90日間 亜急性 毒性試験	0、10、30、300、3,000 ppm	雄: 2.0 雌: 22.3	雄: 2.0 雌: 2.2
		雄: 0、0.7、2.0、19.7、199 雌: 0、0.8、2.2、22.3、217	雌雄: 腎絶対及び比重量増加等	雄: 腎絶対及び比重量增加等 雌: ChE 活性增加
		0、15、30、300、3,000 ppm 雄: 0、0.8、1.6、16.0、162 雌: 0、0.9、1.9、18.6、185	雄: 1.6 雌: 1.9	雄: 1.6 雌: 1.9
	1年間 慢性毒性 試験	0、30、300、1,000 ppm 雄: 0、1.4、13.7、45.3 雌: 0、1.6、16.3、54.7	雄: 体重增加抑制及び腎比重量增加 雌: 腎絶対重量增加	雄: 体重增加抑制及び腎比重量增加 雌: 腎絶対重量增加
		0、30、300、1,000 ppm 雄: 0、1.4、13.7、45.3 雌: 0、1.6、16.3、54.7	雄: 1.4 雌: 1.6	雄: 13.7 雌: 16.3
		0、30、300、1,000 ppm 雄: 0、1.74、17.8、174 雌: 0、2.07、20.7、204	雌雄: 腎絶対及び比重量増加 (発がん性は認められない)	雌雄: 体重增加抑制等 (発がん性は認められない)
	90日間 亜急性 神経毒性 試験	0、30、300、3,000 ppm 雄: 0、1.74、17.8、174 雌: 0、2.07、20.7、204	雄: 1.74 雌: 20.7	雄: 1.74 雌: 20.7
		0、30、300、3,000 ppm 雄: 0、1.74、17.8、174 雌: 0、2.07、20.7、204	雄: 自発運動量減少及び体重增加抑制 雌: 瞳孔径縮小、前肢握力低下等	雄: 自発運動量減少及び体重增加抑制 雌: 瞳孔径縮小及び前肢握力低下
		0、15、120、1,000 ppm P 世代 雄: 0、0.81、6.42、54.0 雌: 0、1.31、10.3、81.6 F ₁ 世代 雄: 0、0.91、7.33、60.5 雌: 0、1.36、10.8、84.9	親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 0.91 F ₁ 雌: 1.36 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 産児数減少等	親動物及び児動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 親動物 雌雄: 腎絶対重量增加等 児動物 産児数減少等
	2世代 繁殖試験	0、15、120、1,000 ppm P 世代 雄: 0、0.81、6.42、54.0 雌: 0、1.31、10.3、81.6 F ₁ 世代 雄: 0、0.91、7.33、60.5 雌: 0、1.36、10.8、84.9	親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 0.91 F ₁ 雌: 1.36 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 産児数減少等	親動物及び児動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 親動物 雌雄: 腎絶対重量增加等 児動物 産児数減少等
		0、15、120、1,000 ppm P 世代 雄: 0、0.81、6.42、54.0 雌: 0、1.31、10.3、81.6 F ₁ 世代 雄: 0、0.91、7.33、60.5 雌: 0、1.36、10.8、84.9	親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 0.91 F ₁ 雌: 1.36 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 産児数減少等	親動物及び児動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 親動物 雌雄: 腎絶対重量增加等 児動物 産児数減少等
		0、15、120、1,000 ppm P 世代 雄: 0、0.81、6.42、54.0 雌: 0、1.31、10.3、81.6 F ₁ 世代 雄: 0、0.91、7.33、60.5 雌: 0、1.36、10.8、84.9	親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 0.91 F ₁ 雌: 1.36 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 親動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 児動物 F ₁ 雄: 6.42 F ₁ 雌: 10.3 F ₂ 雄: 0.91 F ₂ 雌: 1.36 産児数減少等	親動物及び児動物 P 雄: 6.42 P 雌: 10.3 F ₁ 雄: 7.33 F ₁ 雌: 10.8 親動物 雌雄: 腎絶対重量增加等 児動物 産児数減少等

			められない)	
	発生毒性試験	0、1、10、100	母動物：1 胎児：10 母動物：体重減少/増加抑制及び摂餌量減少 胎児：低体重及び骨化遅延 (催奇形性は認められない)	母動物：1 胎児：10 母動物：体重增加抑制及び摂餌量減少 胎児：低体重及び骨化遅延 (催奇形性は認められない)
マウス	90日間亜急性毒性試験	0、30、100、300、1,000 ppm 雄：0、3.70、12.5、36.4、121 雌：0、4.36、15.2、44.6、142	雄：36.4 雌：44.6 雄：大脳神経網空胞化 雌：大脳神経網空胞化、摂餌量減少、脳絶対重量減少等	雄：36.4 雌：44.6 雄：大脳神経網空胞化 雌：大脳神経網空胞化、摂餌量減少及び脳絶対重量減少
	18か月間発がん性試験	雄：0、100、300、1,000/600 ppm 雌：0、100、300、1,000/600/450 ppm 雄：0、9.18、28.1、69.5 雌：0、9.06、27.6、66.0	雄：28.1 雌：9.06 雄：大脳の神経網空胞化及び神経細胞壊死 雌：大脳の神経網空胞化 (発がん性は認められない)	雄：28.1 雌：9.06 雄：大脳の神経網空胞化及び神経細胞壊死 雌：大脳の神経網空胞化 (発がん性は認められない)
ウサギ	発生毒性試験	0、0.5、1、3	母動物：1 胎児：3 母動物：排糞量減少、体重增加抑制及び摂餌量減少 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：1 胎児：3 母動物：排糞量減少、体重增加抑制及び摂餌量減少 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
イヌ	90日間亜急性毒性試験	0、0.5、1.5、5	雄：1.5 雌：1.5 雄：跛行、異常歩行及び耳介反射低下 雌：跛行及び異常歩行	雄：1.5 雌：1.5 雌雄：跛行、異常歩行及び耳介反射低下
	1年間慢性毒性試験	0、0.5、1.5、5/3	雄：3 雌：3 雌雄：毒性所見なし	雄：3 雌：3 雌雄：毒性所見なし
	ADI		NOAEL：0.91 SF：100 ADI：0.0091	NOAEL：1 SF：100 ADI：0.01
	ADI設定根拠資料		ラット発生毒性試験 ウサギ発生毒性試験	

ADI：許容一日摂取量 NOAEL：無毒性量 SF：安全係数

¹⁾：無毒性量の欄には最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

表 22 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参考用量設定に 関連するエンドポイント (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日) ¹⁾
ラット	急性毒性試験	雌：300、2,000	雌：300 雌：横臥位、うずくまり姿勢、流涎等
	一般薬理試験 (一般状態観察)	雄：0、60、200、600	雄：200 接触反応亢進、運動失調、流涎等
	一般薬理試験 (自発運動量)	雄：0、60、200、600	雄：60 自発運動量減少
	2 世代繁殖試験	0、15、120、1,000 ppm	P 雌：10.3 F ₁ 雌：10.8
		P 世代 雄：0、0.81、6.42、54.0 雌：0、1.31、10.3、81.6 F ₁ 世代 雄：0、0.91、7.33、60.5 雌：0、1.36、10.8、84.9	F ₁ 及び F ₂ 児動物：産児数減少
	発生毒性試験	雌：0、1、10、100	母動物：10 ^a 母動物：体重減少及び摂餌量減少
マウス	一般薬理試験 (一般状態観察)	雌雄：0、50、100、200、400	雄：100 雌：50 雄：振戦、姿勢異常、歩行失調又は不能等 雌：死亡
ウサギ	発生毒性試験	雌：0、0.5、1、3	母動物：1 母動物：体重減少及び摂餌量減少
ARfD			NOAEL：1 SF：100 ARfD：0.01
ARfD 設定根拠資料			ウサギ発生毒性試験

ARfD：急性参考用量、NOAEL：無毒性量、SF：安全係数

¹⁾：最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。^a：100 mg/kg 体重/日投与群の母動物において、投与初期から認められた体重減少及び摂餌量減少を ARfD のエンドポイントと判断した。

<別紙1：代謝物/分解物/原体混在物略称>

記号	化学名
B	3-[hydroxyl(methyl)phosphinoyl]propionic acid
D	2-hydroxy-4-[hydroxyl(methyl)phosphinoyl]butanoic acid
F	2-[hydroxyl(methyl)phosphinoyl]acetic acid
G	4-[hydroxyl(methyl)phosphinoyl]butanoic acid
H	4-[hydroxyl(methyl)phosphinoyl]-2-oxobutanoic acid
Z	2-acetamido-4-[hydroxyl(methyl)phosphinoyl]butanoic acid
Fr.3	未同定代謝物
AHI-B	原体混在物
AHI-C	原体混在物
AHI-D	原体混在物

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
ai	有効成分量 (active ingredient)
AUC	薬物濃度曲線下面積
C _{max}	最高濃度
FOB	機能観察総合検査
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
Lym	リンパ球数
MCH	平均赤血球血色素量
PHI	最終使用から収穫までの日数
RBC	赤血球数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与 (処理) 放射能
T _{max}	最高濃度到達時間
TRR	総残留放射能
WBC	白血球数

＜別紙3：作物残留試験＞

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関				合計	
					グルホシ ネートP		代謝物B		合計	グルホシ ネートP		代謝物B		
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
水稻 (玄米) 2004年度	2	1,150	4 ^a	1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
水稻 (稻わら) 2004年度	2	1,150	4 ^a	1 ^a	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
				7	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
				1 ^a	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
そば (脱穀した種子) 2008年度	2	575	4 ^a	7	/					<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.02
だいす (乾燥子実) 2006年度	2	575	4 ^a	5 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				11 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				14 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
いんげんまめ (乾燥子実) 2007年度	2	575	4 ^a	4 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				10 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				14 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
ばれいしょ (塊茎) 2009年度	2	230 575	5 ^a	3 ^a	0.008	0.008	<0.006	<0.006	0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				6 ^a	0.005	0.005	<0.006	<0.006	0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				14 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
さといも (塊根) 2005、2006年度	2	575	3 ~ 4 ^a	1 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
さといも (葉柄) 2011年度	2	575	3	7	/					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02
				14	/					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02
				7	/					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02
				14	/					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02
かんしょ (塊根) 2005、2007年度	2	575	4 ^a	30	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				45	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
やまのいも (塊根) 2007、2008年度	2	575	4 ^a	30	0.006	0.006	<0.006	<0.006	0.02	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.02
				44	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				45	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
さとうきび (茎) 2017、2018年度	3	1,150	4	14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				20	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				
				28	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03	/				

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)								
					公的分析機関				社内分析機関				
					グルホシ ネート P		代謝物 B		合計	グルホシ ネート P		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値
キャベツ (葉球) 2003 年度	2	860 ^a	3 ^a	1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
				1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ブロッコリー (花蕾) 2011 年度	2	575	3 ^a	1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
				7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
				14	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
ごぼう (根部) 2011 年度	2	575	3 ^a	7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
				13	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
				14	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02				
レタス (茎葉) 2007 年度	2	575	4 ^a	3 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				14 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
たまねぎ (鱗茎) 2006 年度	2	575	3 ^a	1 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				4 ^a	-	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006
ねぎ (茎葉) 2009 年度	2	575	3 ^a	1	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				14	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
にら (茎葉) 2012 年度	1	575	3	1					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
				7					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
				14					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
にら (茎葉) 2020 年度	2	575	3	1					0.008	0.007	<0.006	<0.006	0.013
				7					0.005	0.005	<0.006	<0.006	0.011
				14					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
			3	1					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012	<0.021
にんにく (鱗茎) 2020 年度	2	575	3	7					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012	<0.021
				14					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012	<0.021
				1					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012	<0.021
				7					<0.009	<0.009	<0.012	<0.012	<0.021
アスパラガス (若茎) 2009 年度	2	575	3 ^a	1					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				7					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				14					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
				1					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02
にんじん (根部) 2008 年度	2	575	4 ^a	7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
				14	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)										
					公的分析機関				社内分析機関						
					グルホシ ネート P		代謝物 B		合計	グルホシ ネート P		代謝物 B		合計	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値		
トマト (果実) 2003 年度	2	860 ^a	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
ミニトマト (果実) 2003 年度	2	860 ^a	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
ピーマン (果実) 2008 年度	2	575	4 ^a	1	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	
				7-8	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
なす (果実) 2003 年度	2	860 ^a	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				8	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
きゅうり (果実) 2010 年度	2	575	4 ^a	1	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	
				14	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	
				4 ^a	1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02					
すいか (果実) 2011 年度	2	575	3 ^a	3 ^a	7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02					
				3 ^a	14	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02					
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				3 ^a	7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02					
メロン (果実) 2005 年度	2	580	3 ^a	1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
とうがん (果実) 1993 年度	2	575	3	1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				1	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
				7	<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02						
ほうれんそう (茎葉) 2005 年度	2	580	4 ^a	1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
				6 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	
未成熟えんどう (さや) 2008、2009 年度	2	575	4 ^a	1 7						<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.006 <0.006	<0.006 <0.006	<0.02 <0.02	
未成熟いんげん (さや) 2004、2005 年度	2	575	4 ^a	1 7	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	
えだまめ (さや) 2006、2008 年度	2	575	4 ^a	1 ^a 7 ^a	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.006 <0.006	<0.006 <0.006	<0.02	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.006 <0.006	<0.006 <0.006	<0.02 <0.02	

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)								
					公的分析機関				社内分析機関				
					グルホシ ネート P		代謝物 B		合計	グルホシ ネート P		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値
かのこそう (根部) 2017 年度	3	575	4 ^a	14 28 42	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
					<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
					0.04	0.04	<0.02	<0.02	0.06				
				14 28 42	0.04	0.04	<0.02	<0.02	0.06				
					<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
					<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
				14 28 42	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
					<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
					<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.03				
温州みかん (果肉) 2003 年度	2	2,300 ^a	3	1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
温州みかん (外果皮) 2003 年度	2	2,300 ^a	3	1 ^a 7 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
				1 ^a 7 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
大粒かんきつ (果肉) 2003 年度	2	2,300 ^a	3	1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
大粒かんきつ (外果皮) 2003 年度	2	2,300 ^a	3	1 ^a 7 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
				1 ^a 7 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03
小粒かんきつ (果実全体) 2003 年度	2	2,300 ^a	3	1 ^a 7 ^a					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
									<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				1 ^a 7 ^a					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
									<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
りんご (果実) 2003 年度	2	1,150	3	1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
日本なし (果実) 2003 年度	2	1,150	3	1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
西洋なし (果実) 2004 年度	2	1,150	3	1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
				1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
びわ (果実) 2004 年度	2	1,150	3	1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02				
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02				
				1 ^a 7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02				
					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02				

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)									
					公的分析機関				社内分析機関					
					グルホシ ネート P		代謝物 B		合計	グルホシ ネート P		代謝物 B		
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	
うめ (果実) 2004 年度	2	1,150	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				5	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
おうとう (果実) 2004 年度	2	1,150	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
いちご (果実) 2011 年度	4	575	3	4	1	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005				<0.005	<0.005	0.026	0.026	0.031
				7	1					<0.005	<0.005	0.021	0.021	0.026
				4	1					<0.005	<0.005	0.026	0.026	0.031
				7	1					<0.005	<0.005	0.023	0.021	0.026
いちご (果実) 2020 年度	1	575	3	4	1	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005				<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
				7	1					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
				14	7					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
				14	7					<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.011
ぶどう (果実) 2003 年度	2	1,150	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
キウイフルーツ (果実) 2004 年度	2	1,150	3	1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				1 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				7 ^a	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
いちじく (果実) 2004 年度	2	1,150	3	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005				
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02					
				1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02					
しそ (可食部) 2009 年度	2	575	2	14	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005				<0.005 <0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	
				28										
				28										
ごま (子実) 2021 年度	2	575	3	23	<0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009				<0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009	<0.012	<0.012	<0.021		
				30										
				37										
				22										
				29										
ぎぼうし (可食部) 2010、2011 年度	2	575	3	35	<0.009 <0.009 <0.009 <0.009				<0.012 <0.012 <0.012 <0.012	<0.012	<0.012	<0.021		
				90										

作物名 (分析部位) 実施年度	試験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)								
					公的分析機関				社内分析機関				
					グルホシ ネート P		代謝物 B		合計	グルホシ ネート P		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値
ホップ (乾花) 2006 年度	2	580	3	2 ^a					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
				8					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
				1 ^a					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
				7					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
茶 (荒茶) 2009 年	2	575	2	7	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006
甘草 (根) 作期 2 年目 2019 年度	3	575	3	14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
甘草 (ほふく茎) 作期 2 年目 2019 年度	3	575	3	14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
甘草 (根) 作期 3 年目 2019 年度	3	575	3	14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
甘草 (ほふく茎) 作期 3 年目 2019 年度	3	575	3	14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.04
				42					<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.04
				14					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				28					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				42					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
				14					0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04
				28					0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04
				42					0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04

作物名 (分析部位) 実施年度	試 験 ほ 場 数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値 (mg/kg)								
					公的分析機関				社内分析機関				
					グルホシ ネート P		代謝物 B		合計	グルホシ ネート P		代謝物 B	
					最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値
みょうが (花穂) 2010、2011 年度	1	575	2	14					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02
				26						<0.005	<0.005	<0.007	<0.007
	1			14					<0.005	<0.005	<0.007	<0.007	<0.02
				28						<0.005	<0.005	<0.007	<0.007

注) /: 該当なし

- ・試験には液剤が使用された。
- ・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。
- ・農薬の使用量、使用回数又は使用時期 (PHI) が、登録された使用方法から逸脱している場合は、使用量、回数又は PHI に^aを付した。

<参考>

- 1 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付、厚生労働省告示第 499 号）
- 2 農薬抄録 グルホシネート P (除草剤) （平成 18 年 10 月 31 日改訂）：明治製菓株式会社、一部公表
- 3 食品健康影響評価について（平成 19 年 7 月 13 日付け厚生労働省発食安第 0713006 号）
- 4 グルホシネート P の追加資料要求事項に対する回答書：明治製菓株式会社、2008 年、未公表
- 5 食品健康影響評価の通知について（平成 22 年 2 月 25 日付け府食第 139 号）
- 6 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示 370 号）の一部を改正する件（平成 23 年厚生労働省告示第 52 号）について
- 7 グルホシネート P 作物残留試験成績（平成 19 年）：Meiji Seika ファルマ株式会社、未公表
- 8 農薬抄録 グルホシネート P (除草剤) （平成 23 年 8 月 31 日改訂）：Meiji Seika ファルマ株式会社、一部公表
- 9 食品健康影響評価について（平成 23 年 11 月 15 日付け厚生労働省発食安 1115 第 2 号）
- 10 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 24 年 3 月 8 日付け府食第 254 号）
- 11 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 24 年 3 月 8 日付け府食第 255 号）
- 12 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示 370 号）の一部を改正する件（平成 24 年 6 月 7 日付け厚生労働省告示第 382 号）について
- 13 食品健康影響評価について（平成 25 年 6 月 11 日付け厚生労働省発食安 0611 第 3 号）
- 14 農薬抄録 グルホシネート P (除草剤) （平成 25 年 1 月 22 日改訂）：Meiji Seika ファルマ株式会社、一部公表
- 15 グルホシネート P 作物残留性試験成績（平成 22、23 年度）：Meiji Seika ファルマ株式会社、未公表
- 16 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 25 年 7 月 29 日付け府食第 615 号）
- 17 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示 370 号）の一部を改正する件（平成 26 年厚生労働省告示第 390 号）について
- 18 食品健康影響評価について（令和 3 年 8 月 25 日付け厚生労働省発生食 0825 第 3 号）
- 19 農薬抄録 グルホシネート P (除草剤) （令和 2 年 10 月 1 日改訂）：Meiji Seika ファルマ株式会社、一部公表
- 20 グルホシネート P ナトリウム塩のさとうきびへの作物残留試験最終報告書：公益財団法人日本植物調節剤研究協会、2018 年、未公表
- 21 グルホシネート P ナトリウム塩のさとうきびへの作物残留試験最終報告書：公益財団法人日本植物調節剤研究協会、2019 年、未公表

- 22 D-glufosinate のラットにおける急性経口毒性試験 (GLP 対応) 、一般財団法人残留農薬研究所、2012 年、未公表
- 23 D-glufosinate の細菌を用いる復帰突然変異試験 (GLP 対応) 、一般財団法人残留農薬研究所、2012 年、未公表
- 24 食品健康影響評価の結果の通知について (令和 4 年 3 月 9 日付け府食第 108 号)
- 25 食品健康影響評価について (令和 4 年 11 月 24 日付け厚生労働省発生食 1124 第 1 号)
- 26 農薬抄録 グルホシネート P (除草剤) (令和 4 年 8 月 22 日改訂) : 株式会社 MMAG、一部公表
- 27 グルホシネート P ナトリウム塩のごま子実への作物残留試験最終報告書: 日本エコテック株式会社、2021 年、未公表
- 28 食品、添加物等の規格基準 (昭和 34 年厚生省告示 370 号) の一部を改正する件 (令和 5 年厚生労働省告示第 370 号) について
- 29 食品健康影響評価について (令和 6 年 6 月 12 日付け消費者庁発消食基第 71 号)