

農薬・動物用医薬品評価書

フェニトロチオン (第3版)

令和5年（2023年）11月

食品安全委員会

目次

	頁
○ 審議の経緯	4
○ 食品安全委員会委員名簿	6
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿	7
○ 食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿	11
○ 食品安全委員会動物用医薬品専門調査会専門委員名簿	12
○ 要約	13
I. 評価対象農薬・動物用医薬品の概要	14
1. 用途	14
2. 有効成分の一般名	14
3. 化学名	14
4. 分子式	14
5. 分子量	14
6. 構造式	14
7. 物理的・化学的性状	14
8. 開発の経緯	15
II. 安全性に係る試験の概要	16
1. 土壌中動態試験	16
(1) 好氣的湛水土壌中動態試験	16
(2) 好氣的土壌中動態試験	16
(3) 土壌表面光分解試験	16
(4) 土壌吸脱着試験	17
2. 水中動態試験	17
(1) 加水分解試験①	17
(2) 加水分解試験②	17
(3) 水中光分解試験①	18
(4) 水中光分解試験②	18
3. 土壌残留試験	19
4. 植物、家畜等における代謝及び残留試験	20
(1) 植物代謝試験	20
(2) 作物残留試験	23
(3) 家畜代謝試験	23
(4) 畜産物等残留試験	25
(5) 魚介類における最大推定残留値	30
(6) 推定摂取量	30

5. 動物体内動態試験	30
(1) ラット	30
(2) マウス、ウサギ、イヌ及びモルモット	35
6. 急性毒性試験等	37
(1) 急性毒性試験（経口投与）	37
(2) 一般薬理試験	39
7. 亜急性毒性試験	41
(1) 6か月間亜急性毒性試験（ラット）	41
(2) 30日間亜急性毒性試験（ラット）＜参考資料＞	42
(3) 90日間亜急性毒性試験（ラット）＜参考資料＞	42
(4) 6か月間亜急性毒性試験（ウサギ）	43
8. 慢性毒性試験及び発がん性試験	43
(1) 92週間慢性毒性試験（ラット）＜参考資料＞	43
(2) 1年間慢性毒性試験（イヌ）①	43
(3) 1年間慢性毒性試験（イヌ）②＜参考資料＞	44
(4) 2年間慢性毒性試験（イヌ）	44
(5) 2年間慢性毒性試験（サル）	45
(6) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	45
(7) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）	46
(8) 18か月間発がん性試験（マウス）	48
9. 神経毒性試験	48
(1) 急性神経毒性試験（ラット）	48
(2) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）①	49
(3) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）②	49
(4) 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）	50
(5) 28日間亜急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）	50
10. 生殖発生毒性試験	51
(1) 2世代繁殖試験（ラット）	51
(2) 1世代繁殖試験（ラット）	52
(3) 3世代繁殖試験（ラット）＜参考資料＞	53
(4) 発生毒性試験（ラット）①	54
(5) 発生毒性試験（ラット）②＜参考資料＞	54
(6) 発生毒性試験（マウス）＜参考資料＞	55
(7) 発生毒性試験（ウサギ）①	55
(8) 発生毒性試験（ウサギ）②＜参考資料＞	55
11. 遺伝毒性試験	55
12. 経皮投与、吸入ばく露等試験	58
(1) 急性毒性試験（経皮投与、腹腔内投与、皮下投与及び吸入ばく露）	58

(2) 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚・吸入に対する感作性試験.....	59
(3) 22又は23日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）.....	60
(4) 28日間亜急性吸入毒性試験（ラット）.....	60
(5) 28日間亜急性吸入毒性試験（マウス）.....	61
13. その他の試験.....	61
(1) 急性眼毒性試験（ラット）.....	61
(2) 90日間亜急性眼毒性試験（ラット）.....	62
(3) 急性投与試験（ヒト）.....	63
(4) 4日間投与試験（ヒト）.....	63
(5) 酵素に対する影響.....	64
(6) 生化学的パラメータに対する影響.....	64
III. 安全性に係る試験の概要（代謝物）.....	65
1. 急性毒性試験等.....	65
(1) 急性毒性試験（経口投与、代謝物B及びG）.....	65
(2) 一般薬理試験（代謝物）.....	65
2. 亜急性毒性試験（代謝物B及びG）.....	67
(1) 6か月間亜急性毒性試験（代謝物B、ラット）.....	67
(2) 6か月間亜急性毒性試験（代謝物G、ラット）.....	67
3. 遺伝毒性試験（代謝物B及びG）.....	68
4. 経皮投与、吸入ばく露等試験.....	68
(1) 急性毒性試験（静脈内投与及び腹腔内投与、代謝物B及びG）.....	68
IV. 食品健康影響評価.....	70
・別紙1：代謝物/分解物略称.....	82
・別紙2：検査値等略称.....	85
・別紙3：作物残留試験成績.....	86
・別紙4：推定摂取量.....	111
・参照.....	114

＜審議の経緯＞

－第1版関係－

－清涼飲料水関連－

- 1961年 12月 26日 初回農薬登録
- 2003年 7月 1日 厚生労働大臣から清涼飲料水の規格基準改正に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0701015号）
- 2003年 7月 3日 関係書類の接受（参照1）
- 2003年 7月 18日 第3回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2003年 10月 8日 追加資料受理（参照2）
（フェニトロチオンを含む要請対象93農薬を特定）
- 2003年 10月 27日 第1回農薬専門調査会
- 2004年 1月 28日 第6回農薬専門調査会
- 2005年 1月 12日 第22回農薬専門調査会
- 2013年 4月 9日 厚生労働大臣から清涼飲料水の規格基準改正に係る食品健康影響評価について取り下げ（厚生労働省発食安0409第1号）、関係書類の接受（参照83）
- 2013年 4月 15日 第471回食品安全委員会（取り下げについて説明）

－魚介類及び飼料中の残留基準設定及びポジティブリスト制度関連－

- 2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照3）
- 2009年 10月 2日 農林水産省から厚生労働省へ基準値設定依頼（魚介類）
- 2009年 10月 16日 関係書類の接受（参照4）
- 2010年 9月 24日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安0924第5号）
- 2010年 9月 27日 関係書類の接受（参照5～74）
- 2010年 9月 30日 第349回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2011年 11月 4日 第12回農薬専門調査会評価第四部会
- 2012年 2月 22日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安0222第1号）
- 2012年 2月 24日 関係書類の接受（参照75～78、86～89）
- 2012年 3月 1日 第421回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2012年 3月 22日 農林水産大臣から飼料中の残留基準値設定に係る食品健康影響評価について要請（23消安第6357号）
- 2012年 3月 26日 関係書類の接受（参照79～82）
- 2012年 3月 29日 第425回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2013年 5月 15日 追加資料受理（参照84、85）
- 2013年 6月 13日 第27回農薬専門調査会評価第四部会
- 2013年 7月 25日 第95回農薬専門調査会幹事会

- 2013年 9月 4日 第156回動物用医薬品専門調査会
- 2013年 10月 21日 第491回食品安全委員会（報告）
- 2013年 10月 22日 から11月20日まで 国民からの意見・情報の募集
- 2014年 4月 23日 第104回農薬専門調査会幹事会
- 2014年 5月 16日 第164回動物用医薬品専門調査会
- 2014年 5月 28日 農薬専門調査会座長及び動物用医薬品専門調査会座長から
食品安全委員会委員長へ報告
- 2014年 6月 3日 第516回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣及び農林水産大臣へ通知）
（参照 94、95）

－第2版関係－

- 2016年 10月 21日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び
基準値設定依頼（適用拡大：ねぎ、トマト等）
- 2017年 1月 24日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に
ついて要請（厚生労働省発生食0124第25号）
- 2017年 1月 25日 関係書類の接受（参照 96～99）
- 2017年 1月 31日 第636回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2017年 3月 24日 第63回農薬専門調査会評価第三部会
- 2017年 4月 21日 第147回農薬専門調査会幹事会
- 2017年 5月 16日 第649回食品安全委員会（報告）
- 2017年 5月 17日 から6月15日まで 国民からの意見・情報の募集
- 2017年 8月 2日 第151回農薬専門調査会幹事会
- 2017年 8月 9日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2017年 8月 22日 第662回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 100）
- 2019年 6月 27日 残留農薬基準告示（参照 101）

－第3版関係－

- 2022年 8月 1日 農林水産大臣から厚生労働大臣へ農薬登録申請に係る連絡
及び基準値設定依頼（適用拡大：てんさい及びにら）
- 2023年 5月 24日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に
ついて要請（厚生労働省発生食0524第6号）、関係書類の
接受（参照 102～110）
- 2023年 5月 30日 第900回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2023年 6月 28日 第25回農薬第二専門調査会
- 2023年 8月 9日 追加資料受理（参照 113）
- 2023年 9月 14日 第27回農薬第二専門調査会
- 2023年 11月 6日 農薬第二専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告

2023年 11月 14日 第920回食品安全委員会（報告）
（11月16日付け厚生労働大臣へ通知）

＜食品安全委員会委員名簿＞

(2006年6月30日まで)	(2006年12月20日まで)	(2009年6月30日まで)
寺田雅昭（委員長）	寺田雅昭（委員長）	見上 彪（委員長）
寺尾允男（委員長代理）	見上 彪（委員長代理）	小泉直子（委員長代理*）
小泉直子	小泉直子	長尾 拓
坂本元子	長尾 拓	野村一正
中村靖彦	野村一正	畑江敬子
本間清一	畑江敬子	廣瀬雅雄**
見上 彪	本間清一	本間清一

*：2007年2月1日から

**：2007年4月1日から

(2011年1月6日まで)	(2012年6月30日まで)	(2015年6月30日まで)
小泉直子（委員長）	小泉直子（委員長）	熊谷 進（委員長）
見上 彪（委員長代理*）	熊谷 進（委員長代理*）	佐藤 洋（委員長代理）
長尾 拓	長尾 拓	山添 康（委員長代理）
野村一正	野村一正	三森国敏（委員長代理）
畑江敬子	畑江敬子	石井克枝
廣瀬雅雄	廣瀬雅雄	上安平冽子
村田容常	村田容常	村田容常

*：2009年7月9日から

*：2011年1月13日から

(2017年1月6日まで)	(2018年6月30日まで)
佐藤 洋（委員長）	佐藤 洋（委員長）
山添 康（委員長代理）	山添 康（委員長代理）
熊谷 進	吉田 緑
吉田 緑	山本茂貴
石井克枝	石井克枝
堀口逸子	堀口逸子
村田容常	村田容常

(2021年7月1日から)

山本茂貴（委員長）
浅野 哲（委員長代理 第一順位）
川西 徹（委員長代理 第二順位）

脇 昌子 (委員長代理 第三順位)
香西みどり
松永和紀
吉田 充

<食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2006年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	小澤正吾	出川雅邦
廣瀬雅雄 (座長代理)	高木篤也	長尾哲二
石井康雄	武田明治	林 真
江馬 眞	津田修治*	平塚 明
太田敏博	津田洋幸	吉田 緑

* : 2005年10月1日から

(2007年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	三枝順三	根岸友恵
廣瀬雅雄 (座長代理)	佐々木有	林 真
赤池昭紀	高木篤也	平塚 明
石井康雄	玉井郁巳	藤本成明
泉 啓介	田村廣人	細川正清
上路雅子	津田修治	松本清司
臼井健二	津田洋幸	柳井徳磨
江馬 眞	出川雅邦	山崎浩史
大澤貫寿	長尾哲二	山手丈至
太田敏博	中澤憲一	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	吉田 緑
小澤省吾	成瀬一郎	若栗 忍
小林裕子	布柴達男	

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	三枝順三	西川秋佳**
林 眞 (座長代理*)	佐々木有	布柴達男
赤池昭紀	代田眞理子****	根岸友恵
石井康雄	高木篤也	平塚 明
泉 慶介	玉井郁巳	藤本成明
上路雅子	田村廣人	細川正清
臼井健二	津田修治	松本清司

江馬 眞
大澤貫寿
太田敏博
大谷 浩
小澤正吾
小林裕子

津田洋幸
出川雅邦
長尾哲二
中澤憲一
納屋聖人
成瀬一郎****

柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
吉田 緑
若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)
林 眞 (座長代理)
相磯成敏
赤池昭紀
石井康雄
泉 啓介
今井田克己
上路雅子
臼井健二
太田敏博
大谷 浩
小澤正吾
川合是彰
小林裕子
三枝順三****

佐々木有
代田眞理子
高木篤也
玉井郁巳
田村廣人
津田修治
津田洋幸
長尾哲二
中澤憲一*
永田 清
納屋聖人
西川秋佳
布柴達男
根岸友恵
根本信雄

平塚 明
藤本成明
細川正清
堀本政夫
松本清司
本間正充
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦**
吉田 緑
若栗 忍

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

(2012年3月31日まで)

納屋聖人 (座長)
林 眞 (座長代理)
相磯成敏
赤池昭紀
浅野 哲**

佐々木有
代田眞理子
高木篤也
玉井郁巳
田村廣人

平塚 明
福井義浩
藤本成明
細川正清
堀本政夫

石井康雄
泉 啓介
上路雅子
臼井健二
太田敏博
小澤正吾
川合是彰
川口博明
栗形麻樹子***
小林裕子
三枝順三

津田修治
津田洋幸
長尾哲二
永田 清
長野嘉介*
西川秋佳
布柴達男
根岸友恵
根本信雄
八田稔久

本間正充
増村健一**
松本清司
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦
吉田 緑
若栗 忍

* : 2011年3月1日まで

** : 2011年3月1日から

*** : 2011年6月23日から

(2014年3月31日まで)

・幹事会

納屋聖人 (座長)
西川秋佳* (座長代理)
三枝順三 (座長代理**)
赤池昭紀

上路雅子
永田 清
長野嘉介
本間正充

松本清司
山手丈至**
吉田 緑

・評価第一部会

上路雅子 (座長)
赤池昭紀 (座長代理)
相磯成敏

津田修治
福井義浩
堀本政夫

山崎浩史
義澤克彦
若栗 忍

・評価第二部会

吉田 緑 (座長)
松本清司 (座長代理)
泉 啓介

栗形麻樹子
腰岡政二
根岸友恵

藤本成明
細川正清
本間正充

・評価第三部会

三枝順三 (座長)
納屋聖人 (座長代理)
浅野 哲

小野 敦
佐々木有
田村廣人

永田 清
八田稔久
増村健一

・評価第四部会

西川秋佳* (座長)
長野嘉介 (座長代理*;
座長**)
山手丈至 (座長代理**)

川口博明
代田眞理子
玉井郁巳

根本信雄
森田 健
與語靖洋

井上 薫**

* : 2013年9月30日まで

** : 2013年10月1日から

(2016年3月31日まで)

・幹事会

西川秋佳 (座長)	小澤正吾	林 真
納屋聖人 (座長代理)	三枝順三	本間正充
赤池昭紀	代田眞理子	松本清司
浅野 哲	永田 清	與語靖洋
上路雅子	長野嘉介	吉田 緑*

・評価第一部会

上路雅子 (座長)	清家伸康	藤本成明
赤池昭紀 (座長代理)	林 真	堀本政夫
相磯成敏	平塚 明	山崎浩史
浅野 哲	福井義浩	若栗 忍
篠原厚子		

・評価第二部会

吉田 緑 (座長) *	腰岡政二	細川正清
松本清司 (座長代理)	佐藤 洋	本間正充
小澤正吾	杉原数美	山本雅子
川口博明	根岸友恵	吉田 充
栗形麻樹子		

・評価第三部会

三枝順三 (座長)	高木篤也	中山真義
納屋聖人 (座長代理)	田村廣人	八田稔久
太田敏博	中島美紀	増村健一
小野 敦	永田 清	義澤克彦

・評価第四部会

西川秋佳 (座長)	佐々木有	本多一郎
長野嘉介 (座長代理)	代田眞理子	山手丈至
井上 薫**	玉井郁巳	森田 健
加藤美紀	中塚敏夫	與語靖洋

* : 2015年6月30日まで

** : 2015年9月30日まで

(2016年4月1日から)

・幹事会

西川秋佳 (座長)	三枝順三	長野嘉介
納屋聖人 (座長代理)	代田眞理子	林 真
浅野 哲	清家伸康	本間正充
小野 敦	中島美紀	與語靖洋
・評価第一部会		
浅野 哲 (座長)	栞形麻樹子	平林容子
平塚 明 (座長代理)	佐藤 洋	本多一郎
堀本政夫 (座長代理)	清家伸康	森田 健
相磯成敏	豊田武士	山本雅子
小澤正吾	林 真	若栗 忍
・評価第二部会		
三枝順三 (座長)	高木篤也	八田稔久
小野 敦 (座長代理)	中島美紀	福井義浩
納屋聖人 (座長代理)	中島裕司	本間正充
腰岡政二	中山真義	美谷島克宏
杉原数美	根岸友恵	義澤克彦
・評価第三部会		
西川秋佳 (座長)	加藤美紀	高橋祐次
長野嘉介 (座長代理)	川口博明	塚原伸治
與語靖洋 (座長代理)	久野壽也	中塚敏夫
石井雄二	篠原厚子	増村健一
太田敏博	代田眞理子	吉田 充

<食品安全委員会農薬第二専門調査会専門委員名簿>

(2022年4月1日から)

堀本政夫 (座長)	清家伸康
平塚 明 (座長代理 第一順位)	田中徹也
豊田武士 (座長代理 第二順位)	中塚敏夫
稲見圭子	野村崇人
佐藤順子	藤本成明
篠原厚子	森田 健

<第27回農薬専門調査会評価第四部会専門参考人名簿>

中塚敏夫

<第95回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

小澤正吾 林 真

<第 63 回農薬専門調査会評価第三部会専門参考人名簿>

玉井郁巳 山手丈至

<第 147 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

赤池昭紀 永田 清 松本清司
上路雅子

<第 151 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

赤池昭紀 永田 清 松本清司
上路雅子

<第 25 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

赤池昭紀（和歌山県立医科大学薬学部教授 兼 京都大学名誉教授）

<第 27 回農薬第二専門調査会専門参考人名簿>

赤池昭紀（和歌山県立医科大学薬学部教授 兼 京都大学名誉教授）

<食品安全委員会動物用医薬品専門調査会専門委員名簿>

（2013 年 9 月 30 日まで）

山手丈至（座長*）	天間恭介	松尾三郎
小川久美子（座長代理*）	頭金正博	山口成夫
石川さと子	能美健彦	山崎浩史
石川 整	福所秋雄	吉田敏則**
寺本昭二	舞田正志	渡邊敏明

*: 2012 年 8 月 22 日から

** : 2012 年 10 月 1 日から

（2013 年 10 月 1 日から）

山手丈至（座長*）	川治聡子	松尾三郎
小川久美子（座長代理*）	須永藤子	宮田昌明
青木博史	辻 尚利	山崎浩史
青山博昭	寺岡宏樹	吉田和生
石川さと子	能美健彦	吉田敏則
石川 整	舞田正志	渡邊敏明

*: 2013 年 10 月 22 日から

要 約

有機リン系殺虫剤である「フェニトロチオン」(CAS No. 122-14-5)について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。第3版の改訂に当たっては、厚生労働省から、作物残留試験(てんさい及びにら)、家畜代謝試験(ヤギ、ニワトリ及びうずら)、畜産物残留試験(ウシ及びニワトリ)の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、植物代謝(水稻、ぶどう等)、作物残留、家畜代謝(ヤギ、ニワトリ及びうずら)、畜産物残留、動物体内動態(ラット、マウス、ウサギ等)、亜急性毒性(ラット及びウサギ)、慢性毒性(イヌ及びサル)、慢性毒性/発がん性併合(ラット及びマウス)、発がん性(マウス)、亜急性神経毒性(ラット及びニワトリ)、繁殖(ラット)、発生毒性(ラット及びウサギ)、遺伝毒性等である。

各種毒性試験結果から、フェニトロチオン投与による影響として、主にChE活性阻害が認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遅発性神経毒性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物、畜産物及び魚介類中のばく露評価対象物質をフェニトロチオン(親化合物のみ)と設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の0.49 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.0049 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量(ADI)と設定した。

また、フェニトロチオンの単回経口投与により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ヒトにおける急性投与試験の0.33 mg/kg 体重であったが、4日間投与試験において無毒性量0.36 mg/kg 体重/日が得られており、ヒトにおける無毒性量は0.36 mg/kg 体重/日であると考えられた。したがって、ヒトにおける無毒性量0.36 mg/kg 体重/日を根拠として、安全係数10(種差:1、個体差:10)で除した0.036 mg/kg 体重を急性参照用量(ARfD)と設定した。

I. 評価対象農薬・動物用医薬品の概要

1. 用途

殺虫剤

2. 有効成分の一般名

和名：フェニトロチオン

英名：fenitrothion (ISO 名)

3. 化学名

IUPAC

和名：O,O-ジメチル O-4-ニトロ-*m*-トルイル ホスホロチオエート

英名：O,O-dimethyl O-4-nitro-*m*-tolyl phosphorothioate

CAS (No. 122-14-5)

和名：O,O-ジメチル O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)ホスホロチオエート

英名：O,O-dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl)phosphorothioate


4. 分子式

C₉H₁₂NO₅PS

5. 分子量

277.24

6. 構造式



7. 物理的・化学的性状

融点	: 常温で液体
沸点	: 約 210°C 付近から分解(窒素雰囲気下)
密度	: 1.33 g/cm ³ (25°C)
蒸気圧	: 1.57 × 10 ⁻³ Pa(25°C)
外観(色調及び形状)、臭気	: 淡黄色澄明の液体、僅かに特異なにおい
水溶解度	: 19.0 mg/L(20°C)
オクタノール/水分配係数	: log P _{ow} = 3.43(20°C)
解離定数	: 測定不能

8. 開発の経緯

フェニトロチオンは、住友化学工業株式会社によって開発された有機リン系化合物に属する殺虫剤である。作用機構は昆虫体内に入った後、酵素の働きでオクソン体となり、コリンエステラーゼと結合することで酵素活性を低下させ、正常な神経伝達機能を阻害することにより殺虫効果を示すものと考えられている。

国内では 1961 年に初回農薬登録されている。また、動物用医薬品としては、国内で牛等の外部寄生虫の駆除を目的とした噴霧投与剤が承認されている。（参照 90）

第 3 版では、農薬取締法に基づく農薬登録申請（適用拡大：てんさい及びにら）がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種動態及び代謝試験 [II. 1、2、4 及び 5] は、フェニトロチオンのリン原子を ^{32}P で標識したもの（以下「[mep- ^{32}P]フェニトロチオン」という。）、フェニトロチオンのメチル基の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[met- ^{14}C]フェニトロチオン」という。）及びフェニトロチオンのフェニル基の炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「[phe- ^{14}C]フェニトロチオン」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からフェニトロチオンの濃度 (mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$) に換算した値として示した。

代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 土壌中動態試験

(1) 好氣的湛水土壌中動態試験

[phe- ^{14}C]フェニトロチオンを用いて、好氣的湛水土壌中動態試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 1 に示されている。（参照 5、14、85）

表 1 好氣的湛水土壌中動態試験の概要及び結果

試験条件	土壌	認められた分解物	推定半減期
0.78 mg/kg 乾土、水深約 1 cm、 $25\pm 2^\circ\text{C}$ 、暗所、最長 28 日間インキュベート	砂壤土 (栃木)	B、E、G、 $^{14}\text{CO}_2$	水層：2 日 土壌層：1 日 系全体：8 日

(2) 好氣的土壌中動態試験

[phe- ^{14}C]フェニトロチオンを用いて、好氣的土壌中動態試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 2 に示されている。（参照 5、15、85）

表 2 好氣的土壌中動態試験の概要及び結果

試験条件	土壌	認められた分解物	推定半減期
0.75 mg/kg 乾土、土壌水分量：最大容水量の 45%、 $20\pm 1^\circ\text{C}$ 、暗所、最長 90 日間インキュベート	砂壤土(英国) 埴壤土(英国)	G、J、 $^{14}\text{CO}_2$	1～33 時間

(3) 土壌表面光分解試験

[phe- ^{14}C]フェニトロチオンを用いて、土壌表面光分解試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 3 に示されている。（参照 5、18、85）

表3 土壌表面光分解試験の概要及び結果

試験条件	土壌	認められた分解物	推定半減期
土壌薄層プレート表面 10 µg/cm ² 、自然太陽光下、 最長 12 日間(8 時間/日) インキュベート	シルト質壤土 (朽木及び滋賀)	B、G	約 1 日

・暗所対照区において、フェニトロチオンの分解はほとんど認められなかった。

(4) 土壌吸脱着試験

フェニトロチオンを用いて、土壌吸脱着試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 4 に示されている。(参照 5、16、85)

表4 土壌吸脱着試験の概要及び結果

供試土壌	K_{adsF}	K_{adsFoc}	K_{desF}	K_{desFoc}
壤土(北海道)、軽埴土 (高知及び和歌山)及 び砂土(宮崎)	9~36	816~1,940	10~45	1,040~2,180

K_{adsF} : Freundlich の吸着係数、 K_{adsFoc} : 有機炭素含有率により補正した吸着係数

K_{desF} : Freundlich の脱着係数、 K_{desFoc} : 有機炭素含有率により補正した脱着係数

2. 水中動態試験

(1) 加水分解試験①

[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを用いて、加水分解試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 5 に示されている。(参照 5、17、85)

表5 加水分解試験①の概要及び結果

試験条件	緩衝液	認められた分解物	推定半減期
1 mg/L、25±1℃、 暗所、最長 30 日 間インキュベート	pH 5(酢酸緩衝液)	E、G	191~200 日
	pH 7(ホウ酸緩衝液)		180~186 日
	pH 9(ホウ酸緩衝液)		100~101 日

(2) 加水分解試験②

[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを用いて、加水分解試験が実施された。

試験の概要及び結果については表 6 に示されている。(参照 5、18、85)

表6 加水分解試験②の概要及び結果

試験条件	供試水		推定半減期		
			15℃	30℃	45℃
1 mg/L、15、30及び45℃、暗所	滅菌緩衝液	pH 2.0	620 日	67 日	8.6 日
		pH 5.1	620 日	62 日	7.3 日
		pH 6.3	500 日	57 日	8.0 日
		pH 7.1	530 日	57 日	7.3 日
		pH 8.1	470 日	42 日	6.7 日
		pH 9.0	210 日	18 日	3.8 日
		pH 10.1	47 日	4.7 日	0.82 日
		pH 10.8	8.2 日	1.1 日	0.18 日
	pH 11.5	1.0 日	0.2 日	-	
	滅菌河川水 (兵庫)	pH 7.1	500 日	62 日	7.3 日
滅菌海水 (兵庫)	pH 7.8	450 日	38 日	6.7 日	

- : 分解が速く算出されなかった。

(3) 水中光分解試験①

[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを用いた、水中光分解試験①が実施された。

試験の概要及び結果については表7に示されている。(参照5、18、85)

表7 水中光分解試験①の概要及び結果

試験条件 ^a	供試水	主要分解物	推定半減期 ^b
1 又は 10 mg/L、自然太陽光[平均光強度:442 W/m ² (全天日射量)]、最長 32 日間(8 時間/日)照射	滅菌蒸留水(pH 5.9)	B、E、G、O、P、Q、 ¹⁴ CO ₂	0.6~1.0 日 (0.7~1.1 日)
	滅菌緩衝液 (グリシン塩酸緩衝液、pH 3)		1.5 日 (1.7 日)
	滅菌緩衝液 (リン酸緩衝液、pH 7)		1.0 日 (1.1 日)
	滅菌緩衝液 (ホウ酸緩衝液、pH 9)		0.9 日 (1.0 日)
	滅菌自然水 (河川水、兵庫、pH 7.4)		1.1 日 (1.3 日)
	滅菌自然水 (海水、兵庫、pH 7.8)		0.9 日 (1.0 日)

^a : 各供試水中のフェニトロチオン濃度は蒸留水のみ 1 又は 10 mg/L、ほかは 10 mg/L。

^b : 括弧内は、東京(北緯 35 度)の春季自然太陽光換算値。

(4) 水中光分解試験②

[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを用いた、水中光分解試験②が実施された。

試験の概要及び結果については表8に示されている。(参照5、19、85)

表 8 水中光分解試験②の概要及び結果

試験条件	供試水	認められた分解物	推定半減期 ^a
1 mg/L、25±1℃、最長30日間光照射(光強度：約30 W/m ²)	滅菌緩衝液 (酢酸緩衝液、pH 5)	B、D、E、F、G、O、P、 ¹⁴ CO ₂	3.5 日 (約 2 日)

^a：括弧内は、自然光換算値（国際照明委員会により規定された標準太陽光の照度から算出）。
 ・暗対照区でのフェニトロチオンの分解は遅く、30日後に79.0%TARが残存していた。

3. 土壌残留試験

フェニトロチオン及び分解物 G を分析対象化合物とした土壌残留試験が実施された。

試験の概要及び結果は表 9 に示されている。（参照 5、20、85）

表 9 土壌残留試験の概要及び結果

試験		濃度 (処理回数)	土壌	推定半減期	
				フェニトロチオン	フェニトロチオン+分解物 G
容器内試験	水田状態	4 mg/kg ^a (1回)	沖積土・埴壤土(滋賀)	8日	
			火山灰土・埴壤土(栃木)	8日	
		0.75 mg/kg ^{MC} (1回)	火山灰土・壤土(茨城)	57日	
			沖積土・埴壤土(高知)	22日	
	畑地状態	4 mg/kg ^a (1回)	沖積土・埴壤土(滋賀)	10日	
			火山灰土・埴壤土(栃木)	6日	
15 mg/kg ^a (1回)	火山灰土・軽埴土 (詳細不明)	2日	4日		
	洪積土・壤質砂土 (詳細不明)	2日	4日		
ほ場試験	水田	1,200 g ai/ha ^{MG} (3回)	沖積土・壤土(滋賀)	<7日	
			沖積土・砂壤土(鳥取)	<3日	
		750 g ai/ha ^{MC} (6回)	火山灰土・壤土(茨城)	156日	
			沖積土・埴壤土(高知)	9日	
	畑地	750~1,500 g ai/ha ^{EC} (6回)	洪積土・壤土(京都)	10日	
			沖積土・埴土(徳島)	5日	
15,000 g ai/ha ^{EC} (6回)	火山灰土・軽埴土 (詳細不明)	1日	1日		
	洪積土・壤質砂土 (詳細不明)	1日	1日		

^a：原体が使用された。

^{MC}：20%マイクロカプセル剤、^{MG}：3%微粒剤、^{EC}：50%乳剤が使用された。

4. 植物、家畜等における代謝及び残留試験

(1) 植物代謝試験

① 水稻

3葉期にポットに移植した水稻（品種：日本晴）に、乳剤に調製した[$\text{phe-}^{14}\text{C}$]フェニトロチオンを750 g ai/haの用量で収穫前81（移植2か月後）、28、21及び14日にそれぞれ1回、計4回茎葉散布処理し、最終処理14日後に稲試料を採取して、植物代謝試験が実施された。

もみ画分及びわらにおける残留放射能分布は表10に、主要代謝物は表11に示されている。

散布処理した放射能の大部分はわら及びもみ殻（外皮）にとどまり、玄米への移行は僅かであった。更に、玄米中の残留放射能の大部分は糠に存在し、白米中の残留放射能はごく僅かであった。

主要代謝物は、G及びその β -グルコース抱合体Gcであった。未変化のフェニトロチオンはもみ、もみ殻及びわらに10%TRR程度で認められたが、その濃度は低く（最高値1.38 mg/kg）、白米中では0.003 mg/kg（2.8%TRR）と僅かであった。結合残留物（非抽出画分）を加水分解した結果、もみ及びもみ殻では代謝物Gがそれぞれ6%TRR及び10%TRR認められたが、その他の代謝物（B及びD）及び未変化のフェニトロチオンは全て2.5%TRR以下であった。（参照5、11、85）

表10 もみ画分及びわらにおける残留放射能分布

試料	表面洗浄液 ¹⁾		抽出画分 ²⁾		非抽出画分		総残留放射能 mg/kg
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	
もみ	0.129	5.5	1.57	67.7	0.624	26.8	2.33
もみ殻	0.714	7.1	5.90	58.4	3.48	34.5	10.1
玄米	-	-	0.541	88.9	0.068	11.1	0.608
白米	-	-	0.094	85.0	0.017	15.0	0.110
糠	-	-	3.35	88.9	0.418	11.1	3.77
わら	0.752	9.6	5.76	73.1	1.36	17.3	7.87

1)：アセトニトリルで洗浄

2)：アセトニトリル水溶液で抽出、表面洗浄後のもみを玄米ともみ殻に分け、玄米の一部を白米と糠に分けた。

-：試験を実施せず

表 11 もみ画分及びわらにおける主要代謝物

試料		もみ						わら	
			もみ殻	玄米	白米	糠			
抽出画分	フェニトロチオン	mg/kg	0.302	1.38	0.027	0.003	0.107	0.780	
		%TRR	13.0	13.7	4.5	2.8	2.8	9.9	
	代謝物 B	mg/kg	0.146	0.845	0.009	ND	0.042	0.268	
		%TRR	6.3	8.4	1.5	ND	1.1	3.4	
	代謝物 D	mg/kg	0.026	0.128	ND	ND	ND	ND	
		%TRR	1.1	1.3	ND	ND	ND	ND	
	代謝物 G	mg/kg	0.192	1.08	0.061	0.017	0.264	0.649	
		%TRR	8.3	10.7	10.0	15.7	7.0	8.2	
	代謝物 Gc ¹⁾	mg/kg	0.822	2.23	0.412	0.072	2.76	3.26	
		%TRR	35.3	22.1	67.8	65.4	73.4	41.5	
	抽出画分合計	mg/kg	1.70	6.61	0.541	0.094	3.35	6.51	
		%TRR	73.2	65.5	88.9	85.0	88.9	82.7	
	非抽出画分	代謝物 G ²⁾	mg/kg	0.146	1.04	0.004	ND	0.054	0.122
			%TRR	6.3	10.3	0.6	ND	1.4	1.6
その他		mg/kg	0.478	2.44	0.064	0.017	0.364	1.24	
		%TRR	20.5	24.2	10.5	15.0	9.7	15.7	

¹⁾ : 大部分は代謝物 Gc であるが他の抱合体を含む。

²⁾ : 非抽出残渣を加水分解して得られたもの。

ND : 検出されず

② トマト

トマト（品種：Shirley）に、[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 750 g ai/ha（標準量）又は 2,250 g ai/ha（3 倍量）の用量で収穫前 29 及び 15 日にそれぞれ 1 回、計 2 回茎葉散布処理し、最終処理 15 日後に果実及び葉を採取して、植物代謝試験が実施された。

トマト果実及び葉における残留放射能分布は表 12 に、トマト成熟果実における主要代謝物は表 13 に示されている。

フェニトロチオンは表面にほとんど残留せず内部に移行した。表面残留物の大部分は未変化のフェニトロチオンであった。フェニトロチオンはトマト成熟果実中で速やかに代謝され、大部分が代謝物 G 及び G のβ-グルコース抱合体 Gc や更に糖鎖の伸長した代謝物へと変化した。G 及び G をアグリコンとする代謝物の総量は未同定化合物を合わせると 45.7%TRR であった。（参照 5、12、85）

表 12 トマト果実及び葉における残留放射能分布

処理量	試料	成熟果実		未成熟果実		葉	
		mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
750 g ai/ha	表面洗浄液 ¹⁾	0.0054	2.58	0.0037	1.27	ND	ND
	アセトン/水抽出液	0.126	60.2	0.183	62.7	1.22	64.9
	抽出残渣	0.0778	37.3	0.105	36.0	0.659	35.2
	総計	0.209	100	0.291	100	1.88	100
2,250 g ai/ha	表面洗浄液 ¹⁾	0.0178	5.11	-	-	ND	ND
	アセトン/水抽出液	0.214	61.4	-	-	7.02	70.2
	抽出残渣	0.117	33.5	-	-	2.98	29.8
	総計	0.349	100	-	-	10.0	100

¹⁾: メタノールで洗浄

ND: 検出されず

-: 試験を実施せず

表 13 トマト成熟果実における主要代謝物

化合物	表面洗浄液 ¹⁾		アセトン/水抽出液		残渣		合計	
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
フェニトロチオン	0.0045	2.17	0.0140	6.67	0.0090	4.33	0.0275	13.2
代謝物 G	ND	ND	0.0131	6.24	0.0016	0.75	0.0147	6.99
代謝物 Gc	0.0006	0.27	0.0147	7.02	ND	ND	0.0153	7.29
代謝物 Gc*	ND	ND	0.0499	23.9	ND	ND	0.0499	23.9
G 誘導体 ²⁾	ND	ND	0.0157	7.49	ND	ND	0.0157	7.49
抽出残渣	-	-	-	-	0.0366	17.5	0.0366	17.5

ND: 検出されず

-: 試験を実施せず

Gc*: Gc 上のグルコースが更に他の糖類で伸長されたもの。

1): メタノールで洗浄

2): 加水分解すると G になる未同定代謝物の混合物

③ぶどう

ぶどう（品種：Thompson Seedless）に、乳剤に調製した[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 817 g ai/ha（標準量）の用量で収穫前 63、49 及び 35 日にそれぞれ 1 回、計 3 回散布処理し、最終処理 35 日後に全てのぶどうの房を採取して、植物代謝試験が実施された。

ぶどう果実における残留放射能は表 14 に、主要代謝物は表 15 に示されている。

ぶどう表面洗浄液中には 10 種の未同定代謝物が認められたが、いずれも 1.2%TRR 未満であった。ぶどう抽出液中に未変化のフェニトロチオンは認め

られず、主要代謝物は G のβ-グルコース抱合体 Gc (20.9%TRR) 及び Gc のグルコースに更にグルコースが結合した代謝物 (25.9%TRR) であり、そのほかに脱メチル体 E が認められた。(参照 5、13、85)

表 14 ぶどう果実における残留放射能

試料	表面洗浄液 ¹⁾		溶媒抽出液 ²⁾		抽出残渣		総計	
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
残留放射能	0.029	4.02	0.628	87.1	0.064	8.88	0.721	100

¹⁾ : 50%アセトニトリル水溶液で洗浄

²⁾ : アセトニトリル、メタノール並びにアセトニトリル及び 0.1N 塩酸 (9:1) で抽出

表 15 ぶどう果実における主要代謝物

代謝物	表面洗浄液		溶媒抽出液	
	mg/kg	%TRR	mg/kg	%TRR
E	ND	ND	0.052	7.21
G	ND	ND	0.007	0.97
Gc	ND	ND	0.151	20.9
Gc 以外の G の抱合体	ND	ND	0.356	49.4

ND : 検出されず。

フェニトロチオンの植物における主要代謝経路は、リン酸エステル結合の加水分解によるフェノール体 G の生成である。代謝物 G の多くはグルコース等による抱合を受け、より極性の高い代謝物になる。また、代謝物の一部は植物構成体と結合して結合残留物を形成すると推定された。

(2) 作物残留試験

穀物、野菜、果実、茶等を用い、フェニトロチオンを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

結果は別紙 3 に示されている。フェニトロチオンの最大残留値は、最終散布 3 日後に収穫したもも (果皮) の 26.4 mg/kg であった。また可食部における最大残留値は、最終散布 14 日後に収穫したみかん (果皮) の 19.2 mg/kg であった。(参照 5、21、85、97、98、103~105)

(3) 家畜代謝試験

① ヤギ

泌乳ヤギ (日本ザーネン種、雌 6 頭) に [phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 0.5 mg/kg 体重/日で 7 日間反復経口投与して、家畜代謝試験が実施された。

投与放射能は、最終投与後 7 日で尿中に 50%TAR、糞中に 44%TAR が排泄され、乳汁への移行は 0.1%TAR であった。

乳汁中では、投与開始 2 日後に 0.011 µg/g で定常状態となり、4 日後に最大

値 0.012 $\mu\text{g/g}$ を示し、最終投与 6 日後には 0.003 $\mu\text{g/g}$ に減少した。

最終投与 1 日後の組織中残留放射能濃度は肝臓で最も高く 0.848~1.48 $\mu\text{g/g}$ であり、腎臓、筋肉及び脂肪では 0.002~0.031 $\mu\text{g/g}$ と低かった。最終投与 18 日後の残留放射能濃度は、肝臓で 0.100~0.102 $\mu\text{g/g}$ 、ほかの臓器及び組織で 0.001 未満~0.006 $\mu\text{g/g}$ であった。

糞及び尿中の主要代謝物として C が尿中に 20.0%TRR、糞中に 31.1%TRR、K が尿中に 11.3%TRR 認められた。ほかに代謝物 Ca、T、V、W、X、Y、Z、AA 及び AB が認められた。乳汁中において 10%TRR を超えて認められた代謝物は、Ca (39%TRR、0.004 $\mu\text{g/g}$)、K (15%TRR、0.002 $\mu\text{g/g}$) 及び T (22%TRR、0.002 $\mu\text{g/g}$) であり、ほかに AA (5%TRR、0.001 $\mu\text{g/g}$ 未満) が認められた。未変化のフェニトロチオン並びに代謝物 B 及び G は認められなかった。

また、投与前日、投与期間中及び投与終了後 1、2、4 及び 6 日に測定された赤血球 ChE 活性に検体投与による影響は認められなかった。(参照 5、79、85、103、106)

② ニワトリ及びうずら

産卵鶏 (白色レグホン種、雌 6 羽) に [phe- ^{14}C]フェニトロチオンを 2 mg/kg 体重/日で 7 日間カプセル経口投与し、又は日本うずら (雌 15 羽) に 5 mg/kg 体重で単回経口投与して、家畜代謝試験が実施された。

ニワトリにおいて、最終投与 1 日後の肝臓、腎臓及び脂肪中の残留放射能濃度は、それぞれ 0.098、0.10 及び 0.016 $\mu\text{g/g}$ であり、筋肉では検出されなかった。最終投与 7 日後には、肝臓及び腎臓中の残留放射能濃度は 0.008 $\mu\text{g/g}$ 以下となり、筋肉及び脂肪では検出されなかった。

最終投与 6 時間後までに 93.6%TRR が排泄物中に排泄され、5 日後までに 99.6%TRR が排泄された。卵中の残留放射能は 0.1%TRR 未満であった。卵中の残留放射能は 7 日間の投与期間中には定常状態とならず、最大残留濃度は最終投与 1 日後に卵白では約 0.02 $\mu\text{g/g}$ 、卵黄では 0.1 $\mu\text{g/g}$ となった。

排泄物中では未変化のフェニトロチオン (0.4%TRR) のほか、抱合体を含めて 11 種類の代謝物が検出された。主要代謝物は G (48.8%TRR) 及びその硫酸抱合体である Gb (2.0%TRR)、H (8.5%TRR) 及びその硫酸抱合体 (7.1%TRR) 並びに E (12.2%TRR) であった。ほかに代謝物 F、I、P 等が認められた。

卵中の主要代謝物は G 及び Gb であり、卵白中で G は 4%TRR、Gb は 6%TRR であり、卵黄中で G は 18%TRR、Gb は 34%TRR 認められた。卵中には、ほかに未変化のフェニトロチオン、代謝物 E、F 及び H のグルクロン酸抱合体が認められたが、いずれも 10%TRR 未満であった。

うずらでは、単回投与 1 時間後の肝臓、腎臓及び筋肉にそれぞれ 0.808、2.16 及び 0.159 $\mu\text{g/g}$ の残留放射能が認められ、いずれの組織においても未変化のフェニトロチオン (肝臓で 0.122 $\mu\text{g/g}$ 、腎臓で 0.113 $\mu\text{g/g}$ 、筋肉で 0.055 $\mu\text{g/g}$)

及び 10%TRR を超える代謝物として G (肝臓で 0.264 µg/kg、腎臓で 0.227 µg/g) が認められた。ほかに肝臓では代謝物 B 及び U が、腎臓では代謝物 U が少量認められた。投与 1 日後における残留放射能濃度は肝臓及び腎臓で 0.016 µg/g となり、筋肉では検出されなかった。投与 7 日後にはいずれの組織においても放射能は検出されなかった。

投与後 6 時間で 92.6%TRR が排泄物中に排泄され、投与 5 日後までに 102%TRR が排泄された。卵中の残留放射能は 0.2%TRR 未満であった。排泄物中の主要代謝物は G (32.9%TRR) 及び Gb (37.6%TRR)、H (1.5%TRR) 及びその硫酸抱合体 (9.6%TRR) 並びに E (6.5%TRR) であった。(参照 79、103、107)

フェニトロチオンの畜産動物における主要代謝経路は、ヤギでは、①ニトロ基の還元と得られたアミノ基の抱合化、②酸化的脱硫黄化 (P=S から P=O への酸化) 及び *O*-脱メチル化であると考えられた。また、ニワトリ及びうずらにおいては *P-O*-アール結合の加水分解及び *m*-メチル基の酸化であり、これらの代謝物は硫酸抱合又はグルクロン酸抱合されると考えられた。

(4) 畜産物等残留試験

① 乳汁移行試験

a. ウシ①

泌乳牛 (ジャージー種、一群雌 2 頭) にフェニトロチオンを 1 及び 3 mg/kg 体重/日の用量で 1 日 2 回、7 日間強制経口投与して、乳汁移行試験が実施された。乳汁試料は投与開始 1、2 及び 3 日前、投与開始 1、2、3、5 及び 7 日後並びに最終投与 1、3、5 及び 7 日後に採取された。

搾乳した試料中のフェニトロチオンは、1 mg/kg 体重/日投与群で検出限界 (0.001 µg/mL) 未満、3 mg/kg 体重/日投与群で 0.002 µg/mL 以下であった。フェニトロチオンは、乳汁へ移行し蓄積することはないと考えられた。(参照 5、22、85)

b. ウシ②

泌乳牛 (ホルスタイン種、雌 3 頭) にフェニトロチオンを 8.5 mg/kg 飼料の用量で 28 日間混餌投与し、28 日後から 7 日間休薬して、乳汁移行試験が実施された。乳汁は投与開始前 1 日、開始 1、2、3、5、7、14、21 及び 28 日後並びに休薬開始 1、2、3 及び 7 日後に採取された。

乳汁中には試験期間中及び休薬期間中のいずれにおいてもフェニトロチオンは検出されなかった。(参照 81)

② 畜産物残留試験

a. ウシ①

牧草地にフェニトロチオンを 0.125 又は 0.375 kg ai/ha の用量で散布し、散布直後に牛（品種不明、一群 10 頭）を放牧し、畜産物残留試験が実施された。散布 1、3、7 及び 10 日後に各群 2 頭をと殺し、胸筋及び大網脂肪が採取された。

0.125 kg ai/ha 散布区において、フェニトロチオン散布 1 日後の筋肉中に 0.007~0.011 µg/g、脂肪中に <0.001~0.002 µg/g 認められたが、散布 7 日後には、いずれも 0.001 µg/g 未満となった。

0.375 kg ai/ha 散布区においては、フェニトロチオン散布 1 日後の筋肉中に 0.009~0.014 µg/g、脂肪中に 0.003~0.014 µg/g 認められた。散布 7 日後には筋肉中で 0.001 µg/g 未満、脂肪中で 0.001~0.005 µg/g 未満となった。（参照 79）

b. ウシ②

試験期間を通してフェニトロチオンが 0.375 kg ai/ha の用量で散布された牧草地に子牛（品種不明、30 頭）を放牧して畜産物残留試験が実施された。牧草中のフェニトロチオンの初期残留量は 11.8 mg/kg であった。試験 1 日目における肉及び脂肪中の残留量は 0.01 µg/g であった。未変化のフェニトロチオンが 3 日目の脂肪中に 0.004~0.007 µg/g 認められたが、肉中には認められなかった。（参照 88）

c. ウシ③（噴霧投与）

牛（ホルスタイン種、雄 3 頭）にフェニトロチオン製剤（10%乳剤）を 12.5~14.0 mg/kg 体重の用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与 60 日後の各組織（肝臓、腎臓、小腸、筋肉、皮膚及び脂肪）中のフェニトロチオン及び代謝物 B（オクソン体）¹が GC-MS により測定された。

フェニトロチオンの残留量は皮膚で検出限界（0.16 ng/g）以上定量限界（0.30 ng/g）未満（0.16~0.27 ng/g）であった。小腸では 3 例中の 2 例にそれぞれ 0.29 及び 0.32 ng/g 認められたが、その他の組織では検出限界（0.15~0.16 ng/g）未満であった。代謝物 B の残留量は各組織中で検出限界（脂肪：1.3 ng/g、その他の組織：0.31~0.32 ng/g）未満であった。（参照 91）

d. ウシ④

フェニトロチオンを 0、1.1、2.2 及び 3.4 kg ai/ha の用量で処理し、76 日間熟成したトウモロコシサイレージを、泌乳牛（ジャージー種、一群雌 4 頭）に

¹ 代謝物 B は活性化体であることから測定された。（以下 [Ⅱ. 4. (4)②h. 及び j.] において同じ。）

56 日間給餌して畜産物残留試験が実施された。1 日 2 回乳汁が採取され、4 週間ごとに 1 日 2 回尿及び糞が採取された。

フェニトロチオン並びに代謝物 B、C 及び G 合計の平均検体摂取量²は、1.1、2.2 及び 3.4 kg ai/ha 処理区でそれぞれ 0.21、0.41 及び 0.66 mg/kg 体重/日であった。

乳汁中には 3.4 kg ai/ha 処理区において代謝物 C のみが 0.001~0.005 µg/g 認められ、ほかの処理区においては 0.001 µg/g 未満であった。尿及び糞中への総排泄量は、それぞれ 0.53~5.1 µg/g 及び 0.037~0.18 µg/g であった。尿及び糞中の主要代謝物は C で総残留量の 92%~99%、そのほかに未変化のフェニトロチオンが 0.7%~8.4%、代謝物 G が 0.4%~0.5%認められ、代謝物 B は認められなかった。（参照 79）

e. ウシ⑤

泌乳牛（ホルスタイン種、一群雌 3 頭、100 mg/kg 飼料投与群のみ 5 頭）にフェニトロチオンを 0、10、30 及び 100 mg/kg 飼料（0、0.75、1.80 及び 9.6 mg/kg 体重/日）の用量で 28 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施された。1 日 2 回乳汁が採取され、-1、0、3、7、14、21 及び 28 日後の乳汁について検討された。

全ての投与群において、乳汁中のフェニトロチオン、代謝物 B、C 及び G、クリーム中の代謝物 B 及び G は定量限界（0.01 µg/g）未満であり、クリーム中で未変化のフェニトロチオン及び代謝物 C がそれぞれ 0.01 及び 0.04 µg/g 認められた。

肝臓、腎臓、筋肉（心臓、後ろ半分の筋肉及び前半分の筋肉）及び脂肪（大網及び腎臓周囲）の検討では、9.6 mg/kg 体重/日投与群の 1 頭の腎臓に代謝物 C が 0.11 µg/g 認められたのみであった。（参照 80、103、108）

f. ウシ⑥

泌乳牛（ジャージー種、雌、動物数不明）にフェニトロチオンを 3 mg/kg 体重/日の用量で 7 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施された。

乳汁中に未変化のフェニトロチオンが 0.002 µg/mL、代謝物 C が 0.003 µg/mL 認められた。最終投与 2 日後にはフェニトロチオン及び代謝物は認められなかった。（参照 88）

g. ウシ⑦

泌乳牛（ジャージー種、雌、動物数不明）にフェニトロチオンを 0、25、50 及び 100 mg/kg 飼料の用量で 28 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施され

² フェニトロチオン換算値

た。

未変化のフェニトロチオン並びに代謝物 B 及び G は乳汁、尿及び糞中に認められなかった。代謝物 C が乳汁中に 0.17 µg/mL、尿中に 35.6 µg/mL 及び糞中に 1.8 µg/mL 認められた。

フェニトロチオンの最終投与 7 日後には、フェニトロチオン及び代謝物は乳汁、尿及び糞中には認められなかった。（参照 88）

h. ブタ（噴霧投与）

豚（大ヨークシャー種、雄 1 及び雌 2 頭）にフェニトロチオン製剤（10%乳剤）を 1.57~1.93 mg/kg 体重の用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与 20 日後の各組織（肝臓、腎臓、小腸、筋肉、皮膚及び脂肪）中のフェニトロチオン及び代謝物 B が GC-MS により測定された。

フェニトロチオンの残留量は、皮膚及び脂肪でそれぞれ 2.5±1.02 及び 1.4±0.22 ng/g であったが、その他の組織では検出限界（0.16 ng/g）未満であった。代謝物 B の残留量は、各組織中で検出限界（脂肪：0.94 ng/g、その他の組織：0.32 ng/g）未満であった。（参照 92）

I. ニワトリ①

産卵鶏（白色レグホン種、一群 12 羽）及び肉用鶏（ホワイト・マウンテン種、一群 12 羽）にフェニトロチオンをそれぞれ 0、10、30 及び 100 mg/kg 飼料（検体摂取量：0、0.72~2.63、2.18~8.44 及び 5.90~24.5 mg/kg 体重/日）の用量で 28~29 日間混餌投与し、畜産物残留試験が実施された。卵は 1 週間に 2 回採取され、産卵鶏は 28 日後（一部 29 日後）に、肉用鶏の半数は 14 日後に、残りの半数は 28 日後（一部 29 日後）にと殺され、赤筋（胸部）、白筋（脚部及び大腿部）、肝臓及び脂肪が採取された。分析対象化合物として、フェニトロチオン、代謝物 B 及び G について検討された。

組織中のフェニトロチオン、代謝物 B 及び G の残留量は定量限界（0.05 µg/g）以下で、卵では残留は認められなかった。（参照 80、103、109）

j. ニワトリ②（噴霧投与）

鶏（白色レグホン種、雄 10 羽及び雌 11 羽）にフェニトロチオン製剤（10%乳剤）を 56.8 mg/kg 体重の用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与 14 日後の各組織（肝臓、腎臓、心臓、筋肉、皮膚及び脂肪）中のフェニトロチオン及び代謝物 B が GC-MS により測定された。

フェニトロチオンの残留量は、筋肉、皮膚及び脂肪でそれぞれ 1.02±0.42、154.33±82.45 及び 3.80±1.42 ng/g であった。肝臓では、検出限界（0.16 ng/g）以上定量限界（0.30 ng/g）未満（0.16~0.23 ng/g）であったが、その他の組織では検出限界（心臓：0.16 ng/g、腎臓：0.31 ng/g）未満であった。代謝物 B

の残留量は、各組織中で検出限界（皮膚：0.64 ng/g、脂肪：1.0 ng/g、その他の組織：0.32 ng/g）未満であった。（参照 93）

k. ニワトリ③（噴霧投与）

肉用鶏（キンバー、30羽）にフェニトロチオン製剤（1%乳剤）を1 m³当たり1 Lの用量で単回噴霧投与し、畜産物残留試験が実施された。投与2及び7日後の各組織（肝臓、筋胃、筋肉及び皮膚）中のフェニトロチオンが測定された。

結果は表 16 に示されている。

投与2日後の皮膚で最大の残留が認められた。肝臓及び筋肉では投与7日後に0.01 µg/g 未満となった。（参照 86）

表 16 組織中残留量 (µg/g)

組織	投与後日数(日)	
	2	7
肝臓	0.01	<0.01
筋胃	0.02	0.02
筋肉	0.05	<0.01
皮膚	1.21	0.03

l. ニワトリ④（噴霧投与）

産卵鶏（ハイスドルフネルソン 10羽、ロックホーン 10羽）をケージ（180×90×90 cm³）に入れ、フェニトロチオン製剤（1%乳剤）を1週間間隔で3回噴霧投与（1 L/回）し、畜産物残留試験が実施された。最終投与5日間ごとの卵及び最終投与14日後の各組織（肝臓、筋胃、筋肉及び皮膚）中のフェニトロチオンが測定された。

結果は表 17 に示されている。筋胃で残留が認められたが、その他の組織及び卵ではいずれも0.01 µg/g 未満であった。（参照 86）

表 17 組織中残留量 (µg/g)

組織	残留量
肝臓	<0.01
筋胃	0.03
筋肉(ささみ)	<0.01
皮膚	<0.01
卵(最終投与5日間)	<0.01
卵(最終投与6~10日間)	<0.01

m. ニワトリ⑤（噴霧投与）＜参考資料³＞

産卵鶏（品種及び羽数不明）にフェニトロチオン製剤（0.2%乳剤）を単回噴霧投与（100 mL/羽）し、畜産物残留試験が実施された。投与 1、2、4、7、10、14 及び 21 日後の卵中の残留が測定された。

いずれの時点においても、残留は認められなかった（検出及び定量限界不明）。（参照 86）

（5）魚介類における最大推定残留値

フェニトロチオンの水域環境中予測濃度（水域 PEC）及び推定生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算出された。

フェニトロチオンの水域 PEC は 1.6 µg/L、BCF は 30（試験魚種：ブルーギル）、魚介類における最大推定残留値は 0.240 mg/kg であった。（参照 4）

（6）推定摂取量

別紙 3 の作物残留試験の分析値を用いて、フェニトロチオンをばく露評価対象物質とした際に、食品中から摂取される推定摂取量が表 18 に示されている（別紙 4 参照）。

なお、本推定摂取量の算定は、登録又は申請された使用方法から、フェニトロチオンが最大の残留を示す使用条件で、全ての適用作物に使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全くないとの仮定の下に行った。

表 18 食品中から摂取されるフェニトロチオンの推定摂取量

	国民平均 (体重：55.1 kg)	小児(1～6 歳) (体重：16.5 kg)	妊婦 (体重：58.5 kg)	高齢者(65 歳以上) (体重：56.1 kg)
摂取量 (µg/人/日)	89.4	64.5	104	91.2

5. 動物体内動態試験

（1）ラット

① 吸収

a. 血中濃度推移

ラット（系統不明、雄 3 匹）に[mep-³²P]フェニトロチオン又は Wistar ラット（雌雄各 7 匹）に[met-¹⁴C]フェニトロチオンをそれぞれ 15 mg/kg 体重の用量で単回経口投与して、血中濃度推移について検討された。なお、[mep-³²P]フェニトロチオン投与群では血中総放射能が、[met-¹⁴C]フェニトロチオン投与群では血中のフェニトロチオン未変化体が測定された。

血中薬物動態学的パラメータは表 19 に示されている。

³ 羽数、品種、検出又は定量限界が不明であることから、参考資料とした。

血中濃度はいずれも投与1～3時間後に最大になり、以後速やかに減少した。
(参照 5～7、85)

表 19 血中薬物動態学的パラメータ

標識体	[mep- ³² P]フェニトロチオン	[met- ¹⁴ C]フェニトロチオン (未変化体)*	
投与量	15 mg/kg 体重	15 mg/kg 体重	
性別	雄	雄	雌
T _{max} (hr)	1	3	1
C _{max} (μg/g)	15.5	0.026	0.093
T _{1/2} (hr)	10.6 ¹⁾	4.7 ²⁾	4.94 ²⁾
AUC ³⁾	365	1.15	0.855

* : TLC 分析でフェニトロチオンを検出

1) : 投与 24 時間後から投与 48 時間後までのデータに基づいて算出

2) : T_{max} から投与 24 時間後までのデータに基づいて算出

3) : AUC の単位は[mep-³²P]フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr・μg/g」、
[met-¹⁴C]フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr・μg/mL」

b. 吸収率

尿及び糞中排泄試験 [5.(1)④] で得られた投与後 168 時間の尿における残存放射能から、フェニトロチオンの経口投与後の吸収率は少なくとも低用量投与群の雄で 92.6%、雌で 90.2%、高用量投与群の雄で 86.0%、雌で 91.8%と推定された。(参照 5、8、85)

② 分布

SD ラット (一群雌雄各 5 匹) に[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを 1.5 mg/kg 体重 (以下 [5.(1)] において「低用量」という。) 若しくは 150 mg/kg 体重 (以下 [5.(1)] において「高用量」という。) で単回経口投与し、又は非標識体を低用量で 1 日 1 回 14 日間反復経口投与後に[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを低用量で単回経口投与 (以下 [5.(1)] において「反復経口投与」という。) して体内分布試験が実施された。また別途、ラット (雄、系統及び匹数不明) に[mep-³²P]フェニトロチオンを 15 mg/kg 体重で単回静脈内投与又は Wistar ラット (雄 10 匹) に[met-¹⁴C]フェニトロチオンを 15 mg/kg 体重で単回経口投与して体内分布について検討された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 20 に示されている。

吸収されたフェニトロチオンは各組織に分布するが、各組織、血中からの消失は速やかで、[met-¹⁴C]フェニトロチオン 15 mg/kg 体重投与群では投与 24 時間後に全身オートラジオグラフィーで ¹⁴C は検出されなくなり、血中濃度は 96 時間後には検出限界 (0.001 μg/g) 未満になった。また、[phe-¹⁴C]フェニトロチオン高用量投与群においても投与 168 時間後には残存する ¹⁴C は

0.1%TAR となり、蓄積傾向を示す組織はみられなかった。

[phe-¹⁴C]フェニトロチオン反復投与群における投与 168 時間後の分布組織は低用量投与群とほぼ同じで、蓄積量は低用量投与群より少なかった。(参照 5、7～9、85)

表 20 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (µg/g)

標識体	投与量 投与方法	性別	残留放射能濃度	
[phe- ¹⁴ C] フェニトロチオン	投与 168 時間後			
	1.5 mg/kg 体重 単回経口	雄	肝臓(0.0155)、全血(0.0061)、皮膚及び被毛(0.0024)、カーカス ⁴ (0.0022)、腎臓(0.0019)、肺(0.0018)、脾臓(0.0014)、心臓(0.0012)、膵臓(0.0011)、血漿(0.0007)	
		雌	肝臓(0.0058)、全血(0.0036)、皮膚及び被毛(0.0023)、カーカス(0.0021)、卵巣(0.0021)、腎臓(0.0019)、肺(0.0017)、脾臓(0.0015)、膵臓(0.0008)、血漿(ND)	
	150 mg/kg 体重 単回経口	雄	白色脂肪；皮下(0.730)、副腎(0.630)、膵臓(0.460)、肝臓(0.450)、カーカス(0.450)、全血(0.400)、褐色脂肪(0.390)、白色脂肪；腹部(0.370)、皮膚及び被毛(0.330)、脾臓(0.270)、血漿(0.210)	
		雌	子宮(0.890)、カーカス(0.440)、膵臓(0.360)、脾臓(0.300)、全血(0.200)、肝臓(0.170)、顎下腺(0.140)、皮膚及び被毛(0.130)、腎臓(0.100)、血漿(ND)	
	1.5 mg/kg 体重/日 反復経口	雄	肝臓(0.0033)、カーカス(0.0014)、全血(0.0011)、皮膚及び被毛(0.0008)、腎臓(0.0007)、血漿(ND)	
		雌	皮膚及び被毛(0.0023)、カーカス(0.0017)、肝臓(0.0014)、全血(0.0009)、血漿(ND)	
	[mep- ³² P] フェニトロチオン	15 mg/kg 体重 単回静脈内	雄	投与 2.5 分後
			腎臓(23.6)、肝臓(20.6)、脳(20.4)、肺(18.7)、心臓(18.5)、血液(9.5)、筋肉(9.2)、脾臓(7.8)	
[met- ¹⁴ C] フェニトロチオン	15 mg/kg 体重 単回経口	雄	投与 1 時間後	投与 24 時間後
			腎臓(11.7)、胃及び腸(5.44)、肝臓(2.64)、血液(2.15)	肝臓(0.085)、腎臓(0.072)、胃及び腸(0.068)、脂肪(0.066)、膵臓(0.041)、下垂体(0.040)、甲状腺(0.035)、脾臓(0.028)、血液(0.028)

ND：検出されず

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験 [5.(1)④] で得られた尿及び糞を試料として、また別途、Wistar ラット(雌雄、匹数不明)に[met-¹⁴C]フェニトロチオンを 15 mg/kg

⁴ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという(以下同じ。)

体重で単回経口投与又はラット（雄、系統及び匹数不明）に[mep-³²P]フェニトロチオンを 15 mg/kg 体重で単回経口投与して尿及び糞を採取し、代謝物同定・定量試験が実施された。

投与後 48 時間における尿及び糞中代謝物は表 21 に示されている。

尿中に未変化のフェニトロチオンは認められなかった。[phe-¹⁴C]フェニトロチオン低用量投与群及び反復投与群の尿中における主要代謝物はリン酸基が加水分解して生成する Gb 及び Ga であり、投与量の半分以上（代謝物 G を含めて 54%TAR~66%TAR）を占めた。高用量投与群の主要代謝物は脱メチル体 E 及び F（合計 43%TAR~58%TAR）であり、Gb 及び Ga がこれに続いた。[met-¹⁴C]フェニトロチオン投与群においても Gb が主要代謝物であったが、Ga は少なかった。糞中への排泄量が少ないため、低用量投与群では未変化のフェニトロチオン、代謝物ともに認められなかったが、高用量投与群では僅かに未変化のフェニトロチオンが認められた。フェニル基側の主要代謝物は尿・糞間、雌雄間及び標識体間ではほとんど違いが認められなかった。

[mep-³²P]フェニトロチオン投与群で認められた代謝物は、フェニトロチオン及びフェニトロチオンのオクソン体（代謝物 B）の P-O-アリアル結合の開裂で得られたリン酸エステルである代謝物 R 及び S であった。

ラットにおける主要代謝経路は、①フェニトロチオンの酸化的脱硫黄化（P=S から P=O への酸化）によるオクソン体 B の生成、②フェニトロチオン又は代謝物 B の O-脱メチル化反応、③P-O-アリアル結合の開裂反応とそれに続く硫酸抱合化及びグルクロン酸抱合化であった。（参照 5~8、85）

表 21 投与後 48 時間における尿及び糞中代謝物 (%TAR)

標識体	投与量 投与方法	性別	試料	フェニト ロチオン	代謝物
[phe- ¹⁴ C] フェニト ロチオン	1.5 mg/kg 体重 単回経口	雄	尿	ND	Gb(48.6)、Ga(13.8)、F(7.1)、 G(3.2)、E(1.9)
			糞	ND	ND
		雌	尿	ND	Gb(41.7)、Ga(12.6)、F(9.0)、 G(4.9)、E(2.7)
			糞	ND	ND
	150 mg/kg 体重 単回経口	雄	尿	ND	E(31.3)、Gb(21.1)、F(12.0)、 G(5.1)、Ga(4.6)
			糞	1.7	G(0.5)
		雌	尿	ND	E(46.7)、Gb(15.3)、F(11.5)、 Ga(4.3)、G(4.1)
			糞	0.4	G(0.9)
	1.5 mg/kg 体重/日 反復経口	雄	尿	ND	Gb(56.6)、Ga(9.0)、F(8.9)、 G(3.8)、E(1.5)
			糞	ND	ND
		雌	尿	ND	Gb(43.8)、Ga(14.7)、F(14.1)、 G(4.2)、E(3.9)
			糞	ND	ND
[mep- ³² P] フェニト ロチオン	15 mg/kg 体重 単回経口	雄	尿	ND	S(44.7)、R(16.4)
[met- ¹⁴ C] フェニト ロチオン ¹⁾	15 mg/kg 体重 単回経口	雄	尿	ND	Gb(35.3)、F(26.4)、G(8.2)、 E(7.1)、Ga(5.7)、N(5.5)、 Ma(3.5)、I(2.4)
			糞	13.2 (<1%TAR)	G(70.3)、E(13.2)、F(6.0)
		雌	尿	ND	Gb(27.6)、E(25.8)、F(15.4)、 G(14.6)、Ga(5.3)、N(2.5)、 Ma(1.9)

ND：検出されず

¹⁾：[met-¹⁴C]フェニトロチオン投与群における数値は、尿中又は糞中放射能に対する割合 (%TRR)

④ 排泄

SD ラット（一群雌雄各 5 匹）に[phe-¹⁴C]フェニトロチオンを低用量若しくは高用量で単回経口投与し、又は反復経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率は表 22 に示されている。

いずれの投与群においても、経口投与したフェニトロチオンは投与後 168 時間で 95%TAR 以上が尿及び糞中に排泄され、主に尿中に排泄された。また低用量単回及び反復経口投与ではその大半（94%TAR 以上）が投与後 24 時間で速やかに排泄された。反復投与では若干尿中排泄が増えたが、雌雄及び投与量

の違いによる尿及び糞中排泄の割合の変化は認められなかった。(参照 5、8、85)

表 22 投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率 (%TAR)

投与量	1.5 mg/kg 体重		150 mg/kg 体重		1.5 mg/kg 体重/日	
投与方法	単回経口		単回経口		反復経口	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	92.6	90.2	86.0	91.8	96.5	101
糞	6.8	7.2	8.6	5.6	3.0	1.9
総回収率	99.4	97.4	94.6	97.4	99.5	103

(2) マウス、ウサギ、イヌ及びモルモット

① 吸収

a. 血中濃度推移

ICR マウス (一群雄 10 匹)、日本白色種ウサギ (一群雌雄各 5 匹) 及びビーグル犬 (一群雄 3 匹) に [met-¹⁴C] フェニトロチオンをそれぞれ 15 mg/kg 体重で単回経口投与し、又はモルモット (系統不明、一群雄 3 匹) に [mep-³²P] フェニトロチオンを 500 mg/kg 体重で単回経口投与して、血中濃度推移について検討された。なお、[met-¹⁴C] フェニトロチオン投与群では血中のフェニトロチオン未変化体が、[mep-³²P] フェニトロチオン投与群では血中総放射能が測定された。

血中薬物動態学的パラメータは表 23 に示されている。

動物種、投与量及び標識体の種類にかかわらず血中濃度は速やかに減少した。(参照 5、6、7、85)

表 23 血中薬物動態学的パラメータ

標識体	[met- ¹⁴ C] フェニトロチオン(未変化体)*				[mep- ³² P] フェニトロチオン
動物種	マウス	ウサギ		イヌ	モルモット
投与量	15 mg/kg 体重	15 mg/kg 体重		15 mg/kg 体重	500 mg/kg 体重
性別	雄	雄	雌	雄	雄
T _{max} (hr)	1	1	3	3	3
C _{max} (µg/g)	0.016	0.030	0.027	0.144	339
T _{1/2} (hr) ¹⁾	6.19	1.47	6.46	9.02	5.4 ²⁾
AUC ³⁾	0.143	0.118	0.207	1.09	7,000

* : TLC 分析でフェニトロチオンを検出

1): T_{max} から投与 9 時間後 (ウサギ雄)、24 時間後 (マウス、ウサギ雌、イヌ) までのデータに基づいて算出

2): 投与 24 時間後から 48 時間後のデータに基づいて算出

3): AUC の単位は、[mep-³²P] フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr・µg/g」、[met-¹⁴C] フェニトロチオン標識体を用いた試験では「hr・µg/mL」

b. 吸収率

尿及び糞中排泄試験 [5.(2)③] で得られた尿における残存放射能から、フェニトロチオンの経口投与後の吸収率は少なくともマウスで 55%、ウサギで 86%、イヌで 88%、モルモットで 85%と推定された。(参照 5~7、10、85)

② 代謝

尿及び糞中排泄試験 [5.(2)③] で得られた尿を試料として代謝物同定・定量試験が実施された。

投与後 48 時間における尿中代謝物は表 24 に示されている。

尿中に未変化のフェニトロチオン及びフェニトロチオンのオクソン体 B はほとんど認められなかった。尿中における主要代謝物は動物種の違いにかかわらずほぼ同じであり、主要代謝物はリン酸基が加水分解して生成する Gb 及び Ga 並びにリン酸基側の代謝物として S 及び R であった。

主要代謝経路はラットと同様であると考えられた。(参照 5、7、10、85)

表 24 投与後 48 時間における尿中代謝物 (%TRR)

標識体	[mep- ³² P]フェニトロチオン		[met- ¹⁴ C]フェニトロチオン				
	Swiss マウス ¹⁾	モルモット ²⁾	ICR マウス		ウサギ		イヌ
動物種							
投与量	17 mg/kg 体重	500 mg/kg 体重	15 mg/kg 体重		15 mg/kg 体重		15 mg/kg 体重
性別	雄	雄	雄	雌	雄	雌	雄
代謝物 B	1.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND
代謝物 C	ND	ND	ND	ND	3.7	0.5	ND
代謝物 E	20.1	15.8	17.8	10.5	5.8	4.3	51.2
代謝物 F	28.4	3.8	25.6	20.3	2.1	2.7	5.7
代謝物 G	-	-	20.4	11.1	11.2	3.6	15.6
代謝物 Ga	-	-	7.5	7.5	13.1	23.1	3.0
代謝物 Gb	-	-	21.0	43.4	39.2	48.1	17.5
代謝物 I	-	-	ND	ND	0.5	ND	1.0
代謝物 R	20.3	19.5	-	-	-	-	-
代謝物 S	21.4	21.2	-	-	-	-	-

ND：検出されず、-：標識体なし

¹⁾：投与後 24 時間の尿を分析

²⁾：数値は%TAR

③ 排泄

Swiss マウス（雄、匹数不明）に[mep-³²P]フェニトロチオンを 3、17、200 若しくは 850 mg/kg 体重で単回経口投与、モルモット（系統不明、雄 10 匹）に[mep-³²P]フェニトロチオンを 500 mg/kg 体重で単回経口投与、又は ICR マ

ウス（雌雄各 10 匹）、日本白色種ウサギ（雌雄各 5 匹）及びビーグル犬（雄 3 匹）に[met-¹⁴C]フェニトロチオンを 15 mg/kg 体重で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

各投与群の尿中排泄率は表 25 に示されている。

いずれの動物種においても投与放射能は主に尿中に排泄された。Swiss マウスでは、全ての投与群において、投与後 72 時間で 90%TAR 以上が尿及び糞中に排泄された。（参照 5～7、10、85）

表 25 各投与群の尿中排泄率 (%TAR)

標識体	動物種	投与量	性別	試料採取時間	尿中排泄率
[mep- ³² P] フェニト ロチオン	Swiss マウス	3 mg/kg 体重	雄	投与後 24 時間	≥ 75
		17 mg/kg 体重			
		200 mg/kg 体重			55
		850 mg/kg 体重			
モルモット	500 mg/kg 体重	雄	投与後 96 時間	85	
[met- ¹⁴ C] フェニト ロチオン	ICR マウス	15 mg/kg 体重	雄	投与後 48 時間	92
			雌		93
	ウサギ	15 mg/kg 体重	雄	投与後 72 時間	94
			雌		86
	イヌ	15 mg/kg 体重	雄	投与後 96 時間	88

6. 急性毒性試験等

(1) 急性毒性試験（経口投与）

フェニトロチオン（原体）のラット、マウス及びイヌを用いた急性毒性試験（経口投与）が実施された。

結果は表 26 に示されている。（参照 5、24～32、85）

表 26 急性毒性試験概要（経口投与、原体）

動物種 性別、匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
SD ラット ^a 雌雄各 8 匹	330	800	<p>投与量： 雄：52、73、102、143、200、280、392、550、770 mg/kg 体重 雌：52、73、102、200、280、392、550、770、1,080、1,510 mg/kg 体重 雌雄：73 mg/kg 体重以上で攣縮、振戦、運動失調、眼球突出、血涙、流涎及び尿失禁(投与 10 分後以降)</p> <p>雄：200 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：392 mg/kg 体重以上で死亡例</p>
SD ラット ^b 雌雄各 10 匹	660	1,050	<p>投与量：100、200、346、450、590、770、1,000、1,300、2,000 mg/kg 体重 自発運動低下、呼吸不規則、呼吸困難、運動失調、流涎、振戦、攣縮、眼球突出、立毛及び流涙(発現用量不明、投与 30 分後以降)</p> <p>雄：346 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：1,000 mg/kg 体重以上で死亡例</p>
Wistar ラット ^b 雌雄各 10 匹	415	860	<p>投与量： 雄：266、333、416、520、650 mg/kg 体重 雌：532、666、832、1,040、1,300 mg/kg 体重 雄：266 mg/kg 体重以上、雌：532 mg/kg 体重以上で自発運動低下、流涙、血涙、流涎、攣縮、尿失禁、呼吸困難、立毛及び間代性痙攣(投与 10 分後以降)</p> <p>雄：333 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：666 mg/kg 体重以上で死亡例</p>
SD ラット 雌雄各 10 匹	1,700	1,720	<p>投与量：0、600、1,000、1,400、1,800、2,200、2,600、3,000 mg/kg 体重 雌雄：600 mg/kg 体重以上で筋攣縮、縮瞳、自発運動低下、失調性歩行、四肢の麻痺、呼吸不規則、呼吸困難、流涙、流涎、尿失禁及び眼球突出(投与 10 分後以降)</p> <p>雌雄：1,400 mg/kg 体重以上で死亡例</p>

動物種 性別、匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
	雄	雌	
dd マウス ^a 雌雄各 8 匹	1,030	1,040	投与量：0、500、700、980、1,370、1,920 mg/kg 体重 雌雄：700 mg/kg 体重以上で自発運動低下、呼吸深大、呼吸困難、四肢又は全身性の運動失調、流涎、流涙、軽度の振戦及び間代性痙攣(投与 30 分後以降) 雌雄：700 mg/kg 体重以上で死亡例
dd マウス ^b 雌雄各 10 匹	1,400	1,270	投与量：500、650、845、1,000、1,300、1,700、2,200、2,860 mg/kg 体重 自発運動低下、呼吸不規則、呼吸困難、運動失調、流涎、振戦、攣縮、眼球突出、立毛及び流涙(発現用量不明、投与 30 分後以降) 雌雄：1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
ビーグル犬 ^a 雌雄各 2 匹	>300	>300	投与量：0、300 mg/kg 体重 雌雄：300 mg/kg 体重で呼吸促迫及び不規則、意気消沈、自発運動低下、流涎、歩行失調、下痢、後肢麻痺、振戦及び赤血球 ChE 阻害(20%以上)(投与 10 分後以降) 過敏、悪心、筋萎縮、全身性の間代性及び強直性痙攣、脱力及び前後肢麻痺(雌 1 例、投与 30 分後以降) 雌雄：死亡例なし

注) 溶媒として、^aは 10%Tween80、^bはコーン油が使用された。

(2) 一般薬理試験

フェニトロチオンのラット、マウス、ウサギ、ネコ及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。

結果は表 27 に示されている。(参照 5、23、85)

表 27 一般薬理試験概要（原体）

試験の種類	動物種 ^a	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
一般症状	dd マウス	雄 8 雌 8	800、936、 1,095、1,281、 1,499 (経口)	—	800	800 mg/kg 体重以上で 自発運動低下、呼吸促 迫、呼吸困難、流涎、 振戦及び流涙(投与 10 分後以降) 936 mg/kg 体重以上で 死亡例
			2,000、2,440、 2,977、3,632、 4,431、5,405 (皮下)	—	2,000	自発運動低下、流涎、 挙尾、振戦及び跳躍 2,440 mg/kg 体重以上 で死亡例
			500、550、 605、666、732 (腹腔内)	—	500	自発運動低下、挙尾、 跳躍、流涎、流涙、呼 吸困難及びチアノーゼ 550 mg/kg 体重以上で 死亡例
角膜及び 結膜に対 する作用	ウサギ	雄 匹数 不明	0、0.1、1、10 (%) (点眼)	1.0 (%)	10 (%)	10%液で催涙及び結膜 充血
脳波	ウサギ、 ネコ	雌雄 匹数 不明	0、≤1、2 (静脈内)	1	2	2 mg/kg 体重で 覚醒波出現
血圧	ウサギ、 ネコ	雌雄 匹数 不明	1~3、5~10、 20 (静脈内)	—	1	1~3 mg/kg 体重で軽度 血圧下降、5 mg/kg 体重 以上では用量に相関し た血圧下降、10 mg/kg 体重以上では二相性変 化
心電図	ウサギ、 ネコ	雌雄 匹数 不明	0、≤2 (静脈内)	2	—	影響なし
脳局所 血流	ウサギ、 ネコ	雌雄 匹数 不明	0、≤1、2 (静脈内)	1	2	2 mg/kg 体重で頸動脈 血流量及び脳局所血流 増加
摘出心房	モルモット	雄 匹数 不明	≤10 ⁻⁶ ~10 ⁻⁴ (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10 ⁻⁶ (mol/L)	10 ⁻⁵ (mol/L)	10 ⁻⁵ mol/L 以上で収縮 及び拍動数抑制

試験の種類	動物種 ^a	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小 作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
摘出 乳頭筋	モルモット	雄 匹数 不明	$\leq 10^{-6}$ ~ 3.3×10^{-4} (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10^{-6} (mol/L)	10^{-5} (mol/L)	10^{-5} mol/L 以上で収縮抑制
摘出 耳殻血管	ウサギ	雄 匹数 不明	10^{-5} ~ 10^{-2} (mol/L) (<i>in vitro</i>)	内壁適用： 10^{-2} (mol/L) 外壁適用： 10^{-3} (mol/L)	—	影響なし
摘出腸管	ウサギ	雄 匹数 不明	$\leq 5 \times 10^{-6}$ ~ 10^{-3} (mol/L) (<i>in vitro</i>)	5×10^{-6} (mol/L)	10^{-5} (mol/L)	10^{-5} mol/L 以上で腸管運動を抑制 ACh 収縮を抑制
摘出腸管	モルモット	性別及び匹数 不明	$\leq 5 \times 10^{-6}$ ~ 10^{-4} (mol/L) (<i>in vitro</i>)	5×10^{-6} (mol/L)	10^{-5} (mol/L)	10^{-5} mol/L 以上で His 及び Ba ²⁺ 収縮を抑制
神経筋 接合部	SD ラット	雄 匹数 不明	$\leq 10^{-4}$ 、 5×10^{-4} (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10^{-4} (mol/L)	5×10^{-4} (mol/L)	5×10^{-4} mol/L 以上で神経刺激収縮を抑制

注) いずれの試験においても、溶媒として Sorpol 1,200 が使用された。

a: ウサギ、ネコ、モルモットについては系統不明。

—: 最大無作用量又は最小作用量は設定できなかった。

7. 亜急性毒性試験

(1) 6か月間亜急性毒性試験 (ラット)

Wistar ラット (一群雌雄各 15 匹) を用いた混餌投与 (原体: 0、10、30 及び 150 ppm: 平均検体摂取量は表 28 参照) による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

表 28 6 か月間亜急性毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	30 ppm	150 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.59	1.83	9.16
	雌	0.64	2.00	11.2

各投与群で認められた毒性所見は表 29 に示されている。

本試験において 150 ppm 投与群の雄及び 30 ppm 以上投与群の雌で赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上) が認められたことから、無毒性量は雄で 30 ppm (1.83 mg/kg 体重/日)、雌で 10 ppm (0.64 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 5、42、85)

表 29 6 か月間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
150 ppm	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)(投与終了時)	・体重増加抑制(投与終了時)
30 ppm 以上	30 ppm 以下 毒性所見なし	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)(投与終了時)
10 ppm		毒性所見なし

(2) 30 日間亜急性毒性試験（ラット）＜参考資料⁵⁾＞

SD ラット（一群雄 36 匹）を用いた強制経口投与（原体：0、2.5、5、10 及び 20 mg/kg 体重/日）による 30 日間亜急性毒性試験が実施された。投与 8、15、22 及び 30 日並びに投与終了 8、15、29、57 及び 85 日後に各 4 匹がと殺された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性並びに肝及び腎カルボキシルエステラーゼ活性が測定された。

各投与群で認められた毒性所見は表 30 に示されている。

なお、5 mg/kg 体重/日以上投与群で腎カルボキシルエステラーゼ低下（20%以上）、2.5 mg/kg 体重/日以上投与群で肝カルボキシルエステラーゼ低下（50%以上）が認められた。（参照 75）

表 30 30 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄
20 mg/kg 体重/日	・死亡(8 例) ・流涎、立毛、下痢、色素涙、興奮性、運動失調、筋攣縮、 全身性振戦及び痙攣 ・体重増加抑制
5 mg/kg 体重/日以上	・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)
2.5 mg/kg 体重/日以上	・脳 ChE 活性阻害(20%以上)(30%、投与 30 日)

(3) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）＜参考資料⁶⁾＞

Wistar ラット（一群雄 16～17 匹）を用いた混餌投与（原体：0、32、63、125、250 及び 500 ppm）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

各投与群で認められた毒性所見は表 31 に示されている。（参照 75）

⁵⁾ 投与期間中（8、15、22 及び 30 日）に各群 4 匹ずつと殺して試験が実施されており、一般的なプロトコールと異なること及び雄のみの試験であることから、参考資料とした。

⁶⁾ 投与期間中の 1 か月ごとに各群 4 匹ずつと殺して試験が実施されており、一般的なプロトコールと異なること及び雄のみの試験であることから、参考資料とした。

表 31 90 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄
500 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・死亡(1 例) ・運動失調及び立毛 ・角膜混濁、角膜及び結膜出血 ・体重増加抑制及び摂餌量低下 ・脳 ChE 活性阻害(20%以上)
250 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・筋攣縮及び流涙
32 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)

(4) 6 か月間亜急性毒性試験（ウサギ）

日本白色在来種ウサギ（一群雄 12 匹）を用いた混餌投与（原体：0、3 及び 10 mg/kg 体重/日相当）による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

3 mg/kg 体重/日投与群では投与 24 週、10 mg/kg 体重/日投与群では投与 1 週以降に赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められるとともに、10 mg/kg 体重/日投与群では投与終了時に脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められた。これ以外の項目に検体投与による影響は認められなかった。

本試験における無毒性量は 3 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。（参照 5、43、85）

8. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 92 週間慢性毒性試験（ラット）＜参考資料⁷⁾＞

Wistar ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌投与（原体：0、2.5、5 及び 10 ppm）による 92 週間慢性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

赤血球 ChE 活性は本試験の最高用量 10 ppm においても著明な阻害はみられなかった。脳 ChE 活性阻害はいずれの投与群においても認められなかった。

（参照 5、42、85）

(2) 1 年間慢性毒性試験（イヌ）①

ビーグル犬（一群雌雄各 6 匹）を用いた混餌投与（原体：0、5、10 及び 50 ppm：平均検体摂取量は表 32 参照）による 1 年間慢性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

⁷⁾ 本試験はラットを用いた 6 か月間亜急性毒性試験 [7.(1)] の補足として実施された ChE 活性測定試験であり、慢性毒性試験として評価すべき検査項目が不足していることから、参考資料とした。

表 32 1 年間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群		5 ppm	10 ppm	50 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.17	0.33	1.57
	雌	0.15	0.29	1.59

50 ppm 投与群の雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）の有意な増加が認められたが、同じ動物の投与前値と比較した場合の ChE 活性阻害は 20%未満であり、有意差が認められたのは投与 8 週の一時点のみであることから、検体の影響とは考えられなかった。

本試験においていずれの投与群でも検体投与の影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 50 ppm（雄：1.57 mg 体重/日、雌：1.59 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5、47、84、85）

（3）1 年間慢性毒性試験（イヌ）②<参考資料⁸>

ビーグル犬（一群雌 2 匹）を用いたカプセル経口投与投与（原体：0 及び 2 mg/kg 体重/日）による 1 年間慢性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球 ChE 活性が測定された。

投与群において、眼分泌物の増加、流涎及び下痢が認められた。赤血球 ChE 活性には 2 週目頃から低下がみられ、2 か月目頃からほぼ安定した低値を示すようになった。全身及び眼に著明な変化は認められなかった。（参照 5、48、85）

（4）2 年間慢性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 6 匹）を用いた混餌投与（原体：0、30、100 及び 200 ppm：平均検体摂取量は表 33 参照）による 2 年間慢性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

表 33 2 年間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群		30 ppm	100 ppm	200 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.98	3.34	6.97
	雌	1.08	3.60	7.40

各投与群で認められた毒性所見は表 34 に示されている。

各投与群で精巣における限局性又は慢性の変性像が 2～3 例にみられたが、精巣の変性を示唆する変化は、ほぼ同月齢のビーグル犬において自然発生病変

⁸ 一群片性 2 匹という少数例の試験であることから、参考資料とした。

として報告⁹（精細管の萎縮 3/10 例）されており、また、本試験における発生頻度は低く用量相関性がないことから、検体の投与に関連するものとは考えられなかった。

本試験において、100 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20% 以上）が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 30 ppm（雄：0.98 mg/kg 体重/日、雌：1.08 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5、46、85）

表 34 2 年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	・脳 ChE 活性阻害(20%以上) (投与終了時)	
100 ppm 以上	・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上) (投与 6 か月以降)	・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上) (投与 6 か月以降)
30 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

（5）2 年間慢性毒性試験（サル）

カニクイザル（一群雌雄各 7 匹）を用いた強制経口投与（原体：0、0.1、0.5 及び 2 mg/kg 体重/日）による 2 年間慢性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

2 mg/kg 体重/日投与群の雌において、投与 20 週以降一貫して対照群に比して 10%以上の体重低下が認められた。

ChE 活性測定（投与 1 か月）では、2 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）、雌で脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められた。

筋電図検査（投与 3 か月以降）では、2 mg/kg 体重/日投与群において三頭筋及び四頭筋の刺入時電位の持続時間及び強さの僅かな増加が認められた。

本試験において、2 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20% 以上）等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 0.5 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 89）

（6）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）

SD ラット [親世代の発育時から検体を混餌投与された第一世代（3 世代繁殖試験 [10.（3）] の F_{1a} 離乳児）を使用、一群雌雄各 50 匹（対照群のみ 60 匹）、うち投与 52 週間後に一群雌雄各 10 匹を中間と殺] を用いた混餌投与（原体：0、10、30 及び 100 ppm：平均検体摂取量は表 35 参照）による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

⁹ Rehm, S. Spontaneous testicular lesions in purpose-bred beagle dogs. *Toxicol Pathol*, 28, 782-787, 2000

表 35 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	30 ppm	100 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.49	1.45	5.05
	雌	0.62	1.81	6.46

各投与群で認められた毒性所見は表 36 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、30 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 10 ppm（雄：0.49 mg/kg 体重/日、雌：0.62 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 5、49、85）

表 36-1 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
100 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制(投与 0～52 週の累積増加量) ・摂餌量減少(投与 0～52 週の総摂餌量) 	
30 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球(投与 0 週以降)及び脳^aChE 活性阻害(20%以上) 	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球(投与 0 週以降)及び脳^aChE 活性阻害(20%以上)
10 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 30 ppm 投与群：投与 52 週、100 ppm 投与群：投与 52 及び 104 週

表 36-2 1年間慢性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
100 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制(投与 0～52 週の累積増加量) ・摂餌量減少(投与 0～52 週の総摂餌量) 	
30 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 0 週以降)^a ・脳 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 52 週) 	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 0 週以降)^a ・脳 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 52 週)
10 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 測定時点が不明なため、単回投与の影響と判断されなかった。

(7) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）

B6C3F₁ マウス（発がん性群：一群雌雄各 50 匹、衛星群：一群雌雄各 50 匹、うち投与 13、26、52 及び 72 週に一群雌雄各 10 匹を中間と殺）を用いた混餌投与（原体：0、3、10、100 及び 1,000 ppm：平均検体摂取量は表 37 参照）による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

表 37 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		3 ppm	10 ppm	100 ppm	1,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.376	1.45	12.6	134
	雌	0.454	1.51	13.1	144

各投与群で認められた毒性所見は表 38 に示されている。

100 ppm 投与群雄で肝細胞腺腫の発生頻度の有意な高値（対照群 16/50 例に対して 27/50 例）が認められたが、用量相関性がないことから、投与の影響とは考えられなかった。ほかに、検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、100 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 10 ppm（雄：1.45 mg/kg 体重/日、雌：1.51 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 5、50、85）

表 38-1 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量及び飲水量減少(投与 1 週以降)[§] ・AST、ALT 及び BUN 増加 ・Glu 減少 ・脳絶対及び比重量¹⁰増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量及び飲水量減少(投与 1 週以降)[§] ・AST 増加 ・Glu 及び Alb 減少 ・脳絶対及び比重量増加
100 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 13 週以降) ・T.Chol 増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 13 週以降) ・T.Chol 増加
10 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

§：統計学的有意差はないが、検体投与の影響と判断した。

表 38-2 1年間慢性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
1,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量及び飲水量減少(投与 1 週以降)[§] ・Glu 減少 ・脳絶対及び比重量増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制(投与 1 週以降) ・摂餌量及び飲水量減少(投与 1 週以降)[§] ・AST 増加 ・Glu 及び Alb 減少 ・脳絶対及び比重量増加
100 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 13 週以降) ・T.Chol 増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・赤血球及び脳 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 13 週以降) ・T.Chol 増加
10 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

§：統計学的有意差はないが、検体投与の影響と判断した。

¹⁰ 体重比重量のことを比重量という（以下同じ）。

(8) 18 か月間発がん性試験 (マウス)

ICR マウス (一群雌雄各 50 匹) を用いた混餌投与 (原体 : 0、30、100 及び 200 ppm、試験開始から 2 週間は 0、10、30 及び 100 ppm : 平均検体摂取量は表 39 参照) による 18 か月間発がん性試験が実施された。本試験において、血液学的及び血液生化学的検査並びに赤血球及び脳 ChE 活性測定は実施されなかった。

表 39 18 か月間発がん性試験 (マウス) の平均検体摂取量

投与群		30 ppm	100 ppm	200 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.10	10.8	21.5
	雌	3.69	12.0	24.4

各投与群で認められた毒性所見は表 40 に示されている。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、100 ppm 以上投与群の雄及び 200 ppm 投与群の雌で心絶対及び比重量減少等が認められたことから、無毒性量は雄で 30 ppm (3.10 mg/kg 体重/日)、雌で 100 ppm (12.0 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。(参照 5、51、85)

表 40 18 か月間発がん性試験 (マウス) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	・副腎絶対及び比重量増加	・心絶対及び比重量減少 ・副腎絶対及び比重量増加
100 ppm 以上	・心絶対及び比重量減少	100 ppm 以下 毒性所見なし
30 ppm	毒性所見なし	

9. 神経毒性試験

(1) 急性神経毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 12~13 匹) を用いた単回強制経口投与 [原体 : 0、12.5 (雄のみ)、50、200 及び 800 (雌のみ) mg/kg 体重、溶媒 : コーン油] による急性神経毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

結果は表 41 に示されている。

本試験において、50 mg/kg 体重以上投与群の雌雄で振戦等の神経行動学的症状が認められたことから、急性神経毒性に対する無毒性量は雄で 12.5 mg/kg 体重、雌で 50 mg/kg 体重未満であると考えられた。(参照 5、35、85)

表 41 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
800 mg/kg 体重		・腹臥位、耳介反射低下及び前肢握力低下(投与 0.75～1 時間後)
200 mg/kg 体重以上	・体重増加抑制(投与 7 日以降) ・排便及び排尿減少、赤色流涎、伸筋伸展減少及び後肢握力低下(投与 1～1.25 時間後)	・縮瞳、流涎、痛覚反応低下(つま先及び尾)、視覚位置反応低下、受動姿勢延長、空中正向反射消失及び後肢握力低下(投与 0.75～1 時間後)
50 mg/kg 体重以上	・腹臥位、振戦、立ち上がり減少、歩行不能、運動量減少、覚醒減少、縮瞳、流涎、痛覚反応低下(つま先及び尾)、耳介反射低下、視覚位置反応低下、受動姿勢延長、空中正向反射消失、前肢握力低下及び体温低下(投与 1～1.25 時間後)	・振戦、立ち上がり減少、歩行失調、歩行不能、運動量減少、覚醒減少及び体温低下(投与 0.75～1 時間後)
12.5 mg/kg 体重	毒性所見なし	

/: 実施せず

(2) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）①

白色レグホン種ニワトリ（投与群：雌 16 羽、陽性対照群：雌 6 羽）を用いた反復強制経口投与（原体：0 及び 500 mg/kg 体重、溶媒：Sorpil 355 水溶液、3 週間間隔で 2 回）による急性遅発性神経毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

検体投与群では、1 回目の投与 1～2 日後に 5 例が死亡した。投与後、自発運動低下、運動失調、呼吸不規則等の急性中毒症状が発現したが、遅発性神経毒性を示す症状は認められず、神経病理組織学的検査においても検体投与の影響は認められなかったことから、本剤は急性遅発性神経毒性を誘発しないと考えられた。（参照 5、36、85）

(3) 急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）②

白色レグホン種ニワトリ（投与群及び陽性対照群：雌 16 羽、溶媒対照群：雌 10 羽）を用いた反復強制経口投与（原体：0 及び 500 mg/kg 体重、溶媒：10%Tween80、3 週間間隔で 2 回）による急性遅発性神経毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

検体投与群では、各投与後に 3 例ずつ計 6 例が死亡した。投与後、自発運動低下、運動失調、呼吸不規則等の急性中毒症状が発現したが、遅発性神経毒性を示す症状は認められず、神経病理組織学的検査においても、検体投与の影響は認められなかったことから、本剤は急性遅発性神経毒性を誘発しないと考えられた。（参照 5、37、85）

(4) 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）

SD ラット（主群：一群雌雄各 12 匹、衛星群：一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌投与（原体：0、6、20、60 及び 200 ppm：検体摂取量は表 42 参照）による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

表 42 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の検体摂取量

投与群		6 ppm	20 ppm	60 ppm	200 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.40	1.32	3.99	13.8
	雌	0.46	1.56	4.85	17.6

各投与群で認められた毒性所見は表 43 に示されている。

肉眼的病理学及び神経病理学的検査結果並びにグリア線維性酸性蛋白質量に対する検体投与の影響は認められなかった。

本試験において、60 ppm 以上投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたことから、亜急性神経毒性に対する無毒性量は雌雄とも 20 ppm（雄：1.32 mg/kg 体重/日、雌：1.56 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5、45、85）

表 43 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
200 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重増加抑制(投与 1 週以降) ・ 摂餌量減少(投与 0～7 日) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前肢(投与 3 週)及び後肢(投与 7 週)握力の低下 ・ 摂餌量減少(投与 0～7、7～14 日)
60 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)(投与 4 週以降) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重増加抑制^a ・ 赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)(投与 4 週以降)
20 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

^a：60 ppm 投与群では投与 1 週、200 ppm 投与群では投与 1 週以降

(5) 28日間亜急性遅発性神経毒性試験（ニワトリ）

白色レグホン種ニワトリ（一群雌 8 羽）を用いた強制経口投与（原体：0、16.7 及び 33.4 mg/kg 体重/日、溶媒：10%Tween80）による 28 日間亜急性遅発性神経毒性試験が実施された。なお、最終投与後 3 週間の休薬期間が設けられた。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

坐骨神経の病理学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

16.7 mg/kg 体重/日以上投与群で体重減少及び自発運動低下が、33.4 mg/kg 体重/日投与群で振戦、歩行性運動失調、食欲減退等が観察されたが、いずれも

1～2週間後には消失した。高用量群の1羽が5日目に死亡した。

本試験における一般毒性に対する無毒性量は、16.7 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。亜急性遅発性神経毒性は認められなかった。（参照 5、36、85）

10. 生殖発生毒性試験

(1) 2世代繁殖試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌投与（原体：0、10、40 及び 120 ppm：平均検体摂取量は表 44 参照）による 2 世代繁殖試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

表 44 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	40 ppm	120 ppm	
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	0.7	2.7	8.0
		雌	0.7	3.1	9.6
	F ₁ 世代	雄	0.7	2.8	8.8
		雌	0.8	3.3	11.1

各投与群で認められた毒性所見は表 45 に示されている。

本試験において、親動物では 120 ppm 投与群の雄及び 40 ppm 以上投与群の雌、児動物では 120 ppm 投与群で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は親動物の雄で 40 ppm（P 雄：2.7 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：2.8 mg/kg 体重/日）、雌で 10 ppm（P 雌：0.7 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：0.8 mg/kg 体重/日）、児動物で 40 ppm（P 雄：2.7 mg/kg 体重/日、P 雌：3.1 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：2.8 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：3.3 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 5、52、85）

表 45 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群		親：P、児：F ₁		親：F ₁ 、児：F ₂	
		雄	雌	雄	雌
親動物	120 ppm	・体重増加抑制 (投与1~8日以降)	・体重増加抑制 (投与1~8日以降) ・摂餌量減少(妊娠0~6日)	・体重増加抑制	・軟便又は液状便 ・振戦
	40 ppm 以上	40 ppm 以下 毒性所見なし	40 ppm 以下 毒性所見なし	40 ppm 以下 毒性所見なし	・体重増加抑制 ・摂餌量減少 毒性所見なし
	10 ppm				
児動物	120 ppm	・体重増加抑制 ・死亡児数増加 ・4日生存率低下 ・離乳率低下 ・一般状態悪化(衰弱、消瘦、体温下降、振戦、哺乳しない、腹部の汚れ)		・体重増加抑制 ・死亡児数増加 ・4日生存率低下 ・離乳率低下 ・一般状態悪化(衰弱、体温下降、哺乳しない、蒼白化)	
	40 ppm 以下	毒性所見なし		毒性所見なし	

(2) 1 世代繁殖試験（ラット）

In vitro 試験及び *in vivo* 試験においてフェニトロチオンの抗アンドロゲン作用が報告されている¹¹ことから、ラットの生殖能及び出生児の成育に及ぼす影響について詳細に検索する目的で、SD ラット（P 世代：一群雌雄各 12 匹、F₁ 世代：一群雌雄各 20 匹）を用いた混餌投与（原体：0、10、20 及び 60 ppm：平均検体摂取量は表 46 参照）による 1 世代繁殖試験が実施された。なお、F₁ 世代は離乳時から 10 週齢までの 7 週間飼育された。本試験においては、脳 ChE 活性が P 世代の投与終了時に測定され、赤血球 ChE 活性は測定されなかった。

表 46 1 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群			10 ppm	20 ppm	60 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	0.64	1.28	3.81
		雌	0.71	1.38	4.26
	F ₁ 世代	雄	0.87	1.75	5.57
		雌	0.87	1.82	5.58

抗アンドロゲン作用も含め、内分泌かく乱作用に感受性の高い指標に対しても影響は認められなかった。

本試験において、親動物の雄及び児動物ではいずれの投与群でも検体投与の

¹¹ Tamura, H. *et al.*, Androgen receptor antagonism by the organophosphate insecticide fenitrothion, *Toxicol., Sci.*, 60, 56-62 (2001)ほか

影響が認められず、親動物の雌では 60 ppm 投与群で投与終了時に脳 ChE 活性阻害 (20%以上) が認められたことから、無毒性量は親動物の雄で本試験の最高用量 60 ppm (3.81 mg/kg 体重/日)、雌で 20 ppm (1.38 mg/kg 体重/日)、児動物で本試験の最高用量 60 ppm (F₁雄: 5.57 mg/kg 体重/日、F₁雌: 5.58 mg/kg 体重/日) であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。(参照 5、53、85)

(3) 3 世代繁殖試験 (ラット) <参考資料¹²⁾>

SD ラット [F_{1a} 離乳まで: 一群雄 15 匹、雌 30 匹 (対照群のみ雄 20 匹、雌 40 匹)、P 世代の 2 回目交配以降: 一群雄 10 匹、雌 20 匹] を用いた混餌投与 (原体: F_{1a} 離乳まで: 0、10、30 及び 150 ppm、以降: 0、10、30 及び 100 ppm: 平均検体摂取量は表 47 参照) による 3 世代繁殖試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

表 47 3 世代繁殖試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群			10 ppm	30 ppm	150/100 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	0.622	1.79	9.63
		雌	0.740	2.24	13.5
	F ₁ 世代	雄	0.665	2.02	6.85
		雌	0.760	2.28	8.51
	F ₂ 世代	雄	0.774	2.20	7.74
		雌	0.879	2.52	9.05

各投与群で認められた毒性所見は表 48 に示されている。(参照 5、54、85)

表 48 3 世代繁殖試験 (ラット) で認められた毒性所見

投与群		親: P、児: F ₁		親: F ₁ 、児: F ₂		親: F ₂ 、児: F ₃	
		雄	雌	雄	雌	雄	雌
親動物	150/100 ppm	・体重増加抑制 (投与 4 週以降) [§]	・体重増加抑制 (投与 4 週以降) [§]	・体重増加抑制 [§]	・体重増加抑制 [§]	毒性所見なし	毒性所見なし
	30 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし		
児動物	150/100 ppm	・低体重 ・離乳率低下		・低体重 ・離乳率低下		・低体重 [§] ・離乳率低下	
	30 ppm 以下	毒性所見なし		毒性所見なし		毒性所見なし	

§: 統計学的有意差はないが、検体投与の影響と判断した。

(4) 発生毒性試験（ラット）①

SD ラット（一群雌 24 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口投与（原体：0、3、8 及び 25 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）して、発生毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

各投与群で認められた毒性所見は表 49 に示されている。

本試験において、母動物では 25 mg/kg 体重/日投与群で体重増加抑制等が認められ、胎児ではいずれの投与群でも検体投与の影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物で 8 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 25 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 5、56、85）

表 49 発生毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児
25 mg/kg 体重/日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重増加抑制(妊娠 6～10 日以降) ・ 振戦、粗毛、削瘦、鼻汁及び尿汚れ(妊娠 9 日以降) 	25 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし
8 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし	

(5) 発生毒性試験（ラット）②<参考資料¹³>

SD ラット（帝王切開群：一群雌 18 匹、自然分娩群：一群雌 5～8 匹）の妊娠 9～14 日に強制経口投与（原体：0、2、7 及び 20 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）して、発生毒性試験が実施された。なお、自然分娩群の児動物は生後 6 週間にわたって観察された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

各投与群で認められた毒性所見は表 50 に示されている。（参照 5、55、85）

表 50 発生毒性試験（ラット）②で認められた毒性所見

投与群	母動物	胎児	出生児
20 mg/kg 体重/日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重増加抑制(妊娠 10 日以降) ・ 立毛、運動失調、尿失禁(妊娠 12 日以降) ・ 振戦、眼球突出及び興奮(妊娠 14 日以降) 	20 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし	・ 出生時における低体重(雌雄)
7 mg/kg 体重/日以下	毒性所見なし		毒性所見なし

¹² 世代により用量設定が異なる試験であったことから、参考資料とした。

¹³ 投与期間が器官形成期に十分対応していないことから、参考資料とした。

(6) 発生毒性試験（マウス）＜参考資料¹⁴＞

ICR マウス（帝王切開群：一群雌 19～20 匹、自然分娩群：一群雌 6～7 匹）の妊娠 7～12 日に強制経口投与（原体：0、20、70 及び 200 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）して、発生毒性試験が実施された。赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

本試験において、いずれの投与群でも検体投与の影響は認められなかった。（参照 5、55、85）

(7) 発生毒性試験（ウサギ）①

NZW ウサギ（一群雌 16 匹）の妊娠 7～19 日に強制経口投与（原体：0、3、10 及び 30 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）して、発生毒性試験が実施された。赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

本試験において、30 mg/kg 体重/日投与群の母動物で自発運動低下、運動失調、流涎、呼吸困難及び振戦（妊娠 9 日以降）、死亡（妊娠 10～18 日）、流産（妊娠 22～29 日）並びに体重増加抑制（妊娠 7～13 日）が認められ、胎児ではいずれの投与群でも検体投与の影響は認められなかったことから、無毒量は母動物で 10 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 30 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 5、57、85）

(8) 発生毒性試験（ウサギ）②＜参考資料¹⁵＞

NZW ウサギ（一群雌 17 匹、対照群 22 匹）の妊娠 6～18 日にカプセル経口投与（原体：0、0.3 及び 1.0 mg/kg 体重/日）して、発生毒性試験が実施された。

1.0 mg/kg 体重/日投与群の母動物 1 例で全胚の後期吸収が認められ、同投与群で流産 1 例が認められたが、いずれも検体投与との関連性は不明である。

1.0 mg/kg 体重/日投与群（32%）を除けば、胸骨の不完全骨化は対照群と差は認められなかったが、胸骨の未骨化は用量相関的に増加する（対照群：2.7%、0.3 mg/kg 体重/日投与群：12.7%及び 1.0 mg/kg 体重/日投与群：26%）傾向が認められた。（参照 89）

1 1. 遺伝毒性試験

フェニトロチオン（原体）の細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、ラット肝細胞を用いた UDS 試験、マウス胚細胞を用いた姉妹染色分体交換試験、チャイニーズハムスター肺由来細胞（V79）を用いた遺伝子突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞（CHO）を用いた染色体異常試験、マウス

¹⁴ 投与期間が器官形成期に十分対応していないことから、参考資料とした。

¹⁵ 2 用量で実施された試験であることから、参考資料とした。

を用いた復帰突然変異試験（宿主経由）、ラットを用いた *in vivo/in vitro* 肝 UDS 試験、ラット及びマウスの骨髄細胞を用いた染色体異常誘発性試験、マウスを用いた小核試験並びにラット及びマウスを用いた優性致死試験が実施された。

結果は表 51 に示されている。

試験の中には実施年代の古いものもあり、評価の難しいものもみられる。

一部の細菌を用いた復帰突然変異試験で、弱い陽性が TA100 株で認められているが、TA100 株がもつニトロレダクターゼに起因するものと推定される。このことは、微生物を用いた DNA 修復試験及びチャイニーズハムスター細胞を用いた遺伝子突然変異試験が陰性であったことによっても裏付けられている。

ラットの初代培養肝細胞を用いた *in vitro* UDS 試験において、細胞毒性がみられる用量で弱い陽性が報告されているが、ラットを用いた *in vivo/in vitro* 肝 UDS 試験で陰性であったことから、問題はないものと考えた。

染色体異常試験に関しては、ほ乳類培養細胞を用いた試験で陰性であり、*in vivo* 試験においても染色体異常誘発性は認められていない。更に、次世代への影響をみたラット及びマウスを用いた優性致死試験の結果も陰性であった。

以上を総合的に評価すると、フェニトロチオンには生体において問題となる遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 5、58～70、85）

表 51 遺伝毒性試験概要（原体）

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	DNA 修復試験 <i>Escherichia coli</i> (W3623、W3623 <i>polA</i> 、 W3623 <i>uvrA</i> 、 W3623 <i>recA</i> 株) <i>Bacillus subtilis</i> (H17、M45 <i>recA</i> 株) <i>Salmonella typhimurium</i> (TA1978、TA1538 <i>uvrB</i> 株)	100 µg～10 mg/ディスク	陰性
	DNA 修復試験 <i>B. subtilis</i> (H17、M45 株)	1%～100 %	陰性
	復帰突然変異試験 <i>B. subtilis</i> (W168 株) <i>E. coli</i> (W3623、W3102 株) <i>S. typhimurium</i> (TA1535、TA1536、TA1537 及び TA1538 株)	10 µg～10 mg/ディスク 10 µg～100 µg/mL [接触処理(17 時間)]	陰性
	復帰突然変異試験 <i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 及び TA1538 株) <i>E. coli</i> (WP2 <i>hcr</i> 株)	10～5,000 µg/プレート (+/-S9)	TA100 (+/-S9)で 弱い陽性 陰性

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA100、TA100 <i>nit</i> -)	①10~1,000 µg/プレート (+/-S9) ②*100~2,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
UDS 試験	初代培養肝細胞 (雄 SD ラット由来)	0.24~30 µg/mL (20 時間処理)	弱い陽性
遺伝子突然変異試験	チャイニーズハムスター 肺由来細胞(V79) (<i>HGPRT</i> 遺伝子)	10、30、100、300 µmol/L(+/-S9)	陰性
染色体異常試験	チャイニーズハムスター 卵巣由来細胞(CHO-K1)	3~30 µg/mL(-S9) (8、16 及び 24 時間処理後標本作製) 75~300 µg/mL(+S9) (2 時間処理、14 又は 22 時間培養後標本作製)	陰性
姉妹染色分体交換試験	ICR マウス(初代培養胚細胞)	10 ⁻⁵ 、5×10 ⁻⁵ 、10 ⁻⁴ mol/L (+/-S9)(3 時間処理)	陰性
宿主経路	復帰突然変異試験 ICR マウス <i>E. coli</i> (W3623、W3623 <i>poIA</i> 、 W3623 <i>uvrA</i> 、W3623 <i>recA</i> 株)(腹腔内挿入)	500 mg/kg 体重 (単回経口及び筋注投与) 1,000 mg/kg 体重 (単回筋注投与)	陰性
<i>in vivo</i> / <i>in vitro</i>	UDS 試験 SD ラット(分離肝細胞) (一群雄 3 匹)	300 mg/kg 体重 (単回経口投与)	陰性
<i>in vivo</i>	染色体異常誘発試験 SD ラット(骨髄細胞) (一群雄 6 匹)	100、200 及び 400 mg/kg 体重 (単回経口投与、投与 6、24 及び 48 時間後標本作製) 20、40 及び 80 mg/kg 体重/日 (5 日間経口投与、最終投与 6 時間後標本作製)	陰性
	染色体異常誘発試験 ICR マウス(骨髄細胞) (一群雄 4 匹)	50、200 及び 850 mg/kg 体重 (単回腹腔内投与、投与 24 時間後標本作製、850 mg/kg 体重投与群は投与 6、24 及び 48 時間後標本作製)	陰性
	染色体異常誘発試験 ICR マウス(骨髄細胞) (一群雄 6 匹)	200、400 及び 800 mg/kg 体重 (単回腹腔内投与、投与 6、24 及び 48 時間後標本作製)	陰性
	小核試験 ICR マウス(骨髄細胞) (一群雌雄各 6 匹)	200、400 及び 800 mg/kg 体重 (単回腹腔内投与、投与 24 時間後標本作製)	陰性
	優性致死試験 SD ラット (一群雄 11 匹)	2、7 及び 20 mg/kg 体重/日(5 日間経口投与)	陰性

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
優性致死試験	ICR マウス (一群雄 12 匹)	20 及び 200 mg/kg 体重/日(5 日間経口投与)	陰性

注) +/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

* : フェニトロチオン標準品を使用

1 2. 経皮投与、吸入ばく露等試験

(1) 急性毒性試験（経皮投与、腹腔内投与、皮下投与及び吸入ばく露）

フェニトロチオン原体のラット、マウス及びイヌを用いた急性毒性試験が実施された。

結果は表 52 に示されている。（参照 5、24～32、85）

表 52 急性毒性試験概要
(経皮投与、腹腔内投与、皮下投与及び吸入ばく露、原体)

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経皮	SD ラット 雌雄各 8 匹	890	1,200	攣縮、呼吸促迫、反射亢進、眼球突出、尿失禁及び興奮 雌雄：625 mg/kg 体重以上で死亡例
	SD ラット ^a 雌雄各 10 匹	2,700	約 5,000	自発運動低下、呼吸不規則、呼吸困難、運動失調、流涎、振戦、攣縮、眼球突出、立毛及び流涙 雌雄：1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
	Wistar ラット ^a 雌雄各 10 匹	1,260	1,910	眼瞼への血痕、呼吸微弱、間代性痙攣及び体温降下 雄：523 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：1,481 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス 雌雄各 8 匹	>2,500	>2,500	症状及び死亡例なし
	dd マウス ^a 雌雄各 8 匹	>5,000	>5,000	症状及び死亡例なし
腹腔内 ^b	SD ラット 雌雄各 8 匹	148	461	攣縮、振戦、運動失調、血涙、流涎、眼球突出及び尿失禁 雄：102 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：280 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス 雌雄各 8 匹	464	530	呼吸促進、攣縮、振戦、挙尾、流涎、流涎及び一過性の呼吸深大 雌雄：385 mg/kg 体重以上で死亡例

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
皮下 ^b	SD ラット 雌雄各 8 匹	840	1,300	攣縮、振戦、運動失調、血涙、流涎、 眼球突出、尿失禁及び反射亢進 雄：250 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：715 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス 雌雄各 8 匹	1,350	1,530	自発運動低下、呼吸深大、四肢の運 動失調、流涎、攣縮、流涎、振戦及 び眼脂分泌 雄：750 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：1,130 mg/kg 体重以上で死亡例
吸入	SD ラット ^c 雌雄各 8 匹	LC ₅₀ (mg/L)		立毛、流涎、尿失禁、流涎、振戦、 攣縮、眼球突出、体重減少、呼吸速 迫及び呼吸困難 雄：0.186 mg/L で死亡例
	SD ラット ^d 雌雄各 10 匹	>2.21	>2.21	呼吸不規則、呼吸深大、鼻汁、攣縮、 間欠性振戦、自発運動低下、流涎、 流涎及び尿失禁 雄のみ：興奮、強直性痙攣、歩行失 調及び軟便 雄：2.21 mg/L で死亡例

注) 溶媒として、^aはコーン油、^bは 10%Tween80 が使用された。

^c: 2、4 及び 8 時間ばく露 (ミスト)

^d: 4 時間ばく露 (ミスト)

(2) 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚・吸入に対する感作性試験

① 眼・皮膚に対する刺激性試験 (ウサギ) 及び皮膚感作性試験 (モルモット)

フェニトロチオン原体の NZW ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施され、軽度の眼刺激性が認められたが、皮膚刺激性は認められなかった。
(参照 5、38、85)

フェニトロチオン原体の日本白色ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施され、眼及び皮膚に対して刺激性を示さなかった。(参照 5、39、85)

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Landsteiner&Draize 法) が実施され、皮膚感作性は陰性であると判断された。(参照 5、40、85)

② 吸入による感作性試験（モルモット）

Hartley モルモットを用いた吸入による感作性試験が実施された。試験期間を通じて、呼吸困難等の中毒症状は観察されなかった。フェニトロチオンは顕著な ChE 活性阻害を来す気中濃度において、吸入によるアレルギー性喘息惹起作用を有しないと考えられた。（参照 5、41、85）

（3）22 又は 23 日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）

NZW ウサギ（一群雌雄各 5 匹）を用いた経皮投与（原体：0、10、50、250 及び 500 mg/kg 体重/日）による 22 又は 23 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。500 mg/kg 体重/日投与群の経皮投与期間は 9 日間とされた。

500 mg/kg 体重/日投与群では嗜眠、軟便、下痢及び肛門性器部分の汚れ並びに全身状態の悪化が認められたことから、投与開始 10 日後までに全ての動物がと殺された。

250 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で赤血球及び脳 ChE 活性阻害（20%以上）が認められたことから、本試験の無毒性量は雌雄とも 50 mg/kg 体重/日と考えられた。（参照 86）

（4）28 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 16 匹）を用いた吸入ばく露（原体：0、0.015 及び 0.062 mg/L、1 日 2 時間、毎週 6 日間）及び SD ラット（一群雌雄各 24 匹）を用いた吸入ばく露（原体：0、0.002、0.007 mg/L、溶媒：ケロシン-キシレン、1 日 2 時間・毎週 5 日間）による 28 日間亜急性吸入毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

各投与群で認められた毒性所見は表 53 に示されている。

本試験において、0.062 mg/L ばく露群の雄及び 0.015 mg/L 以上ばく露群の雌で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたことから、無毒性量は雄で 0.015 mg/L（0.72 mg/kg 体重/日）、雌で 0.007 mg/L（0.336 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5、44、85）

表 53 28 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群 ^a	雄	雌
0.062 mg/L (毎週 6 日間ばく露)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	
0.015 mg/L 以上 (毎週 6 日間ばく露)	0.015 mg/mL で 毒性所見なし	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上) ・卵巣絶対及び比重量減少
0.007 mg/L 以下 (毎週 5 日間ばく露)	毒性所見なし	毒性所見なし

^a：1 日 2 時間ばく露（ミスト）

(5) 28日間亜急性吸入毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 15 匹）を用いた吸入ばく露（原体：0、0.015 及び 0.062 mg/L、1 日 2 時間・毎週 6 日間）及び ICR マウス（一群雌雄各 94 匹）を用いた吸入ばく露（原体：0、0.002、0.007 mg/L、1 日 2 時間・毎週 5 日間）による 28 日間亜急性吸入毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 54 に示されている。

本試験において、0.015 mg/L 以上ばく露群の雄で A/G 比低下が、0.062 mg/L ばく露群の雌で脳 ChE 活性阻害が認められたことから、無毒性量は雄で 0.007 mg/L、雌で 0.015 mg/L であると考えられた。（参照 5、44、85）

表 54 28 日間亜急性吸入毒性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
0.062 mg/L (毎週 6 日間ばく露)	・脳 ChE 活性阻害(20%以上)	・脳 ChE 活性阻害(20%以上)
0.015 mg/L 以上 (毎週 6 日間ばく露)	・ A/G 比低下	0.015 mg/L で 毒性所見なし
0.007 mg/L 以下 (毎週 5 日間ばく露)	毒性所見なし	毒性所見なし

13. その他の試験

(1) 急性眼毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた単回強制経口投与（原体：雄：0、20 及び 200 mg/kg 体重、雌：0、40 及び 400 mg/kg 体重、溶媒：コーン油）による急性眼毒性試験が実施された。本試験において、赤血球 ChE 活性が測定された。

各投与群で認められた毒性所見は表 55 に示されている。

200 mg/kg 体重投与群の雄で網膜電図の a 波頂点の増加が、400 mg/kg 体重投与群の雌で b 波の頂点潜時短縮が認められたが、いずれも対照群の変動範囲にあり検体投与と関係のない偶発的変化と考えられた。

著明な ChE 活性阻害及び毒性症状の現れる量を投与しても、網膜電図に検体投与の影響はなかったと考えられた。（参照 5、71、85）

表 55 急性眼毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
400 mg/kg 体重		<ul style="list-style-type: none"> ・眼脂増加(投与 1 日後以降) ・流涎(投与 1 時間後以降) ・削瘦(投与 4 日後以降) ・流涙(投与 29 日後) ・体重増加抑制(投与 4 日後以降) ・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 5~15 日)
200 mg/kg 体重	<ul style="list-style-type: none"> ・死亡(1 例)(投与 1 時間後) ・自発運動低下(投与 1 時間後以降) ・流涎(投与 1 時間後以降) ・赤色眼脂(投与 1 時間後以降) ・体重増加抑制(投与 4 日後以降) ・赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)(投与 5~15 日) 	
40 mg/kg 体重以上		<ul style="list-style-type: none"> ・筋肉線維性収縮(投与 1 時間後以降) ・立毛¹⁾(投与 15 日後)
20 mg/kg 体重以上	<ul style="list-style-type: none"> ・筋肉線維性収縮(投与 1 時間後以降) ・眼脂増加(投与 1 時間後以降) 	

/: 実施せず

¹⁾: 400 mg/kg 体重投与群では投与 2 日後以降

(2) 90 日間亜急性眼毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌投与（原体：0、2.5、5、10 及び 30 ppm：平均検体摂取量は表 56 参照）による 90 日間亜急性眼毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

表 56 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		2.5 ppm	5 ppm	10 ppm	30 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.140	0.282	0.570	1.70
	雌	0.169	0.331	0.648	1.96

投与終了時において、30 ppm 投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）が認められた。検体投与の影響は網膜電図に比し ChE 活性においてより鋭敏に認められ、また、ChE 活性が明瞭に阻害される 30 ppm 投与群においても網膜電図及び電子顕微鏡的観察に毒性学的影響はなかった。（参照 5、72、85）

(3) 急性投与試験 (ヒト)

24 名のボランティア (性別及び年齢不明) に、フェニトロチオンを 0.042 及び 0.33 mg/kg 体重の用量で単回経口投与して、急性投与試験が実施された。

いずれの投与群においても、コリン作動性の症状は認められなかった。投与後 24 時間で、代謝物 G が尿中に 50%TAR (0.33 mg/kg 体重投与群) ~ 70%TAR (0.042 mg/kg 体重投与群) 排泄された。投与 6 及び 24 時間後において赤血球 ChE 活性阻害は認められなかった。

また、5 名 (性別及び年齢不明) に、フェニトロチオンを 0.04~0.08 mg/kg 体重の用量で 24 時間ごとに 4 回経口投与した結果、投与 12 時間以内に代謝物 G の大部分が尿中に排泄された。コリン作動性の症状は認められず、赤血球 ChE 活性にも影響はみられなかった。

本試験における無毒性量は 0.33 mg/kg 体重であると考えられた。(参照 75、89)

(4) 4 日間投与試験 (ヒト)¹⁶

ヒト (男性 8 名、女性 4 名、平均年齢 33 歳 ; 23~50 歳) に、低用量試験として原体 0.18 mg/kg 体重/日を 4 日間連続投与 (半量ずつ 12 時間間隔で午前と午後に分けてカプセル経口投与) し、その後最低 2 週間、最大 5 か月間の間隔を設けた後、高用量試験として、原体 0.36 mg/kg 体重/日を同様に 4 日間連続投与して、4 日間投与試験が実施された。本試験では、赤血球 ChE 活性への影響、薬物動態、尿中排泄、血液生化学的検査、血液学的検査及び臨床症状への影響が調査された。

血漿中薬物動態学的パラメータは表 57 に、代謝物 G の尿中排泄は表 58 に示されている。

フェニトロチオンは投与後速やかに吸収され、用量及び投与日数にかかわらず、 T_{max} は 1 時間、 $T_{1/2}$ は 2~3 時間であった。

いずれの投与量においても、フェニトロチオンは吸収後速やかに代謝物 G に代謝され、投与後 24 時間で 67%TAR~97%TAR が尿中に排泄された。

投与 1 及び 4 日の投与開始直前並びに投与 4、8 及び 16 (高用量試験のみ) 時間後に赤血球 ChE 活性が測定された結果、いずれの投与量においても ChE 活性に臨床的に問題になる阻害 (各人の試験前値に比し 20%以上) は認められなかった。

血液生化学的検査及び血液学的検査においても、検体投与の影響は認められなかった。

被験者 1 名が 0.18 mg/kg 体重/日の投与期間中に発汗及び腹痛のコリン様症状を訴えたが、赤血球 ChE 活性にはいずれの測定時にも異常は認められな

¹⁶ 本試験は、試験実施施設の人体実験常任倫理委員会による承認を受けている。

った。したがって、酵素活性阻害を伴わない本臨床症状の原因は不明であるが、本人が自覚しない程度の病的状態（風邪、軽度の感染等）の影響があった可能性もあり、検体投与の影響ではないと判断した。

以上から、フェニトロチオンは本試験での用量においてヒトに認め得る毒性をもたらさず、無毒性量は男女とも 0.36 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 5、73、85）

表 57 血漿中薬物動態学的パラメータ

投与量	0.18 mg/kg 体重/日		0.36 mg/kg 体重/日	
	投与 1 日	投与 4 日	投与 1 日	投与 4 日
C _{max} (ng/mL)	0.54	0.84	1.77	7.7
T _{max} (min)	60	60	60	60
T _{1/2} (min)	120	180	120	130
AUC (min・μg/mL)	171	286	381	1,360

表 58 代謝物 G の尿中排泄

投与量	0.18 mg/kg 体重/日		0.36 mg/kg 体重/日	
	投与 1 日	投与 4 日	投与 1 日	投与 4 日
フェニトロチオンの平均経口摂取量(mg)	13	6.75	26.4	13.5
代謝物 G の平均排泄量(mg)	5.97	3.63	9.85	5.69
フェニトロチオン等量(mg)	10.8	6.56	17.8	10.3
24 時間排泄率(%)	83	97	67	76

(5) 酵素に対する影響

ラットにフェニトロチオンを 261 mg/kg 体重で投与すると、72 時間以内に肝臓及び精巣のシトクロム P450 活性の低下が生じ、結果として血清テストステロンの濃度が正常の 25%に減少したが、5 日後までに回復した。また、5.5 mg/kg 体重/日の用量で 30 日間投与した場合には、酵素活性に影響はなく、血清テストステロン濃度にも影響しなかった。（参照 75）

(6) 生化学的パラメータに対する影響

Wistar ラット(雄、匹数不明)にフェニトロチオンを 0、7.25 及び 14.5 mg/kg 体重/日で 28 日間強制経口投与した結果、14.5 mg/kg 体重/日投与群では、7 日後に血漿コルチコステロン及びグルコース濃度がそれぞれ 2.5 倍 (p<0.01) 及び 30%となり、2 週間後までに副腎重量が 1.35 倍 (p<0.05) に増加した。しかし、これらの変化は一過性で、試験終了時には対照群と同程度に回復した。同様な変化が他の用量でも認められたが、統計学的に有意な変化は認められなかった。（参照 75）

Ⅲ. 安全性に係る試験の概要（代謝物）

1. 急性毒性試験等

（1）急性毒性試験（経口投与、代謝物 B 及び G）

代謝物 B 及び G のラット、マウス及びモルモットを用いた急性毒性試験（経口投与）が実施された。

結果は表 59 に示されている。（参照 5、33、34、85）

表 59 急性毒性試験概要（経口投与、代謝物 B 及び G）

被験物質	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
代謝物 B	ラット(系統不明) ^a 雄(匹数不明)	24	/	呼吸困難、攣縮、間代性痙攣、流涎、血涙及び眼球突出 モルモットにおける症状はやや軽度
	マウス(系統不明) ^a 雌雄(匹数不明)	90	90	
	モルモット(系統不明) ^a 雄(匹数不明)	221	/	
代謝物 G	Wistar ラット ^b 雌雄各 5 匹	2,300	1,200	雄：呼吸深大、呼吸不規則又は促迫、歩行失調及び運動失調 雌：呼吸深大、呼吸不規則、運動失調、自発運動減少及び立毛 雌雄：1,000 mg/kg 体重以上で死亡例
	dd マウス ^b 雄各 8 匹	250	/	呼吸深大、歩行失調、運動失調及び軽度の振戦 雌雄：140 mg/kg 体重以上で死亡例

注) 溶媒として、aは蒸留水、bは10%アラビアゴム液が使用された。

/: 実施せず

（2）一般薬理試験（代謝物）

代謝物 B のラット、ウサギ、ネコ及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。

結果は表 60 に示されている。（参照 5、23、85）

表 60 一般薬理試験概要 (代謝物 B)

試験の種類	動物種 ^a	動物数/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要
角膜及び結膜に対する作用	ウサギ	雄匹数不明	0、0.1、1、10 (%) (点眼)	—	0.1 (%)	10%液で催涙及び結膜充血、1%以上で角膜及び結膜反射抑制、0.1%液で縮瞳
脳波	ウサギ、ネコ	雌雄匹数不明	0、 ≤ 1 、2 (静脈内)	1	2	2 mg/kg 体重で覚醒波出現
血圧	ウサギ、ネコ	雌雄匹数不明	0.1~0.3、0.5、1、5 (静脈内)	0.3	0.5	0.5 mg/kg 体重以上で血圧下降
心電図	ウサギ、ネコ	雌雄匹数不明	0、 ≤ 2 (静脈内)	2	—	影響なし
脳局所血流	ウサギ、ネコ	雌雄匹数不明	0、 ≤ 1 、2 (静脈内)	1	2	2 mg/kg 体重で頸動脈血流量及び脳局所血流増加
摘出心房	モルモット	雄匹数不明	$\leq 10^{-6} \sim 10^{-3}$ (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10^{-6} (mol/L)	10^{-5} (mol/L)	10^{-5} mol/L 以上で収縮及び拍動数抑制
摘出乳頭筋	モルモット	雄匹数不明	$\leq 10^{-6} \sim 10^{-3}$ (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10^{-6} (mol/L)	10^{-5} (mol/L)	10^{-5} mol/L 以上で収縮抑制
摘出耳殻血管	ウサギ	雄匹数不明	$10^{-5} \sim 10^{-2}$ (mol/L) (<i>in vitro</i>)	内壁適用： 10^{-2} (mol/L) 外壁適用： 10^{-3} (mol/L)	—	影響なし
摘出腸管	ウサギ	雄匹数不明	$\leq 10^{-7} \sim 10^{-3}$ (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10^{-7} (mol/L)	5×10^{-7} (mol/L)	5×10^{-7} mol/L 以上で振幅増大、 5×10^{-6} mol/L 以上で腸管収縮を惹起、ACh 収縮を増強
摘出腸管	モルモット	性別及び匹数不明	10^{-4} (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10^{-4} (mol/L)	—	影響なし
神経筋接合部	SDラット	雄匹数不明	$\leq 10^{-6} \sim 10^{-4}$ (mol/L) (<i>in vitro</i>)	10^{-6} (mol/L)	5×10^{-6} (mol/L)	5×10^{-6} mol/L 以上で神経刺激収縮を増強、 10^{-4} mol/L で一過性の増強後、抑制

注) いずれの試験においても、溶媒として Sorpol 1,200 が使用された。

a: ウサギ、ネコ、モルモットについては系統不明。

—: 最大無作用量又は最小作用量は設定できなかった。

2. 亜急性毒性試験（代謝物 B 及び G）

（1）6 か月間亜急性毒性試験（代謝物 B、ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌投与（代謝物 B：0、5、15 及び 50 ppm：平均検体摂取量は表 61 参照）による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性が測定された。

表 61 6 か月間亜急性毒性試験（代謝物 B、ラット）の平均検体摂取量

投与群		5 ppm	15 ppm	50 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.31	0.91	2.99
	雌	0.34	0.99	3.66

各投与群で認められた毒性所見は表 62 に示されている。

本試験において、50 ppm 投与群の雌雄で赤血球 ChE 活性阻害（20%以上）等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 15 ppm（雄：0.91 mg/kg 体重/日、雌：0.99 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5、42、85）

表 62 6 か月間亜急性毒性試験（代謝物 B、ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
50 ppm	・赤血球 ChE 活性阻害 (20%以上)(投与終了時)	・赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (20%以上)(投与終了時)
15 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

（2）6 か月間亜急性毒性試験（代謝物 G、ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌投与（代謝物 G：0、150、500 及び 1,500 ppm：平均検体摂取量は表 63 参照）による 6 か月間亜急性毒性試験が実施された。本試験において、赤血球及び脳 ChE 活性は測定されなかった。

表 63 6 か月間亜急性毒性試験（代謝物 G、ラット）の平均検体摂取量

投与群		150 ppm	500 ppm	1,500 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	9.23	30.7	94.7
	雌	10.1	32.8	101

本試験において、検体投与による影響は認められなかったことから、無毒性量は本試験の最高用量 1,500 ppm（雄：94.7 mg/kg 体重/日、雌：101 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 5、42、85）

3. 遺伝毒性試験（代謝物 B 及び G）

主として動物、植物、土壌及び水中由来の代謝物である B 及び G について細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験が実施された。

結果は表 64 に示されているとおり、いずれの試験においても陰性であった。（参照 5、58、85）

表 64 遺伝毒性試験概要（代謝物）

被験物質	試験	対象	処理濃度・投与量	結果
代謝物 B	DNA 修復試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3623 <i>polA</i> ⁻ 、 W3623 <i>uvrA</i> ⁻ 、W3623 <i>recA</i> ⁻ 株) <i>B. subtilis</i> (H17、M45 <i>recA</i> ⁻ 株)	10 mg/ディスク	陰性
	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3102 株)	100 µg/ディスク	陰性
代謝物 G	DNA 修復試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3623 <i>polA</i> ⁻ 、 W3623 <i>uvrA</i> ⁻ 、W3623 <i>recA</i> ⁻ 株) <i>B. subtilis</i> (H17、M45 <i>recA</i> ⁻ 株)	10 mg/ディスク	陰性
	復帰突然変異試験	<i>E. coli</i> (W3623、W3102 株)	100 µg/ディスク 100 µg 接触処理 (17 時間)	陰性

4. 経皮投与、吸入ばく露等試験

（1）急性毒性試験（静脈内投与及び腹腔内投与、代謝物 B 及び G）

代謝物 B 及び G のラット、マウス及びモルモットを用いた急性毒性試験（静脈内投与及び腹腔内投与）が実施された。

結果は表 65 に示されている。（参照 5、33、34、85）

表 65 急性毒性試験概要（静脈内投与及び腹腔内投与、代謝物 B 及び G）

被験物質	投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
			雄	雌	
代謝物 B	静脈内	ラット(系統不明) 雄(匹数不明)	3.3		呼吸困難、攣縮、間代性痙攣、流涎、血涙及び眼球突出 モルモットにおける症状はやや軽度 中毒症状発現は、経口投与に比べ速やか
		モルモット(系統不明) 雄(匹数不明)	32		
代謝物 G	腹腔内 ^a	dd マウス 雄各 10 匹	136		呼吸促進、振戦及び跳躍運動 雌雄：100 mg/kg 体重以上で死亡例

注) 溶媒として、^aは 10%アラビアゴム液が使用された。
/: 実施せず

IV. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて農薬及び動物用医薬品「フェニトロチオン」の食品健康影響評価を実施した。第3版の改訂に当たっては、厚生労働省から、作物残留試験（てんさい及びにら）、家畜代謝試験（ヤギ、ニワトリ及びうずら）、畜産物残留試験（ウシ及びニワトリ）の成績等が新たに提出された。

¹⁴C で標識したフェニトロチオンの植物代謝試験の結果、いずれの植物においても残留放射能の主要成分は代謝物 G、Gc 及び G のその他の抱合体であり、未変化のフェニトロチオンは僅かで、速やかに代謝されると考えられた。ほかに 10%TRR を超える代謝物は認められなかった。

フェニトロチオンを分析対象化合物とした作物残留試験の結果、可食部における最大残留値は、みかん（果皮）の 19.2 mg/kg であった。

¹⁴C で標識したフェニトロチオンの畜産動物（ヤギ、ニワトリ及びうずら）を用いた家畜代謝試験の結果、可食部において 10%TRR を超える代謝物として Ca、G、Gb、K 及び T が認められた。

畜産物残留試験において、経口投与では、畜産動物（ウシ及びニワトリ）の各臓器、乳汁及び卵中の残留量は僅かであり、乳汁中に未変化のフェニトロチオンに加えて、代謝物 C（最大 0.17 µg/mL）が認められた。噴霧投与（ウシ、ブタ及びニワトリ）では、フェニトロチオンの残留は主に皮膚及び脂肪でみられ、ニワトリの皮膚中で最大の残留（1.21 µg/g）が認められた。

¹⁴C で標識したフェニトロチオンのラットを用いた動物体内動態試験の結果、経口投与されたフェニトロチオンの体内吸収率は投与後 168 時間で少なくとも 86.0%と推定された。血中濃度は速やかに減少し、投与後 168 時間で 95%TAR 以上が尿及び糞中に排泄され、主に尿中に排泄された。臓器及び組織中残留放射能濃度は、T_{max} 付近では肝臓及び腎臓で高かったが速やかに減少し、特定の臓器及び組織への残留傾向は認められなかった。尿中の主要代謝物は低用量投与群では Gb であり、Ga 及び遊離の G がこれに続いた。高用量投与群では脱メチル体 E が多く、続いて代謝物 Gb であった。

魚介類におけるフェニトロチオンの最大推定残留値は 0.240 mg/kg であった。

各種毒性試験結果から、フェニトロチオン投与による影響として、主に ChE 活性阻害が認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遅発性神経毒性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。

なお、ヒトに対する 4 日間投与試験において 0.18~0.36 mg/kg 体重/日の経口摂取によって明確な毒性発現は認められなかった。

植物代謝試験及び家畜代謝試験の結果、10%TRR を超える代謝物として、植物では G、Gc 及び Gc 以外の G の抱合体、畜産動物の可食部では Ca、G、Gb、K 及び T が認められた。代謝物 G はラットにおいて認められていること並びに代謝物 Ca、K 及び T はヤギの乳汁中でのみ認められたが残留値は低い（0.004 µg/g 以下）ことから、農産物、畜産物及び魚介類中のばく露評価対象物質をフェニト

ロチオン（親化合物のみ）と設定した。

各試験における無毒性量等は表 66 に、単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等は表 67 にそれぞれ示されている。

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 0.49 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.0049 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、フェニトロチオンの単回経口投与により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ヒトにおける急性投与試験の 0.33 mg/kg 体重であったが、4 日間投与試験において無毒性量 0.36 mg/kg 体重/日が得られており、ヒトにおける無毒性量は 0.36 mg/kg 体重/日であると考えられた。したがって、ヒトにおける無毒性量 0.36 mg/kg 体重/日を根拠として、安全係数 10（種差:1、個体差:10）で除した 0.036 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

ADI	0.0049 mg/kg 体重/日
（ADI 設定根拠資料）	慢性毒性/発がん性併合試験
（動物種）	ラット
（期間）	2 年間
（投与方法）	混餌
（無毒性量）	0.49 mg/kg 体重/日
（安全係数）	100

ARfD	0.036 mg/kg 体重
（ARfD 設定根拠資料）	投与試験
（動物種）	ヒト
（期間）	4 日間
（投与方法）	カプセル経口
（無毒性量）	0.36 mg/kg 体重/日
（安全係数）	10

< 参考 >

JMPR（2007 年）

ADI	0.006 mg/kg 体重/日
（ADI 設定根拠資料）	亜急性毒性、慢性毒性/発がん性併合、亜急性眼毒性試験
（動物種）	ラット
（期間）	6 か月間、2 年間、90 日間

(投与方法)	混餌
(全体の無毒性量)	0.6 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD	0.04 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	投与試験
(動物種)	ヒト
(期間)	4 日間
(投与方法)	カプセル経口
(無毒性量)	0.36 mg/kg 体重/日
(安全係数)	10

(参照 87)

EFSA (2006 年)

ADI	0.005 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	0.5 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD	0.013 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	亜急性神経毒性試験
(動物種)	ラット
(期間)	90 日間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	1.32 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

(参照 76)

豪州 (1999 年)

ADI	0.002 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性試験
(動物種)	イヌ
(期間)	1 年間
(投与方法)	混餌
(無影響量)	0.2 mg/kg 体重/日

(安全係数) 100

ARfD 0.03 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料) 急性投与試験
(動物種) ヒト
(期間) 単回
(投与方法) 経口
(無影響量) 0.33 mg/kg 体重
(安全係数) 10

(参照 89)

米国 (2010 年)

cRfD 0.000125 mg/kg 体重/日
(cRfD 設定根拠資料) 慢性毒性試験
(動物種) イヌ
(期間) 1 年間
(投与方法) 混餌
(無毒性量) 0.125 mg/kg 体重/日
(不確実係数) 100
(FQPA¹⁷安全係数) 10

aRfD 0.00025 mg/kg 体重
(aRfD 設定根拠資料) 慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット)
(動物種) ラット
(期間) 22 か月
(投与方法) 混餌
(無毒性量) 0.25 mg/kg 体重/日
(不確実係数) 100
(FQPA 安全係数) 10

(参照 110)

¹⁷ Food Quality Protection Act (米国食品品質保護法) による係数

表 66 各試験における無毒性量等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	EFSA	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
ラット	6 か月間 亜急性 毒性試験	0、10、30、150 ppm	0.6	/	0.6 未満	雄：1.83 雌：0.64	雄：1.83 雌：0.64
		雄：0、0.59、1.83、9.16 雌：0、0.64、2.00、11.2	赤血球及び脳 ChE 活性阻害			雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)
	2 年間 慢性毒性 /発がん性 併合試験	0、10、30、100 ppm	0.5	0.5	/	雄：0.49 雌：0.62	雄：0.49 雌：0.62
		雄：0、0.49、1.45、5.05 雌：0、0.62、1.81、6.46	赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (発がん性は認め られない)	赤血球及び脳 ChE 活性阻害 (発がん性は認め られない)		雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) (発がん性は認め られない)	雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上) (発がん性は認め られない)
90 日間 亜急性 神経毒性 試験	0、6、20、60、200 ppm	1.32	1.32	/	雄：1.32 雌：1.56	雄：1.00~1.97 雌：1.27~1.99	
	雄：0、0.40、1.32、3.99、 13.8 雌：0、0.46、1.56、4.85、 17.6	体重増加抑制 赤血球及び脳 ChE 活性阻害	体重増加抑制 赤血球及び脳 ChE 活性阻害		雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)等	雌雄：赤血球及び 脳 ChE 活性阻害 (20%以上)	
2 世代	0、10、40、120 ppm	親動物：0.65	親動物：0.7	親動物	親動物	親動物 P 雄：0.7	

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録)
			JMPR	EFSA	豪州 ²⁾	食品安全委員会	
	繁殖試験	P 雄 : 0、0.7、2.7、8.0 P 雌 : 0、0.7、3.1、9.6 F ₁ 雄 : 0、0.7、2.8、8.8 F ₁ 雌 : 0、0.8、3.3、11.1	児動物 : 3.1	児動物 : 3.1	雄 : 0.65 雌 : 0.74 児動物 : 3.07	P 雄 : 2.7 P 雌 : 0.7 F ₁ 雄 : 2.8 F ₁ 雌 : 0.8 児動物 P 雄 : 2.7 P 雌 : 3.1 F ₁ 雄 : 2.8 F ₁ 雌 : 3.3	P 雌 : 0.7 F ₁ 雄 : 0.7 F ₁ 雌 : 0.8 児動物 P 雄 : 2.7 P 雌 : 3.1 F ₁ 雄 : 2.8 F ₁ 雌 : 3.3
			(繁殖能に対する影響は認められない)	親動物 : 体重増加量及び摂餌量減少 児動物 : 体重増加抑制、胎児生存率低下 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物 : 体重増加抑制 児動物 : 体重増加抑制、胎児生存率低下 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物及び児動物 雌雄 : 体重増加抑制等 (繁殖能に対する影響は認められない)	親動物及び児動物 雌雄 : 体重増加抑制等 (繁殖能に対する影響は認められない)
	1 世代繁殖試験	0、10、20、60 ppm P 雄 : 0、0.64、1.28、3.81 P 雌 : 0、0.71、1.38、4.26 F ₁ 雄 : 0、0.87、1.75、5.57 F ₁ 雌 : 0、0.87、1.82、5.58	/	/	/	親動物 : P 雄 : 3.81 P 雌 : 1.38 児動物 F ₁ 雄 : 5.57 F ₁ 雌 : 5.58 親動物 雄 : 毒性所見なし	親動物 : P 雄 : 1.28 P 雌 : 0.71 F ₁ 雄 : 1.75 F ₁ 雌 : 0.87 児動物 P 雄 : 3.81 P 雌 : 4.26 F ₁ 雄 : 5.57

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	EFSA	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
						雌：脳 ChE 活性 阻害(20%以上) 児動物：毒性所見 なし (繁殖能に対する 影響は認められ ない)	F ₁ 雌：5.58 親動物 雌雄：脳 ChE 活 性阻害(20%以上) 等 児動物：毒性所見 なし (繁殖能に対する 影響は認められ ない)
	発生毒性 試験①	0、3、8、25	母動物：8 胎児：25 (催奇形性は認め られない)	/	(催奇形性は認め られない)	母動物：8 胎児：25 母動物：体重増加 抑制等 胎児：毒性所見な し (催奇形性は認め られない)	母動物：8 胎児：25 母動物：体重増加 抑制等 胎児：毒性所見な し (催奇形性は認め られない)
マウス	2年間	0、3、10、100、1,000 ppm	1.4			雄：1.45	雄：1.44

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				参考 (農薬抄録)
			JMPR	EFSA	豪州 ²⁾	食品安全委員会	
	慢性毒性/ 発がん性 併合試験	雄:0、0.376、1.45、12.6、 134 雌:0、0.454、1.51、13.1、 144	(発がん性は認め られない)	(発がん性は認め られない)	(発がん性は認め られない)	雌: 1.51 雌雄: 赤血球 ChE 及び脳 ChE 活性 阻害(20%以上)等 (発がん性は認め られない)	雌: 1.51 雌雄: 赤血球 ChE 及び脳 ChE 活性 阻害(20%以上) (発がん性は認め られない)
	18 か月間 発がん性 試験	0、30、100、200 ppm 雄: 0、3.10、10.8、21.5 雌: 0、3.69、12.0、24.4	/	/	/	雄: 3.10 雌: 12.0 雌雄: 心臓絶対及 び比重量減少等 (発がん性は認め られない)	雄: 21.5 雌: 24.4 雌雄: 毒性所見な し (発がん性は認め られない)
ウサギ	6 か月間 亜急性 毒性試験	0、3、10	/	/	/	雄: - 雄: 赤血球 ChE 活 性阻害(20%以上)	NOAELの記載な し 赤血球 ChE 活性 阻害(20%以上) 血液像、肝及び腎 機能、脳は、外眼 筋神経終板など に対して特記す べき変化なし
	発生毒性 試験①	0、3、10、30	母動物: 10 胎児: 30	母動物: 10 胎児: 30		母動物: 10 胎児: 30	母動物: 10 胎児: 30

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	EFSA	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
				母動物：流産 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)		母動物：体重増加抑制等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)	母動物：振戦、流産等 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない)
イヌ	1年間慢性毒性試験①	0、5、10、50 ppm	1.6	/	0.2	雄：1.57 雌：1.59	雄：0.33 雌：1.59
		雄：0、0.17、0.33、1.57 雌：0、0.15、0.29、1.59				血漿 ChE 活性阻害	雌雄：毒性所見なし
	2年間慢性毒性試験	0、30、100、200 ppm	/	/	/	雄：0.98 雌：1.08	雄：0.98 雌：1.08
		雄：0、0.98、3.34、6.97 雌：0、1.08、3.60、7.40				雌雄：赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)	雌雄：赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)
サル	2年間慢性毒性試験	0、0.1、0.5、2	/	/	0.5	雌雄：赤血球 ChE 活性阻害(20%以上)等	/

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾				
			JMPR	EFSA	豪州 ²⁾	食品安全委員会	参考 (農薬抄録)
		ADI	overall NOAEL : 0.6 SF : 100 ADI : 0.006	NOAEL : 0.5 SF : 100 ADI : 0.005	NOEL : 0.2 SF : 100 ADI : 0.002	NOAEL : 0.49 SF : 100 ADI : 0.0049	NOAEL : 0.5 SF : 100 ADI : 0.005
		ADI 設定根拠資料	ラット6か月間亜急性毒性、2年間慢性毒性/発がん性併合、亜急性眼毒性試験	ラット2年間慢性毒性/発がん性併合試験	イヌ1年間慢性毒性試験	ラット2年間慢性毒性/発がん性併合試験	ラット2年間慢性毒性/発がん性併合試験

ADI : 許容一日摂取量 SF : 安全係数 NOAEL : 無毒性量 NOEL : 最大無作用量 - : 無毒性量は設定できない / : 記載なし

¹⁾ : 無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見等を記した。²⁾ : 豪州では NOEL を記載

表 67 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参照用量設定に 関連するエンドポイント (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日) ¹⁾
ラット	急性毒性試験	雄：52、73、102、143、 200、280、392、550、 770 雌：52、73、102、200、 280、392、550、770、 1,080、1,510	雌雄：52 雌雄：攣縮、振戦、運動失調等
	急性毒性試験	100、200、346、450、 590、770、1,000、1,300、 2,000	雌雄：－ 自発運動低下、呼吸不規則等
	急性毒性試験	雄：266、333、416、 520、650 雌：532、666、832、 1,040、1,300	雌雄：－ 雌雄：自発運動低下、流涙等
	急性毒性試験	0、600、1,000、1,400、 1,800、2,200、2,600、 3,000	雌雄：－ 雌雄：筋攣縮、縮瞳、自発運動低下等
	急性神経毒性 試験	雄：0、12.5、50、200 雌：0、50、200、800	雄：12.5 雌：－ 雄：振戦、立ち上がり減少等
	急性眼毒性 試験	雄：0、20、200 雌：0、40、400	雌雄：－ 雌雄：筋肉線維性収縮等
マウス	一般薬理試験 (一般状態)	雌雄：800、936、1,095、 1,281、1,499	雌雄：－ 雌雄：自発運動低下、呼吸促迫等
	急性毒性試験	0、500、700、980、 1,370、1,920	雌雄：500 雌雄：自発運動低下、呼吸深大、呼吸困難等
	急性毒性試験	500、650、845、1,000、 1,300、1,700、2,200、 2,860	雌雄：－ 雌雄：自発運動低下、呼吸不規則、呼吸困難等
ウサギ	発生毒性試験①	0、3、10、30	母動物：10 母動物：自発運動低下、振戦等
イヌ	急性毒性試験	0、300	雌雄：－ 雌雄：呼吸促迫及び不規則、意気消沈、 自発運動低下等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び急性参照用量設定に 関連するエンドポイント (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日) ¹⁾
ヒト	急性投与試験	0.042、0.33	0.33 毒性所見なし
	4日間投与試験	0.18、0.36	0.36 毒性所見なし
ARfD			NOAEL : 0.36 SF : 10 ARfD : 0.036
ARfD 設定根拠資料			ヒト 4日間投与試験

ARfD : 急性参照用量 SF : 安全係数 NOAEL : 無毒性量 - : 無毒性量は設定できず

¹⁾ : 最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

<別紙 1 : 代謝物/分解物略称>

記号	略号	化学名
B	FNO (SMO) (MEP-オクソン) (II)	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphate
C	アミノ-MEP AM-FNT (III) 4-amino-fenitrothion	<i>O</i> -(4-amino-3-methylphenyl) <i>O,O</i> -dimethylphosphorothioate <i>O</i> -(4-amino-3-methylphenyl) <i>O,O</i> -dimethylthiophosphate <i>O,O</i> -dimethyl- <i>O</i> -(3-methyl-4-aminophenyl) phosphorothioate
Ca	アミノ-MEP-N-硫酸 <i>N</i> -Sulfo aminofenitrothion	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-sulfo aminophenyl)phosphorothioate
D	SM-FNT (SCH ₃ -SMT) (MEP-S-メチル異性体) (IV)	<i>O,S</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate <i>O,S</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate
E	DM-FNT (DM-SMT) (デスメチル-MEP) (V)	<i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl)-Phosphorothioate <i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl)-thiophosphate
F	DM-FNO (VI)	<i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl <i>O</i> -(3-methyl-4-nitrophenyl)-phosphate
G	NMC (3-メチル-4-ニトロフェノール) (VII)	3-methyl-4-nitrophenol
Ga	NMC-glc (VIII)	1- <i>O</i> -β-D-(glucuronosyl)-3-methyl-4-nitrophenol
Gb	NMC-sul (VIII)	3-methyl-4-nitrophenyl sulfate
Gc	NMC-β-glc (VIII)	1- <i>O</i> -β-D-(glucopyranosyl)-3-methyl-4-nitrophenol
H	HM-NMC (IX)	3-(hydroxymethyl)-4-nitrophenol 5-hydroxy-2-nitrobenzylalcohol
I	CA-NMC (X)	5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid
J	NMA	4-methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene
K	DM-AA-FNO (XVII)	<i>O</i> -(4-acetylamino-3-methylphenyl) <i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl phosphate

記号	略号	化学名
M	(XIV)	3-methyl-4-aminophenol
Ma	(XIVa)	3-methyl-4-aminophenyl sulfate
N	HM-AMC	4-acetylamino-3-hydroxymethylphenol
O	CA-FNT (3-カルボキシ-MEP) (XV)	5-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 5-[(dimethoxythiophosphoryl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
P	CA-FNO (COOH-SMO) (XVI)	5-[(dimethoxyphosphoryl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Q	CA-FNT dimer (カルボキシ-MEP 縮合物) (XXVIII)	5-(dimethoxyphosphorothioyl)oxy-2-{5-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-2-nitrobenzoylamino}benzoic acid 5-(dimethoxythiophosphoryl)oxy-2-{5-[(dimethoxythiophosphoryl)oxy]-2-nitrobenzoylamino}benzoic acid
R	DMPTA	dimethyl phosphorothioic acid dimethyl hydrogen thiophosphate
S	DMPA	dimethyl phosphoric acid dimethyl hydrogen phosphate
T	AM-FNO-sul <i>N</i> -sulfo aminofenitro-oxon	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-sulfo-aminophenyl) phosphate sulfate of <i>O</i> -(3-methyl-4-aminophenyl) <i>O,O</i> -dimethyl phosphate
U	HM-FNO fenitrooxon-3-CH ₂ OH	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-hydroxymethyl-4-nitrophenyl) phosphate
V	FA-FNT formylaminofenitro-thion	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-formylaminophenyl) phosphorothioate
W	AA-FNT acetylaminofenitro-thion	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-acetylaminophenyl) phosphorothioate
X	AAMC (3-メチル-4-アセチルアミノフェノール)	4-acetylamino-3-methylphenol
Y	AM-FNO aminofenitrooxon	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-aminophenyl) phosphate
Z	FA-FNO formylaminofenitro-oxon	<i>O,O</i> -dimethyl <i>O</i> -(3-methyl-4-formylaminophenyl) phosphate
AA	AA-FNO acetylaminofenitro-oxon	<i>O</i> -(4-acetylamino-3-methylphenyl) <i>O,O</i> -dimethyl phosphate
AB	DM-AM-FNT	<i>O</i> -(4-amino-3-methylphenyl) <i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl

記号	略号	化学名
	(デスメチルアミン -MEP)	phosphorothioate <i>O</i> -(4-amino-3-methylphenyl) <i>O</i> -hydrogen <i>O</i> -methyl thiophosphate

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
水域 PEC	水域環境中予測濃度
ACh	アセチルコリン
A/G 比	アルブミン/グロブリン比
ai	有効成分量 (active ingredient)
Alb	アルブミン
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT)]
APVMA	オーストラリア農薬・動物用医薬品局
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT)]
AUC	薬物血中濃度-時間曲線下面積
BCF	生物濃縮係数
BUN	血液尿素窒素
ChE	コリンエステラーゼ
C _{max}	最高濃度
EFSA	欧州食品安全機関
EPA	米国環境保護庁
GC-MS	ガスクロマトグラフィー質量分析
Glu	グルコース (血糖)
His	ヒスタミン
JMPR	FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
PHI	最終使用から収穫までの日数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与(処理)放射能
T.Chol	総コレステロール
TLC	薄層クロマトグラフ
T _{max}	最高濃度到達時間
TRR	総残留放射能
UDS	不定期 DNA 合成

<別紙3：作物残留試験成績>

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稲 (露地) (玄米) 昭和48年度	750 ^{EC} 散布	3	1	31	<0.002	<0.002	0.005	0.004
			1	28	0.003	0.003	0.002	0.002
			1	34	<0.002	<0.002	0.002	0.002
	750 ^{EC} 空中散布	3	1	31	-	-	0.007	0.007
			1	42	<0.002	<0.002	0.005	0.004
			1	28	<0.002	<0.002	0.002	0.002
水稲 (露地) (稲わら) 昭和48年度	750 ^{EC} 散布	3	1	31	0.007	0.007	0.017	0.016
			1	28	0.019	0.018	0.043	0.040
			1	34	0.033	0.032	0.068	0.064
	750 ^{EC} 空中散布	3	1	31	-	-	0.017	0.016
			1	42	0.073	0.068	0.060	0.058
			1	28	0.005	0.004	0.018	0.017
水稲 (露地) (玄米) 昭和53年度	750 ^{EC} 散布	2	1	53	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002
			1	37	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	750 ^L 空中散布	2	1	47	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002
			1	37	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	500 ^{EC} 散布	1	1	109	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
			1	109	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
水稲 (露地) (稲わら) 昭和53年度	750 ^{EC} 散布	2	1	53	0.01	0.01	0.004	0.004
			1	37	0.03	0.02	0.021	0.020
	750 ^L 空中散布	2	1	47	<0.01	<0.01	0.007	0.007
			1	37	0.07	0.07	0.072	0.068
	500 ^{EC} 散布	1	1	109	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
			1	109	0.01	0.01	0.005	0.005
水稲 (露地) (玄米) 平成4年度	500 ^{MC} 空中散布	2	1	26	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
			1	46	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
	500 ^{MC} 散布	2	1	41	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
			1	46	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稲 (露地) (稲わら) 平成4年度	500 ^{MC} 空中散布	2	1	26	<0.02	<0.02	0.18	0.18
			1	46	<0.02	<0.02	0.01	0.01
	500 ^{MC} 散布	2	1	41	0.17	0.16	0.02	0.02
			1	46	0.04	0.04	0.07	0.06
水稲 (露地) (青刈り) 平成4年度	500 ^{MC} 空中散布	2	1	16 ^a			0.08	0.08
			1	22			0.03	0.02
	500 ^{MC} 散布	2	1	16 ^a			0.02	0.02
			1	22			0.04	0.04
水稲 (露地) (玄米) 平成5年度	0.5% ^{EC} 10分間種子浸漬	1	1	175			<0.01	<0.01
	0.05% ^{EC} 72時間種子浸漬	1	1	190			<0.01	<0.01
水稲 (露地) (玄米) 平成8年度	0.05% ^{EC} 24時間種子浸漬	2	1	177	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			1	146	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	0.05% ^{EC} 72時間種子浸漬	2	1	179	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			1	146	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水稲 (露地) (玄米) 平成9年度	0.25 g/箱 ^{EC} 育苗箱処理	2	1	136	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
			1	124	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
水稲 (露地) (稲わら) 平成9年度	0.25 g/箱 ^{EC} 育苗箱処理	2	1	136	<0.02	<0.02	<0.05	<0.05
			1	124	<0.02	<0.02	<0.05	<0.05
水稲 (露地) (玄米) 平成10年度	500 ^{WP} 空中散布	2	1	21			<0.005	<0.005
			1	21			0.046	0.046
	500 ^{EC} 散布	1	1	21			<0.005	<0.005
	750 ^{EC} 散布	1	1	21			0.049	0.048

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
小麦 (露地) (玄麦) 昭和54年度	500 ^{EC} 空中散布	2	1	6 ^a	0.04	0.04	0.052	0.048	
				10	0.06	0.06	0.060	0.059	
				15	0.10	0.10	0.059	0.057	
				20	0.04	0.04	0.043	0.043	
			1	35	0.05	0.04	0.016	0.016	
				7	0.04	0.04	0.029	0.029	
				13	0.03	0.03	0.029	0.027	
				18	0.02	0.02	0.011	0.011	
1	21	<0.01	<0.01	0.010	0.010				
	38	0.02	0.02	0.010	0.010				
	小麦 (露地) (玄麦) 昭和54年度	500 ^{EC} 散布	1	1	6 ^a	0.13	0.12	0.056	0.050
					10	0.03	0.03	0.028	0.028
15					<0.01	<0.01	0.003	0.003	
20					<0.01	<0.01	0.003	0.003	
35					<0.01	<0.01	0.002	0.002	
1	750 ^{EC} 散布	1	1	7	0.02	0.02	0.016	0.016	
				13	0.03	0.03	0.014	0.014	
				18	0.04	0.04	0.006	0.006	
				38	<0.01	<0.01	0.006	0.006	
小麦 (露地) (玄麦) 平成15年度	500 ^{EC} 散布	2	1	7	0.10	0.10	0.07	0.07	
				14	0.02	0.02	0.01	0.01	
				21	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
			1	7	0.42	0.40	0.27	0.27	
				14	0.10	0.10	0.07	0.06	
				21	0.07	0.07	0.05	0.04	
大麦 (露地) (種子) 平成8年度	500 ^{EC} 空中散布	2	1	7			0.05	0.05	
			1	7			0.43	0.42	
大麦 (露地) (種子) 平成20、21年度	500 ^{EC} 空中散布	2	1	7	1.09	1.05	0.75	0.73	
				14	0.14	0.14	0.18	0.18	
				21	0.01	0.01	0.01	0.01	
			1	7	0.36	0.36	0.35	0.35	
				14	0.01	0.01	0.02	0.02	
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
とうもろこし (露地) (生食用子実) 昭和57年度	1,000 ^{EC} 散布	1	4	7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	1,250~1,500 ^{EC} 散布	1	4	14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
				14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
とうもろこし (露地) (乾燥子実) 昭和 57 年度	1,000 ^{EC} 散布	1	4	7	0.005	0.005	<0.005	<0.005
	1,500 ^{EC} 散布	1	4	7	0.045	0.044	<0.005	<0.005
とうもろこし (露地) (青刈り) 平成 3 年度	550~1,250 ^{EC} 散布	1	4	7 14	/	/	0.43 0.15	0.42 0.15
	1,250 ^{EC} 散布	1	4	7 14	/	/	1.46 0.65	1.45 0.62
だいず (露地) (乾燥子実) 昭和 46 年度	714 ^{EC} 散布	2	2	56	/	/	0.002	0.002
			3	43	/	/	0.002	0.002
だいず (露地) (乾燥子実) 昭和 55 年度	750 ^{EC} 空中散布	2	3	45	<0.005	<0.005	/	/
			3	45	<0.005	<0.005	/	/
	900 ^{EC} 散布	2	3	45	<0.005	<0.005	/	/
			3	45	<0.005	<0.005	/	/
だいず (露地) (乾燥子実) 平成 2 年度	1,250 ^{EC} 散布	2	4	21 31	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
			4	21 30	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
だいず (露地) (乾燥子実) 平成 9 年度	500 ^{EC} 空中散布	2	4	21	/	/	<0.01	<0.01
			4	21	/	/	<0.01	<0.01
あずき (露地) (乾燥子実) 昭和 59 年度	1,250 ^{EC} 散布	2	4	21	0.069	0.068	0.046	0.044
			4	21	0.061	0.061	0.039	0.038
あずき (露地) (乾燥子実) 平成 15 年度	500 ^{EC} 散布	2	4	21 28	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
			4	21 28	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
いんげんまめ (露地) (乾燥子実) 平成 2 年度	1,250 ^{EC} 散布	2	4	21 30	0.01 <0.01	0.01 <0.01	0.01 <0.01	0.01 <0.01
			4	21 30	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
えんどうまめ (施設) (乾燥子実) 平成3年度	1,000 ^{EC} 散布	1	4	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,250 ^{EC} 散布	1	4	21	0.03	0.03	0.06	0.06
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
そらまめ (露地) (乾燥子実) 平成19年度	1,000 ^{EC} 散布	2	3	3	/	/	0.03	0.03
				7			0.03	0.03
			3	14	/	/	0.02	0.02
				3			0.01	0.01
				7	<0.01	<0.01	<0.01	
				14	<0.01	<0.01	<0.01	
らっかせい (露地) (乾燥子実) 平成2年度	1,000~1,250 ^{EC} 散布	1	4	20	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				29	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,250 ^{EC} 散布	1	4	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ばれいしょ (露地) (塊茎) 昭和48年度	750 ^{EC} 散布	1	3	3	<0.002	<0.002	0.002	0.002
				7	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
			6	14	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				3	<0.002	<0.002	0.004	0.004
	500 ^{EC} 散布	1	3	7	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				14	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				3	<0.002	<0.002	0.002	0.002
				7	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				14	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				3	<0.002	<0.002	0.002	0.002
				7	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				14	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ばれいしょ (露地) (塊茎) 平成15年度	500 ^{EC} 散布	2	6	3	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
			6	14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				3	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
かんしょ (露地) (塊根) 昭和61年度	600 ^{EC} 散布	2	5	7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
			5	7	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
				14	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)						
					フェニトロチオン						
					公的分析機関		社内分析機関				
					最高値	平均値	最高値	平均値			
かんしょ (露地) (塊根) 平成3年度	1,000 ^{EC} 散布	2	5	7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
			5	7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
こんにゃく (露地) (球茎) 昭和58年度	750~1,000 ^{EC} 散布	1	2	34	<0.02	<0.02	/	/			
	1,100 ^{EC} 散布	1	2	65	<0.02	<0.02	/	/			
こんにゃく (露地) (球茎) 平成3年度	1,000 ^{EC} 散布	2	3	15	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				22	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
			3	14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
				21	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
てんさい (露地) (根部) 平成27年度	1,000 ^{EC} 散布	3	2	14	/	/	<0.01	<0.01			
				21	/	/	<0.01	<0.01			
				28	/	/	<0.01	<0.01			
			2	14	/	/	<0.01	<0.01			
				21	/	/	<0.01	<0.01			
				28	/	/	<0.01	<0.01			
			2	14	/	/	0.02	0.02			
				21	/	/	<0.01	<0.01			
				28	/	/	<0.01	<0.01			
			さとうきび (露地) (茎) 昭和47年度	1,200 ^{MG} 散布	2	2	101	0.001	0.001	0.001	0.001
						2	151	0.011	0.011	0.011	0.011
			さとうきび (露地) (茎及び葉) 昭和49年度	1,000 ^{EC} 散布	1	2	7 ^a	/	/	0.025	0.022
15 ^a	/	/					0.003	0.002			
1	4	36 ^a			/	/	0.041	0.036			
		7 ^a			/	/	0.017	0.013			
1	4	14 ^a	/	/	0.006	0.005					
		98	/	/	0.057	0.052					
さとうきび (露地) (茎) 昭和59年度	1,500 ^{EC} 散布	2	4	14 ^a	0.029	0.028	0.005	0.004			
			4		0.012	0.012	0.012	0.012			

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
さとうきび (露地) (茎及び葉) 平成5年度	1,200 ^{EC} 空中散布	2	1	30 ^a 60	/	/	0.008	0.008
			1	30 ^a 60			<0.005	<0.005
		2	1	30 ^a 60	/	/	0.010	0.009
			1	30 ^a 60			<0.005	<0.005
さとうきび (露地) (茎及び葉) 平成5年度	750 ^{EC} 散布	2	1	31 ^a 61	/	/	<0.005	<0.005
			1	31 ^a 61			<0.005	<0.005
さとうきび (露地) (茎) 平成6年度	1,000 ^{MC} 散布	2	4	90 120	0.005 0.006	0.005 0.006	<0.005	<0.005
			4	88 119	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005	<0.005
さとうきび (露地) (茎) 平成20年度	1,500 ^{EC} 散布	2	4	28 ^a 42 ^a 56	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 0.01	0.01 <0.01 0.01
			4	28 ^a 42 ^a 56	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.02 0.01 0.02	0.02 0.01 0.02
ごぼう (露地) (根部) 昭和59年度	1,000 ^{EC} 散布	2	2	14	0.007	0.006	0.003	0.002
			2	14	0.007	0.007	0.003	0.003
たまねぎ (露地) (鱗茎) 平成2年度	857~1,071 ^{EC} 散布	1	2	21 30	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
	1,071 ^{EC} 散布	1	2	21 30	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
根深ねぎ (露地) (茎葉) 昭和46年度	571 ^{EC} 散布	1	2	14	/	/	<0.001	<0.001
	2,860 ^{EC} 散布	1	2	14	/	/	0.023	0.023
根深ねぎ (露地) (茎葉) 平成2年度	1,070 ^{EC} 散布	2	2	14 21	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	0.01 <0.01	0.01 <0.01
			2	14 21	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
葉ねぎ (施設) (茎葉) 平成 19 年度	1,430 ^{EC} 散布	1	2	14	0.14	0.14	0.15	0.15
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
にら (施設) (茎葉) 平成 28 年度	15,000 ^{EC} 株元灌注	3	1	7 ^a	/	/	6.74	6.74
				14	/	/	0.84	0.84
				21	/	/	0.14	0.14
			1	7 ^a	/	/	0.13	0.12
				14	/	/	0.04	0.04
				21	/	/	0.02	0.02
らっきょう (露地) (鱗茎) 平成 17 年度	1,000 ^{EC} 散布	1	2	14	<0.02	<0.02	/	/
				21	<0.02	<0.02	/	/
	500 ^{EC} 散布	1	2	14	<0.02	<0.02	/	/
				21	<0.02	<0.02	/	/
せり (露地) (茎葉) 平成 24 年度	500 ^{EC} 散布	2	2	45	/	/	<0.01	<0.01
				52	/	/	<0.01	<0.01
			2	45	/	/	<0.01	<0.01
				52	/	/	<0.01	<0.01
トマト (施設) (果実) 平成 4 年度	625 ^{EC} 散布	1	2	1	0.27	0.27	0.25	0.24
				3	0.14	0.14	0.17	0.16
				7	0.06	0.06	0.07	0.07
				14	0.03	0.03	0.03	0.02
	750 ^{EC} 散布	1	2	1	0.20	0.20	0.22	0.22
				3	0.06	0.06	0.07	0.07
				7	0.04	0.03	<0.01	<0.01
				14	0.01	0.01	<0.01	<0.01
なす (露地) (果実) 昭和 47 年度	1,000 ^{EC} 散布	1	3	3	0.002	0.002	/	/
				7	0.002	0.002	/	/
				14	0.002	0.002	/	/
	750~1,500 ^{EC} 散布	1	3	3	0.002	0.002	/	/
				7	<0.001	<0.001	/	/
				14	<0.001	<0.001	/	/

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
なす (施設) (果実) 昭和 60 年度	1,000 ^{EC} 散布	2	5	1 3	0.132 0.042	0.128 0.040	0.157 0.062	0.157 0.062
			5	1 3	0.015 0.004	0.014 0.004	0.098 0.007	0.098 0.007
なす (施設) (果実) 平成元年度	1,000 ^{EC} 散布	2	5	1 3	/	/	0.05 0.02	0.05 0.02
			5	1 3	/	/	0.02 0.01	0.02 0.01
きゅうり (施設) (果実) 昭和 60 年度	1,000 ^{EC} 散布	2	5	1 3	0.032 <0.002	0.030 <0.002	0.023 <0.002	0.022 <0.002
			5	1 3	0.058 0.010	0.058 0.010	0.059 0.005	0.059 0.005
きゅうり (施設) (果実) 平成 2 年度	1,790 ^{EC} 散布	1	3	1 3	0.02 <0.01	0.02 <0.01	0.03 0.02	0.03 0.02
			5	1 3	0.02 <0.01	0.02 <0.01	0.03 0.02	0.02 0.02
		1	3	1 3	0.04 <0.01	0.04 <0.01	0.04 <0.01	0.04 <0.01
			5	1 3	0.02 <0.01	0.02 <0.01	0.03 0.02	0.02 0.02
かぼちゃ (施設) (果実) 平成 3 年度	1,430 ^{EC} 散布	2	3	14	0.033	0.031	0.032	0.032
			3	14	0.009	0.009	0.011	0.010
しろうり (露地) (果実) 平成 3 年度	87~1,000 ^{EC} 散布	1	5	3 7 14	/	/	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
しろうり (露地) (果実) 平成 4 年度	212~1,000 ^{EC} 散布	1	5	1 3 7	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01
	1,000 ^{EC} 散布	1	5	1 3 7	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01
すいか (露地) (果肉) 昭和 51 年度	1,428 ^{EC} 散布	1	6	3	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001
	714~2,500 ^{EC} 散布	1	6	3	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場数	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
メロン (施設) (果肉) 昭和 59 年	1,000 ^{EC} 散布	2	5	1 3	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
			5	1 3	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
ほうれんそう (施設) (茎葉) 平成元年	750 ^{EC} 散布	1	2	21 30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
	1,000 ^{EC} 散布	1	2	21 30	0.006	0.006	0.02	0.02
ほうれんそう (施設) (茎葉) 平成元年度	375 ^{EC} 散布	1	2	21 30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
	500 ^{EC} 散布	1	2	21 30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
さやえんどう (施設) (さや) 平成 3 年度	1,000 ^{EC} 散布	1	4	21 28	<0.01	<0.01	0.07	0.07
	1,250 ^{EC} 散布	1	4	21 30	<0.01	<0.01	0.02	0.02
さやいんげん (露地) (子実) 平成 2 年度	1,250 ^{EC} 散布	2	4	21 30	0.01	0.01	<0.01	<0.01
			4	21 30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
えだまめ (露地) (さや) 平成 2 年度	1,250 ^{EC} 散布	2	4	21 30	0.12	0.12	0.07	0.07
			4	21 30	0.10	0.09	0.10	0.10
しいたけ (露地・施設) (乾燥子実) 昭和 57 年度	1.33~1.58 g/m ² ほだ木 ^{EC} 散布	1 露地	2	605	0.004	0.004	<0.005	<0.005
		1 施設	2	592	0.004	0.004	<0.005	<0.005
未成熟 そらまめ (露地) (子実) 平成 7 年度	1,500 ^{EC} 散布	2	3	3 7 13	0.031	0.030	0.04	0.04
			3	3 7 14	0.016	0.016	0.02	0.02
			3	3 7	0.005	0.004	<0.01	<0.01
			3	3 7 14	0.007	0.006	0.01	0.01
たらのき (露地) (可食部) 平成 6 年度	9,000 ^{EC} 散布	2	2	227	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	277	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
モロヘイヤ (露地) (茎葉) 平成7年度	2,000 ^{EC} 散布	2	2	14 21	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
			2	14 21	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
うど (露地・施設) (茎) 平成6年度	1,000 ^{EC} 茎葉散布 株養成期：露地 収穫期：施設	1	4	226	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02
	1,875~2,125 ^{EC} 茎葉散布 株養成期：露地 収穫期：施設	1	4	139 ^a	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02
オリーブ (露地) (果実) 平成6年度	20g/樹 ^{EC} 樹幹散布	1	2	60	0.01	0.01	<0.01	<0.01
			3	21 30	0.01 <0.01	0.01 <0.01	0.01 <0.01	0.01 <0.01
		1	2	60	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			3	21 300	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
オリーブ (露地・無袋) (葉) 平成16年度	4,000 ^{EC} 樹幹散布	1	3	120	<0.02	<0.02		
		1	3	120	0.04	0.04		
わらび (露地・施設・無袋) (茎葉) 平成16年度	1,000 ^{EC} 株養成期：露地 収穫期：施設 散布	1	2	83 ^a	<0.005	<0.005		
わらび (露地・施設・無袋) (茎葉) 平成17年度	1,000 ^{EC} 株養成期：露地 収穫期：施設 散布	1	2	89 ^a	<0.005	<0.005		
みかん (露地) (果肉) 昭和47年度	22,500 ^{EC} 散布	2	1	30	<0.001	<0.001		
			1	30	<0.001	<0.001		
	0.5% ^{EC} 樹幹散布	1	1	159	<0.001	<0.001		
			0.125g/樹 ^{EC} 樹幹散布	2	1	106	<0.001	<0.001
		1	159		<0.001	<0.001		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
みかん (露地) (果皮) 昭和 47 年度	22,500 ^{EC} 散布	2	1	30	0.009	0.009	/	/
			1	30	0.008	0.008	/	/
	0.5 % ^{EC} 樹幹散布	1	1	159	0.004	0.004	/	/
	0.125 g/樹 ^{EC} 樹幹散布	2	1	106	0.003	0.003	/	/
1			159	0.007	0.007	/	/	
みかん (果肉) 昭和 47 年度	1% ^{EC} 原液塗布 (地上 30 cm まで十分量)	2	1	165	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1			107	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
みかん (果皮) 昭和 47 年度		2	1	165	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004
			1	107	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004
みかん (露地) (果肉) 昭和 49 年度	1,330 ^{EC} 空中散布	1	1	202	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003
	2,500 ^{EC} 散布	1	1	202	<0.001	<0.001	<0.003	<0.003
みかん (露地) (果皮) 昭和 49 年度	1,330 ^{EC} 空中散布	1	1	202	<0.002	<0.002	0.004	0.004
	2,500 ^{EC} 散布	1	1	202	<0.002	<0.002	0.004	0.004
みかん (露地) (果肉) 昭和 57 年度	9,010 ^{EC} 散布	1	1	14	/	/	<0.005	<0.005
				21	/	/	<0.005	<0.005
				28	/	/	<0.005	<0.005
みかん (露地) (果皮) 昭和 57 年度		1	1	14	/	/	3.73	3.56
				21	/	/	2.53	2.50
				28	/	/	2.46	2.44

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
みかん (露地) (果肉) 昭和 63 年度	3,000 ^{EC} 散布	1	3	14	/	/	<0.01	<0.01
				21			<0.01	<0.01
				30			<0.01	<0.01
				45			<0.01	<0.01
			5	14	/	/	<0.01	<0.01
				21			<0.01	<0.01
				30			<0.01	<0.01
				45			<0.01	<0.01
みかん (露地) (果皮) 昭和 63 年度	3,000 ^{EC} 散布	1	3	14	/	/	8.82	8.71
				21			8.45	8.42
				30			7.49	7.42
				45			5.97	5.94
			5	14	/	/	19.2	18.8
				21			17.5	17.3
				30			16.1	16.0
				45			12.7	12.6
みかん (露地) (果肉) 平成元年度	2,000 ^{EC} 散布	1	3	14	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				21	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				44	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
			5	14	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				21	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				44	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
		1	3	14	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				21	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				45	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
			5	14	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				21	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				30	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01
				45	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
みかん (露地) (果皮) 平成元年度	2,000 ^{EC} 散布	1	3	14	7.42	7.24	5.56	5.46
				21	4.94	4.78	6.32	6.03
				30	7.09	7.08	6.12	5.92
				44	5.78	5.68	5.05	4.79
			5	14	6.56	6.48	7.56	7.24
				21	8.03	7.95	9.42	9.30
				30	8.46	8.17	7.78	7.58
				44	6.30	6.30	6.70	6.61
		1	3	14	4.99	4.76	5.02	4.98
				21	4.03	3.92	4.54	4.40
				30	5.14	4.90	4.76	4.71
				45	4.35	4.21	4.82	4.68
5	14		7.24	7.22	7.20	7.16		
	21		6.16	6.08	6.28	6.22		
	30		7.43	7.35	7.68	7.68		
	45		6.91	6.58	6.27	6.16		
みかん (露地・無袋) (果肉) 平成6年度	2,500 ^{EC} 空中散布	2	5	14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		2	5	14	1.07	1.04	0.79	0.75
				14	1.85	1.84	1.45	1.44
なつみかん (露地・無袋) (果実全体) 平成6年度	2,500 ^{EC} 散布	2	3	14	0.51	0.51	0.40	0.38
				21	0.57	0.54	0.56	0.56
			3	14	1.29	1.22	0.92	0.87
				21	0.88	0.86	0.67	0.66
いよかん (露地・無袋) (果肉) 平成6年度	2,500 ^{EC} 空中散布	2	5 ^a	13 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				13 ^a	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
いよかん (露地・無袋) (果皮) 平成6年度	2,500 ^{EC} 空中散布	2	5 ^a	13 ^a	1.38	1.36	0.42	0.39
				13 ^a	1.03	1.03	0.62	0.59

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
いよかん (露地・無袋) (果実全体： 計算値) 平成6年度	2,500 ^{EC} 空中散布	2	5 ^a	13 ^a	—	0.50	—	0.14
			5 ^a	13 ^a	—	0.41	—	0.20
かぼす (露地・無袋) (果実全体) 平成21年度	3,090 ^{EC} 散布	1	3	14 21 28 35	/	/	3.82 2.15 1.74 2.05	3.74 2.14 1.72 2.00
すだち (露地・無袋) (果実全体) 平成21年度	2,500 ^{EC} 散布	1	3	14 21 28 35	/	/	1.92 2.15 2.54 0.02	1.84 2.13 2.43 0.02
りんご (露地) (果実) 昭和47年度	2,500~3,000 ^{EC} 散布	1	3	30	0.046	0.044	/	/
	2,700 ^{EC} 散布	1	3	29 ^a	0.052	0.052	/	/
りんご (露地) (果実) 昭和51年度	1,500 ^{EC} 少量散布	2	3	28 ^a	0.09	0.08	0.139	0.130
			3	28 ^a	0.12	0.12	0.178	0.174
りんご (露地・無袋) (果肉) 昭和53年度	200 ^{EC} 主幹部塗布	1	1	159	/	/	<0.002	<0.002
りんご (露地・無袋) (果皮) 昭和53年度	200 ^{EC} 主幹部塗布	1	1	159	/	/	<0.002	<0.002
りんご (露地・無袋) (果実) 平成2年度	2,000 ^{EC} 散布	2	3	30	0.13	0.13	0.11	0.11
			2	30	0.11	0.10	0.12	0.12
りんご (露地・無袋) (果実) 平成4年度	1,500 ^{EC} 散布	1	3	30	/	/	0.11	0.11

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
りんご (露地・無袋) (果実) 平成5年度	2,000 ^{EC} 散布	1	3	30 45			0.02	0.02
	1,500 ^{EC} 散布	1	3	30 45			<0.01	<0.01
りんご (露地・無袋) (果実) 平成6年度	2,000 ^{EC} 散布	2	3	29 ^a			0.10	0.10
			3	30			0.01	0.01
りんご (露地・無袋) (果実) 平成7年度	2,000 ^{EC} 散布	1	3	30			0.01	0.01
	1,500 ^{EC} 散布	1	3	31			0.01	0.01
		1	3	30			0.03	0.02
りんご (露地・無袋) (果実) 平成7年度	1,500 ^{EC} 散布	2	3	30			0.08	0.08
			3	30			0.04	0.04
日本なし (露地・無袋) (果実) 昭和62年度	2,000 ^{EC} 散布	2	6	21 30	0.045 0.017	0.042 0.016	0.048 0.016	0.048 0.016
			6	21 28	0.152 0.104	0.148 0.097	0.119 0.105	0.118 0.103
			6	21 28	0.006 0.005	0.006 0.005	0.006 <0.005	0.006 <0.005
日本なし (露地・有袋) (果実) 平成2年度	2,000 ^{EC} 散布	2	6	14	0.03	0.03	0.04	0.04
			6	14	0.08	0.08	0.10	0.10
日本なし (露地) (果実) 平成5年度	2,500 ^{EC} 散布	1	6	21 30			0.12	0.11
	2,000 ^{EC} 散布	1	6	21 30			0.02	0.02
日本なし (露地・無袋) (果実) 平成6年度	2,000 ^{EC} 散布	2	6	21			0.12	0.12
			6	21			0.05	0.05
日本なし (露地・無袋) (果実) 平成6年度	2,000 ^{EC} 散布	2	6	21			0.06	0.05
			6	21			0.05	0.05

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
日本なし (露地・有袋) (果実) 平成 6 年度	2,000 ^{EC} 散布	3	6	14	/	/	<0.01	<0.01	
			6	14			0.03	0.02	
			6	14			0.04	0.04	
日本なし (露地・無袋) (果実) 平成 7 年度	2,000 ^{EC} 散布	4	6	21	/	/	0.08	0.08	
			6	21			0.06	0.06	
			6	21			0.03	0.03	
			6	21			0.09	0.08	
日本なし (露地・有袋) (果実) 平成 7 年度	2,000 ^{EC} 散布	1	6	14	/	/	0.03	0.03	
日本なし (露地・無袋) (果実) 平成 21 年度	0.7 g/樹 ^{EC} 樹幹散布	1	6	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	1 g/樹 ^{EC} 樹幹散布	1	6	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
もも (露地・無袋) (果肉) 昭和 47 年度	2,000 ^{EC} 散布	1	3	3	0.073	0.070	/	/	
			3	7	0.032	0.030			
			3	14	0.005	0.005			
			6	3	0.080	0.074			
	2,500 ^{EC} 散布	1	1	3	3	0.073	0.071	/	/
				3	7	0.057	0.056		
				3	14	0.011	0.010		
				6	3	0.071	0.070		
			6	7	0.054	0.053			
			6	14	0.015	0.014			

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
もも (露地・無袋) (果皮) 昭和 47 年度	2,000 ^{EC} 散布	1	3	3	2.24	2.24	/	/
				7	1.10	1.08		
				14	0.416	0.364		
	2,500 ^{EC} 散布	1	3	3	2.91	2.74	/	/
				7	1.56	1.54		
				14	0.580	0.540		
もも (果肉) 昭和 47 年度	5,000 ^{EC} 散布	1	1	85	0.0027	0.0020	<0.001	<0.001
				2	50	0.0032	0.0026	0.002
		1	2	119	<0.0008	<0.0008	<0.001	<0.001
				88	<0.0008	<0.0008	<0.001	<0.001
もも (露地・無袋) (果肉) 昭和 50 年度	0.667% ^{EC} 樹幹塗布	2	1	30	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				45	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		2	1	30	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
				45	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
もも (露地・無袋) (果皮) 昭和 50 年度	0.667% ^{EC} 樹幹塗布	2	1	30	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
				45	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
		2	1	30	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
				45	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
もも (露地・無袋) (果肉) 平成 10 年度	2,000 ^{EC} 散布	2	6	3	0.04	0.04	0.10	0.10
				7	0.04	0.04	0.03	0.03
				13	0.03	0.03	<0.01	<0.01
		2	6	3	0.03	0.03	0.01	0.01
				8	0.01	0.01	0.01	0.01
				14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
もも (露地・無袋) (果皮) 平成 10 年度	2,000 ^{EC} 散布	2	6	3	26.4	25.5	23.1	22.9
				7	13.8	13.6	8.33	7.96
		2	6	13	9.12	9.11	4.96	4.15
				3	4.83	4.78	2.19	2.12
2	6	8	1.95	1.89	1.51	1.45		
		14	0.48	0.47	0.64	0.64		

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
もも (露地・無袋) (果肉) 平成10年度	1,500 ^{EC} 散布	1	6	3	0.04	0.04	0.04	0.04
				7	0.04	0.04	0.02	0.02
もも (露地・無袋) (果皮) 平成10年度	1,500 ^{EC} 散布	1	6	14	0.04	0.04	<0.01	<0.01
				3	10.9	10.6	6.34	6.28
もも (露地・無袋) (果皮) 平成10年度	1,500 ^{EC} 散布	1	6	7	12.7	12.1	2.25	2.06
				14	7.49	7.32	6.36	6.30
もも (露地・有袋) (果肉) 平成10年度	2,000 ^{EC} 散布	1	6	3	0.07	0.07		
もも (露地・有袋) (果皮) 平成10年度	2,000 ^{EC} 散布	1	6	7	0.06	0.06		
				14	0.03	0.03		
もも (露地・有袋) (果皮) 平成10年度	2,000 ^{EC} 散布	1	6	3	16.2	15.7		
				7	15.9	15.5		
ネクタリン (露地・無袋) (果肉) 平成17年度	2,400 ^{EC} 散布	2	3	124			<0.01	<0.01
				131			<0.01	<0.01
ネクタリン (露地・無袋) (果肉) 平成17年度	2,400 ^{EC} 散布	2	3	138			<0.01	<0.01
				124			<0.01	<0.01
あんず (露地・無袋) (果肉) 平成5年度	7,500 ^{EC} 樹幹及び主枝散布	1	1	105	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	15 g/樹 ^{EC} 樹幹及び主枝散布	1	1	118	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
すもも (露地) (果実) 平成19年度	6,020 ^{EC} 散布	2	2	128			<0.005	<0.005
				104			<0.005	<0.005
うめ (露地) (核を除く 果実全体) 昭和53年度	0.15% ^{EC} 樹幹散布	1	1	79			<0.004	<0.004
	0.3% ^{EC} 樹幹散布			79			<0.004	<0.004
	0.5% ^{EC} 樹幹散布			79			<0.004	<0.004

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
うめ (露地) (果肉) 昭和 61 年度	12,500 ^{EC} 樹幹散布	1	1	99	0.024	0.023	0.006	0.006
	5,000 ^{EC} 樹幹散布	1	1	95	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
うめ (露地) (果肉) 昭和 62 年度	4,000 ^{EC} 散布	2	2	21	0.044	0.044	0.059	0.058
				30	0.014	0.013	0.023	0.020
			2	45	0.064	0.064	0.008	0.007
				21	0.115	0.112	0.080	0.078
30	0.008	0.008	<0.005	<0.005				
45	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
うめ (露地) (果実) 平成 3 年度	3,000 ^{EC} 散布	1	2	13 ^a	0.014	0.014	0.046	0.044
	2,000 ^{EC} 散布	1	2	21	0.006	0.006	0.007	0.006
うめ (露地) (果実) 平成 19 年度	6 g/樹 ^{EC} 樹幹及び主枝散布	1	2	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				97	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	10 g/樹 ^{EC} 樹幹及び主枝散布	1	2	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				97	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
おうとう (露地) (果肉) 昭和 61 年度	2,000 ^{EC} 樹幹散布	1	1	68	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
	2,800 ^{EC} 樹幹散布	1	1	80	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
おうとう (施設) (果実) 平成 2 年度	1,500 ^{EC} 散布	1	2	14	0.04	0.04	0.06	0.06
				21	0.02	0.02	<0.01	<0.01
	2,000 ^{EC} 散布	1	2	30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				14	0.04	0.04	0.04	0.04
21	0.02	0.02	0.01	0.01				
30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
いちご (施設) (果実) 平成 2 年度	750 ^{EC} 散布	2	2	1	2.29	2.23	2.43	2.42
				3	1.72	1.72	1.50	1.48
	375 ^{EC} 散布	2	2	1	0.64	0.64	0.57	0.56
				3	0.22	0.22	0.18	0.18
375 ^{EC} 散布	2	2	1	3.06	2.99	1.91	1.90	
			3	1.36	1.34	1.36	1.30	
375 ^{EC} 散布	2	2	1	0.16	0.16	0.14	0.13	
			3	0.08	0.08	0.08	0.08	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
いちご (露地) (果実) 平成4年度	750 ^{EC} 散布	1	2	1	0.43	0.42	0.49	0.48
				3	0.20	0.20	0.35	0.34
				7	0.06	0.06	0.08	0.08
	375 ^{EC} 散布	1	2	1	0.13	0.13	0.20	0.20
				3	0.08	0.08	0.10	0.10
				7	0.03	0.02	0.03	0.03
大粒種ぶどう (露地) (可食部) 昭和53年度	20 g/樹 ^{EC} 樹幹塗布	2	1	82	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
			1	103	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002
大粒種ぶどう (施設・無袋) (果実) 平成元年度	1,500 ^{EC} 散布	2	2	22 29	/	/	0.046 0.024	0.043 0.022
			2	21 30	/	/	0.007 <0.005	0.006 <0.005
大粒種ぶどう (施設) (果実) 平成元年度	0.05% ^{EC} 十分量	1	2	21 30	0.07 0.05	0.06 0.04	0.05 0.04	0.05 0.04
	1,500 ^{EC}	1	2	21 30	0.02 0.06	0.02 0.06	0.02 0.03	0.02 0.03
大粒種ぶどう (施設・無袋) (果実) 平成18年度	3,000 ^{EC} ×2 主枝散布 2.5 g/樹 ^{EC} ×2 樹幹散布	1	4 ^a	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				45	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	9,000 ^{EC} ×2 主枝散布 4 g/樹 ^{EC} ×2 樹幹散布	1	4 ^a	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
45				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
小粒種ぶどう (果実) 昭和48年度	4,170 ^{EC} 散布	1	1	113	/	/	<0.002	<0.002
	6,250 ^{EC} 散布		2	113	/	/	<0.002	<0.002
	5,000 ^{EC} 散布	1	1	149	/	/	<0.002	<0.002
			2	137	/	/	<0.002	<0.002
小粒種ぶどう (施設・無袋) (果実) 平成5年度	1,500 ^{EC} 休眠期2回 生育期2回 散布	2	4	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			4	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
小粒種ぶどう (施設・無袋) (果実) 平成 16 年度	2 g/樹 ^{EC} 樹幹塗布	1	2	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
小粒種ぶどう (施設・無袋) (果実) 平成 18 年度	十分量 ^{EC} 樹幹塗布	1	2	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
小粒種ぶどう (施設・無袋) (果実) 平成 18 年度	9,000 ^{EC} ×2 主枝散布 2 g/樹 ^{EC} ×2 主幹部噴射	1	4	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	15,000 ^{EC} ×2 主枝散布 0.7 g/樹 ^{EC} ×2 主幹部噴射	1	4	45	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
かき (露地) (可食部) 昭和 47 年度	1,000 ^{EC} 散布	1	3	31	0.010	0.010		
				41	0.007	0.006		
かき (露地・無袋) (果実) 平成元年度	2,000 ^{WP} 散布	2	3	30	0.054	0.053	0.13	0.12
				45	0.010	0.009	0.03	0.03
かき (露地・無袋) (果実) 平成 11 年度	1,500 ^{EC} 散布	6	3	41	0.05	0.05		
				42	0.03	0.03		
				42	0.06	0.06		
				42	0.01	0.01		
				43	0.04	0.04		
				42	<0.01	<0.01		
かき (露地・無袋) (果実) 平成 19 年度	2,500 ^{EC} 散布	2	3	42	0.03	0.02	0.01	0.01
				56	0.01	0.01	<0.01	<0.01
いちじく (果実) 昭和 53 年度	8~10 g/樹 ^{EC} 樹幹塗布	1	1	30			<0.004	<0.004

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					フェニトロチオン				
					公的分析機関		社内分析機関		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
いちじく (果実) 昭和 53 年度	4.5 g/樹 ^{EC}	1	1	7	-	0.015	/	/	
				14	0.004	0.004			
				21	<0.002	<0.002			
			3	7	0.007	0.006			
				14	0.003	0.003			
				21	<0.002	<0.002			
		5 ^a	7	0.019	0.018				
			14	0.005	0.004				
			21	<0.002	<0.002				
			1	1	7	0.105	0.100		
					14	0.014	0.014		
					21	0.011	0.010		
3	7	0.046		0.022					
	14	0.037		0.034					
	21	0.012		0.011					
5 ^a	7	0.002	0.002						
	14	0.041	0.040						
	いちじく (果実) 昭和 53 年度	7 g/樹 ^{EC} 樹幹塗布	2	1	7	0.008	0.008	<0.004	<0.004
					14	0.012	0.012	<0.004	<0.004
					21	0.003	0.003	-	-
					144	0.009	0.008	<0.004	<0.004
151					0.003	0.003	-	-	
159					0.004	0.004	-	-	
1			1	7	0.013	0.013	<0.004	<0.004	
				14	0.012	0.012	<0.004	<0.004	
				21	0.007	0.006	-	-	
				144	0.005	0.005	<0.004	<0.004	
				151	0.008	0.008	-	-	
				159	0.005	0.004	-	-	
いちじく (露地・無袋) (果実) 昭和 56 年度	0.8 g/樹 ^{EC}	1	1	7	0.180	0.178	0.182	0.166	
				15	0.148	0.138	0.085	0.082	
				21	0.015	0.014	0.012	0.012	
			3	7	0.024	0.024	0.022	0.022	
				15	0.128	0.116	0.121	0.108	
				21	<0.004	<0.004	0.004	0.004	
いちじく (露地・無袋) (果実) 昭和 57 年度	4.8 g/樹 ^{EC}	1	1	7	0.171	0.149	0.034	0.031	
				14	0.075	0.068	0.015	0.015	
				21	0.004	0.004	0.005	0.005	
			3	7	0.037	0.034	0.015	0.015	
				14	0.015	0.014	0.017	0.016	
				21	0.010	0.010	0.009	0.009	

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
いちじく (施設) (果実) 平成7年度	6,000 ^{EC} 樹幹塗布	2	3	7	<0.02	<0.02	0.04	0.04
				14	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01
				21	<0.02	<0.02	0.02	0.02
			3	7	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01
				14	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01
				21	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01
ぎんなん (露地) (種実) 平成15年度	5 g/樹 ^{EC} 樹幹散布	2	3	60	<0.01	<0.01	/	/
				74	<0.01	<0.01	/	/
				88	<0.01	<0.01	/	/
			3	60	<0.01	<0.01	/	/
				74	<0.01	<0.01	/	/
				88	<0.01	<0.01	/	/
くり (露地) (可食部) 昭和47年度	1% ^{EC} 樹幹塗布	1	1	139	<0.002	<0.002	<0.004	<0.004
				153	-	-	<0.004	<0.004
くり (露地) (果実) 昭和49年度	1,800 ^{MG} 散布	1	2	14	0.002	0.002	<0.001	<0.001
			4	14	0.006	0.006	0.001	0.001
		1	2	12 ^a	0.002	0.002	<0.001	<0.001
			4	12 ^a	<0.002	<0.002	0.001	0.001
茶 (露地) (製茶) 昭和63年度	35,000 ^{EC} 土壌処理	1	1	92	/	/	<0.005	<0.005
	44,500 ^{EC} 土壌処理	1	1	195	/	/	<0.005	<0.005
茶 (露地) (浸出液) 昭和63年度	35,000 ^{EC} 土壌処理	1	1	92	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	44,500 ^{EC} 土壌処理	1	1	195	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
茶 (露地) (あら茶) 平成9年度	1,430 ^{EC} 散布	2	1	21	0.01	0.01	0.02	0.02
			30	0.01	0.01	0.02	0.02	
1	21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
	30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
茶 (露地) (あら茶) 平成19年度	17,500 ^{EC} 土壌処理	2	1	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			1	90	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
いね科牧草 (露地) (葉及び茎) 昭和51年度	750 ^{EC} 散布	1	5 ^a	14	0.128	0.127	0.038	0.025

作物名 (栽培形態) (分析部位) 実施年度	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					フェニトロチオン			
					公的分析機関		社内分析機関	
					最高値	平均値	最高値	平均値
まめ科牧草 (露地) (葉及び茎) 昭和 51 年度	750 ^{EC} 散布	1	5 ^a	14	1.32	1.33	1.06	1.03
飼料用 とうもろこし (露地) (茎葉) 平成 16 年度	500 ^{EC} 散布	2	2	28 ^a	0.33	0.32	0.15	0.15
				42	0.02	0.02	<0.02	<0.02
				56	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
				84	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
			2	28 ^a	0.17	0.17	0.15	0.14
				42	<0.02	<0.02	0.06	0.06
				56	0.02	0.02	0.03	0.03
				84	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

注) ・試験には EC:乳剤、L:液剤、MC:マイクロカプセル剤、MG:微粒剤、WP:水和剤
が用いられた。

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

・農薬の使用回数及び使用時期 (PHI) が、登録又は申請された使用方法から逸脱している
場合は、回数又は PHI に^aを付した。

<別紙4：推定摂取量>

食品名	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重：55.1 kg)		小児(1~6歳) (体重：16.5 kg)		妊婦 (体重：58.5 kg)		高齢者(65歳以上) (体重：56.1 kg)	
		ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)
米(玄米をいう。)	0.04	164	6.57	85.7	3.43	105	4.21	180	7.21
小麦	0.25	59.8	15.0	44.3	11.1	69.0	17.3	49.9	12.5
大麦	4.25	5.3	22.5	4.4	18.7	8.8	37.4	4.4	18.7
ライ麦	4.25	0.1	0.43	0.1	0.43	0.5	2.13	0.1	0.43
とうもろこし	0.0245	4.7	0.12	5.4	0.13	6.0	0.15	4.3	0.11
そば	4.25	1.1	4.68	0.5	2.13	1.8	7.65	1.1	4.68
その他の穀類	4.25	0.2	0.85	0.1	0.43	0.1	0.43	0.3	1.28
大豆	0.01	39.0	0.39	20.4	0.20	31.3	0.31	46.1	0.46
小豆類	0.065	2.4	0.16	0.8	0.05	0.8	0.05	3.9	0.25
えんどう	0.035	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
そら豆	0.02	0.7	0.01	0.2	0	0.8	0.02	0.8	0.02
らっかせい	0.01	1.3	0.01	0.6	0.01	0.6	0.01	1.4	0.01
その他の豆類	0.065	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01
ばれいしょ	0.01	38.4	0.38	34.0	0.34	41.9	0.42	35.1	0.35
かんしょ	0.01	6.8	0.07	6.3	0.06	12.2	0.12	9.8	0.10
こんにやくいも	0.005	1.2	0.01	0.4	0	0.8	0	1.3	0.01
てんさい	0.02	32.5	0.65	27.7	0.55	41.1	0.82	33.2	0.66
さとうきび	0.015	98.2	1.47	83.6	1.25	124	1.86	100	1.50
西洋わさび	0.05	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01
ごぼう	0.007	3.9	0.03	1.6	0.01	3.9	0.03	4.6	0.03
その他のきく科野菜	0.05	1.5	0.08	0.1	0.01	0.6	0.03	2.6	0.13
たまねぎ	0.01	31.2	0.31	22.6	0.23	35.3	0.35	27.8	0.28
ねぎ(リーキを含む。)	0.039	9.4	0.37	3.7	0.14	6.8	0.27	10.7	0.42
にら	0.84	2.0	1.68	0.9	0.76	1.8	1.51	2.1	1.76
その他のゆり科野菜	0.02	0.6	0.01	0.1	0	0.2	0	1.2	0.02
その他のせり科野菜	0.05	0.2	0.01	0.1	0.01	0.3	0.02	0.3	0.02
トマト	0.245	32.1	7.86	19.0	4.66	32.0	7.84	36.6	8.97
なす	0.081	12.0	0.97	2.1	0.17	10.0	0.81	17.1	1.39

食品名	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重：55.1 kg)		小児(1~6歳) (体重：16.5 kg)		妊婦 (体重：58.5 kg)		高齢者(65歳以上) (体重：56.1 kg)	
		ff (g/人日)	摂取量 (μg/人日)	ff (g/人日)	摂取量 (μg/人日)	ff (g/人日)	摂取量 (μg/人日)	ff (g/人日)	摂取量 (μg/人日)
きゅうり(ガーキンを含む。)	0.045	20.7	0.93	9.6	0.43	14.2	0.64	25.6	1.15
かぼちゃ(スカッシュを含む。)	0.021	9.3	0.20	3.7	0.08	7.9	0.17	13.0	0.27
しろうり	0.015	0.5	0.01	0.1	0	0.1	0	0.9	0.01
すいか	0.002	7.6	0.02	5.5	0.01	14.4	0.03	11.3	0.02
メロン類果実	0.005	3.5	0.02	2.7	0.01	4.4	0.02	4.2	0.02
ほうれんそう	0.015	12.8	0.19	5.9	0.09	14.2	0.21	17.4	0.26
しょうが	0.05	1.5	0.08	0.3	0.02	1.1	0.06	1.7	0.09
未成熟えんどう	0.045	1.6	0.07	0.5	0.02	0.2	0.01	2.4	0.11
未成熟いんげん	0.01	2.4	0.02	1.1	0.01	0.1	0	3.2	0.03
えだまめ	0.15	1.7	0.26	1.0	0.15	0.6	0.09	2.7	0.41
しいたけ	0.005	6.0	0	3.0	0.02	3.2	0.02	7.4	0.04
その他の野菜	0.15	13.4	2.01	6.3	0.95	10.1	1.52	14.1	2.12
みかん	0.01	17.8	0.18	16.4	0.16	0.6	0.01	26.2	0.26
なつみかんの果実全体	0.009	1.3	0.01	0.7	0.01	4.8	0.04	2.1	0.02
レモン	0.031	0.5	0.02	0.1	0	0.2	0.01	0.6	0.02
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)	0.031	7.0	0.22	14.6	0.45	12.5	0.39	4.2	0.13
グレープフルーツ	0.031	4.2	0.13	2.3	0.07	8.9	0.28	3.5	0.11
ライム	0.031	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
その他のかんきつ類果実	0.031	5.9	0.18	2.7	0.08	2.5	0.08	9.5	0.3
りんご	0.04	24.2	0.97	30.9	1.24	18.8	0.75	32.4	1.30
日本なし	0.075	6.4	0.48	3.4	0.26	9.1	0.68	7.8	0.59
西洋なし	0.075	0.6	0.05	0.2	0.02	0.1	0.01	0.5	0.04
もも	0.064	3.4	0.22	3.7	0.24	5.3	0.34	4.4	0.28
ネクタリン	0.01	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0

食品名	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重：55.1 kg)		小児(1~6歳) (体重：16.5 kg)		妊婦 (体重：58.5 kg)		高齢者(65歳以上) (体重：56.1 kg)	
		ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)
あんず(アプリコットを含む。)	0.01	0.2	0	0.1	0	0.1	0	0.4	0
すもも(プルーンを含む。)	0.005	1.1	0.01	0.7	0	0.6	0	1.1	0.01
うめ	0.038	1.4	0.05	0.3	0.01	0.6	0.02	1.8	0.07
おうとう(チェリーを含む。)	0.05	0.4	0.02	0.7	0.04	0.1	0.01	0.3	0.02
いちご	1.117	5.4	6.03	7.8	8.71	5.2	5.81	5.9	6.6
ぶどう	0.042	8.7	0.37	8.2	0.34	20.2	0.85	9.0	0.38
かき	0.148	9.9	1.47	1.7	0.25	3.9	0.58	18.2	2.69
その他の果実	0.05	1.2	0.06	0.4	0.02	0.9	0.05	1.7	0.09
ごまの種子	0.05	0.9	0.05	0.9	0.05	0.9	0.05	0.8	0.04
その他のオイルシード	0.05	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01
ぎんなん	0.01	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
くり	0.004	0.6	0	0.3	0	0.1	0	0.7	0
くるみ	0.01	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.2	0
茶	0.015	6.6	0.10	1.0	0.02	3.7	0.06	9.4	0.14
その他のスパイス	11.927	0.1	1.19	0.1	1.19	0.1	1.19	0.2	2.39
その他のハーブ	0.05	0.9	0.05	0.3	0.02	0.1	0.01	1.4	0.07
鶏・筋肉と脂肪	0.15	18.7	2.81	13.6	2.04	19.8	2.97	13.9	2.09
その他家きん・筋肉と脂肪と肝臓と腎臓と食用部分	0.15	0.1	0.02	0	0	0	0	0.1	0.02
魚介類	0.067	93.1	6.24	39.6	2.65	53.2	3.56	115	7.7
合計			89.4		64.5		104		91.2

- ・『てんさい』及び『にら』の残留値は登録又は申請されている使用時期・使用回数による各試験区でフェニトロチオンの平均残留値のうち最大のものをを用いた(別紙3参照)。その他の食品の残留値は各ほ場の最大平均残留値を平均した値を用いて算出した厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬動物用医薬品部会長報告について(参照111)を参照した。
- ・「ff」：平成17~19年の食品摂取頻度・摂取量調査(参照112)の結果に基づく食品摂取量(g/人/日)
- ・「摂取量」：残留値及び農産物残留量から求めたフェニトロチオンの推定摂取量(μg/人/日)

<参照>

1. 諮問書（平成 15 年 7 月 1 日付け厚生労働省発食安第 0701015 号）
2. 7 月 1 日に厚生労働省より意見の聴取要請のあった、清涼飲料水の規格基準の改正について：第 1 回食品安全委員会農薬専門調査会資料 6 及び参考資料 1～6
3. 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付け平成 17 年厚生労働省告示第 499 号）
4. フェニトロチオンの魚介類における最大推定残留値に係る資料
5. 農薬抄録 MEP（殺虫剤）（平成 21 年 7 月 17 日改訂）：住友化学株式会社、一部公表
6. Studies on the mode of action of organophosphorus compounds. PartI. Metabolic fate of ^{32}P labeled Sumithion and Methyl Parathion in guinea pig and white rat. : 住友化学工業株式会社、1963 年、公表、*Agr. Biol. Chem.*, **27**, 381-389 (1963).
7. Comparative metabolism of *m*-methyl- ^{14}C -Sumithion in several species of mammals *in vivo*. : 住友化学工業、1976 年、公表、*J.Pesticide Sci.*, **1**, 9-21 (1976)
8. Metabolism of Fenitrothion in rats. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1990 年、未公表
9. Studies on the mode of action of organophosphorus compounds. PartIII. Activation and degradation of Sumithion and Methyl Parathion in Mammals *in vivo*. : 住友化学工業株式会社、1964 年、公表、*Agr. Biol. Chem.*, **28**, 411-421 (1964).
10. The selectivity of Sumithion compared with Methyl Parathion. Metabolism in the white mouse. : Department of Antomology, University of California、1967 年、公表、*J. Agr. food Chem.*, **15**, 242-249 (1967).
11. Metabolism of [^{14}C]Fenitrothion in rice. (GLP 対応) : Ricera Biosciences 社、2004 年、未公表
12. (^{14}C)-Fenitrothion : Metabolism in Tomato. (GLP 対応) : Covance Laboratories Ltd. 社、2002 年、未公表
13. A Metabolism study with [phenyl- ^{14}C] Fenitrothion on grapes. (GLP 対応) : PTRL-West, Inc.社、2002 年、未公表
14. Aerobic Aquatic Soil Metabolism of [^{14}C]Fenitrothion (GLP 対応) : Ricera Biosciences, LLC 社、2003 年、未公表
15. (^{14}C)-Fenitrothion : Soil metabolism and degradation (GLP 対応) : Covance Laboratories Ltd. 社、2001 年、未公表
16. Soil adsorption/desorption of [^{14}C]Fenitrothion by the batch equilibrium method (GLP 対応) : PTRL-West, Inc.社、2002 年、未公表
17. Hydrolysis of Fenitrothion in water as a function of pH at 25 °C (GLP 対応) :

- 住友化学工業株式会社、1988年、未公表
18. Photodegradation of Fenitrothion in water and on soil surface, and its hydrolysis in water フェニトロチオンの加水分解：住友化学工業株式会社、1985年、公表、*J. Pesticide Sci.*, **10**, 263-272 (1985).
 19. フェニトロチオンの水中光分解 (GLP 対応)：住友化学工業株式会社、1988年、未公表
 20. 土壌残留試験成績：住友化学工業株式会社、未公表
 21. 作物残留試験成績：住友化学工業株式会社、未公表
 22. 動植物組織中における残留殺虫剤の定量 4.生ミルク中のスミチオン及びその2,3の代謝産物の残留量測定：住友化学工業株式会社、1967年、公表、防虫科学 **32**, 95-100 (1967)
 23. Sumithion の薬理作用について：Sumioxon との比較：和歌山県立医科大学、1972年、未公表
 24. Toxicological study with Sumithion.：住友化学工業株式会社、1972年、未公表
 25. スミチオン原体のラットにおける急性経口毒性試験：日本大学、株式会社アニマルリサーチ、1983年、未公表
 26. Acute oral toxicity of Sumithion in rats.：住友化学工業株式会社、1986年、未公表
 27. スミチオンのラットに対する急性毒性試験：住友化学工業株式会社、1977年、未公表
 28. スミチオンのマウスに対する急性毒性試験：住友化学工業株式会社、1977年、未公表
 29. イヌにおけるスミチオン[®]の急性毒性試験：住友化学工業株式会社、1971年、未公表
 30. スミチオン原体のラットにおける急性経皮毒性試験：日本大学、株式会社アニマルリサーチ、1983年、未公表
 31. Acute inhalation toxicity study of Sumithion in rats.：住友化学工業株式会社、1979年、未公表
 32. Acute inhalation toxicity of Sumithion in rats.：住友化学工業株式会社、1986年、未公表
 33. Studies on the mode of action of organophosphorus compounds. PartII. Inhibition of mammalian cholinesterase *in vivo* following the administration of Sumithion and Methylparathion.：住友化学工業株式会社、1963年、公表 *Agr. Biol. Chem.*, **27**, 669-676 (1963).
 34. *p*-ニトロメタクレゾールのマウスならびにラットに対する急性毒性試験：住友化学工業株式会社、1974年、未公表
 35. An acute study of the potential effects of orally administered Fenitrothion on

- behavior and Neuromorphology in rats. (GLP 対応) : Bio-research Laboratories Ltd、1992 年、未公表
36. サリチオン、サイアノックス、シュアサイド、スミチオンおよびスミオキシソンのニワトリにおける急性経口毒性ならびに遅延性神経毒性:住友化学工業株式会社、1975 年、未公表
 37. Delayed neurotoxicity study with Sumithion in hens.スミチオン:住友化学工業株式会社、1977 年、未公表
 38. Primary eye and skin irritation test of Sumithion® technical in rabbits. : 住友化学工業株式会社、1981 年、未公表
 39. スミチオンの毒性; 兎の眼および皮膚に対する刺激作用:住友化学工業株式会社、1972 年、未公表
 40. Sumithion の毒性;モルモットによる皮膚アレルギー試験:住友化学工業株式会社、1972 年、未公表
 41. Possible allergic asthma by inhalation of sumithion 22% emulsifiable concentrate in guinea pigs. : 住友化学工業株式会社、1977 年、未公表
 42. Subchronic toxicity study of Sumithion, Sumioxon and *p*-nitro-cresol in rats and 92 week feeding study of Sumithion with special reference to change of cholinesterase activity. : 住友化学工業株式会社、1975 年、未公表
 43. スミチオンの家兎に対する 6 か月摂食実験について:住友化学工業株式会社、1974 年、未公表
 44. Subacute inhalation toxicity of Sumithion in rats and mice. : 住友化学工業株式会社、奈良県立医科大学、1979 年、未公表
 45. A 3-month dietary study of the potential effects of the Fenitrothion in behavior, neurochemistry and neuromorphology in rat. (GLP 対応) : Bio-research Laboratories Ltd、1993 年、未公表
 46. Two-year chronic oral toxicity study with Sumithion technical grade in beagle dogs. : Industrial Bio-Test 研究所 (米国)、1973 年、未公表
 47. One year dietary toxicity study in dogs. : International Research & Development 社 (米国)、1984 年、未公表
 48. ビーグル犬による有機燐慢性中毒:東京歯科大学、1972 年、公表、日本眼科学会雑誌 76 1143-1150 (1972)
 49. Two-year dietary administration in the rat. : Hazleton 研究所 (米国)、1974 年、未公表
 50. スミチオン原体のマウスを用いた発癌性並びに慢性毒性試験 (GLP 対応) : 株式会社大雄会医科学研究所、1990 年、未公表
 51. 78-Week Tumorigenic study in the ICR Swiss mouse Sumithion. : Hazleton 研究所 (米国)、1975 年、未公表

52. Reproductive effects of Sumithion administrated orally in feed to Crl:CD®(SD)BR rats for two generations. (GLP 対応) : Argus Research Laboratories, Inc.、1990 年、未公表
53. スミチオンのラットを用いた一世代繁殖毒性試験:株式会社大雄会医科学研究所、2004 年、未公表
54. Three-generation reproduction study - rats Sumithion. : Hazleton Laboratories America, Inc.、1980 年、未公表
55. スミチオンの催奇形性に関する研究; マウス、ラットの胎仔および新生仔におよぼす影響: 住友化学工業株式会社、1974 年、未公表
56. Teratology study in rats with Sumithion. (GLP 対応) : Hazleton Laboratories America, Inc.、1987 年、未公表
57. Teratology study in rabbits Fenitrothion T.G. (Sumithion). (GLP 対応) : Hazleton Laboratories America, Inc.、1986 年、未公表
58. スミチオンの遺伝子におよぼす影響について—バクテリアを用いた検討: 住友化学工業株式会社、1975 年、未公表
59. スミチオンの細菌を用いた変異原性試験報告: 残留農薬研究所、1979 年、未公表
60. Mutagenicity tests of Sumithion with nitro reductase-defective bacteria. : 住友化学工業株式会社、1983 年、未公表
61. *In vivo* unscheduled DNA synthesis (UDS) assay of Sumithion in rat hepatocytes. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1988 年、未公表
62. *In vitro* gene mutation test of Sumithion in V79 chinese hamster cells in culture. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1987 年、未公表
63. *In vitro* chromosomal aberration test of Sumithion in chinese hamster ovary cells (CHO-K1) in culture. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1988 年、未公表
64. *In vivo/in vitro* unscheduled DNA synthesis (UDS) assay of Sumithion in rat hepatocytes. (GLP 対応) : 住友化学工業株式会社、1990 年、未公表
65. Effects of fenitrothion on sister chromatid exchange (SCE) incultured mouse cells. : 住友化学工業株式会社、1980 年、未公表
66. ラット骨髓細胞を用いた Sumithion®の *in vivo* 染色体異常試験: 住友化学工業株式会社、1982 年、未公表
67. Fenitrothion の *in vivo* におけるマウス骨髓細胞に対する染色体異常誘発性試験: 住友化学工業株式会社、1980 年、未公表
68. マウス骨髓細胞を用いた Sumithion®の *in vivo* 染色体異常試験: 住友化学工業株式会社、1982 年、未公表
69. マウスの骨髓細胞を用いた Sumithion®の小核試験: 住友化学工業株式会社、1982 年、未公表

70. スミチオンのマウスおよびラットにおける優性致死試験:住友化学工業株式会社、1975年、未公表
71. Acute ocular toxicity study in rats. (GLP 対応) :財団法人残留農薬研究所、1989年、未公表
72. 13-Week subchronic ocular toxicity study in rats. (GLP 対応) :財団法人残留農薬研究所、1989年、未公表
73. Fenitrothion ingestion in humans : Subacute effects : Monash Medical School, Monash University、1999年、未公表
74. 食品健康影響評価について (平成 22 年 9 月 24 日付け厚生労働省発食安 0924 第 5 号)
75. JMPR① : “FENITROTHION” , Pesticide residues in food-2000 Evaluations, Part II. Toxicological. no. 975 on INCHEM.
76. EFSA : Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenitrothion. EFSA Scientific Report (2006) 59, p.1-80.
77. APVMA① : The NRA Review of FENITROTHION, Interim Report, volume 1 (1999)
78. 食品健康影響評価について (平成 24 年 2 月 22 日付け厚生労働省食安 0222 第 1 号)
79. JMPR② : ”FENITROTHION”, Pesticide residues in food -2003 Evaluations, Part I Residues. p.495-549.
80. JMPR③ : ”FENITROTHION”, Pesticide residues in food -2004 Evaluations, Part I Residues. p.141-181.
81. 平成 3 年度飼料安全性確認調査委託事業、I 農薬等の乳汁への残留性 : 社団法人日本科学飼料協会、1992 年
82. 食品健康影響評価について (平成 24 年 3 月 22 日付け 23 消安 6357 号)
83. 食品健康影響評価について (平成 25 年 4 月 9 日付け厚生労働省発食安 0409 第 1 号)
84. フェニトロチオンの食品健康影響評価に係る追加資料の提出について : 住友化学株式会社、2013 年、未公表
85. 農薬抄録 MEP (殺虫剤) (平成 23 年 9 月 6 日改訂) : 住友化学株式会社、一部公表
86. 平成 23 年度ポジティブリスト制度による暫定基準見直し成分に係る資料 (フェニトロチオン) : 住友ライフテック株式会社、2011 年、未公表
87. JMPR④ : ”FENITROTHION”, Pesticide residues in food-2007. Report of The FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and The WHO Expert Group on Pesticide Residues. p.161-167 (2007)
88. APVMA② : NRA Review of Fenitrothion-Residues Assessment (1999)

89. APVMA ③ : NRA Review of Fenitrothion-Evaluation of the Mammalian Toxicology and Metabolism/Toxicokinetics (1999)
90. 農林水産省動物医薬品検査所ホームページ. 動物用医薬品等データベース
91. 牛におけるフェニトロチオン製剤を噴霧投与後の残留確認試験報告書 : 動物医薬品検査所、2011年、未公表
92. 豚におけるフェニトロチオン製剤を噴霧投与後の残留確認試験報告書 : 動物医薬品検査所、2011年、未公表
93. 鶏におけるフェニトロチオン製剤を噴霧投与後の残留確認試験報告書 : 動物医薬品検査所、2011年、未公表
94. 食品健康影響評価の通知について (平成26年6月3日付け府食第425号)
95. 食品健康影響評価の通知について (平成26年6月3日付け府食第426号)
96. 食品健康影響評価について (平成29年1月24日付け厚生労働省発生食0124第25号)
97. 農薬抄録 MEP (殺虫剤) (平成27年4月6日改訂) : 住友化学株式会社、一部公表
98. MEPの作物残留試験成績 : 住友化学株式会社、未公表
99. US EPA ① : MEMORANDUM : Fenitrothion Human Health Assessment Scoping Document in Support of Registration Review. p.1-10 (2009)
100. 食品健康影響評価の結果の通知について (平成29年8月22日付け府食第556号)
101. 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) の一部を改正する件 (令和元年6月27日付け令和元年厚生労働省告示第45号)
102. 食品健康影響評価について (令和5年5月24日付け厚生労働省発生食0524第6号)
103. 農薬抄録 MEP (殺虫剤) (令和4年5月30日改訂) : 住友化学株式会社、一部公表
104. MEP (スミチオン) 乳剤 てんさい 作物残留試験 (GLP対応) : 住化テクノサービス株式会社、2016年、未公表
105. MEP (スミチオン) 乳剤 いら 作物残留試験 (GLP対応) : 住化テクノサービス株式会社、2016年、未公表
106. Metabolism of Fenitrothion in the Goats : 住友化学株式会社、1977年、未公表
107. Metabolism of Fenitrothion in Birds : 住友化学株式会社、1977年、未公表
108. Sumithion Meat and Milk Residue Study in Lactating Dairy Cattle (GLP対応) : Stauffer Chemical Company. (米国)、1980年、未公表
109. Sumithion Poultry Residue Studies (GLP対応) : Stauffer Chemical Company. (米国)、1980年、未公表
110. US EPA ② : MEMORANDUM : Risk Assessment to Support Final Registration Review Decision. p.1-18 (2010)

- 111.薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会報告について（薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料、2018年11月5日）
- 112.平成17～19年度食品摂取頻度・摂取量調査（薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料、2014年2月20日）
- 113.食品健康影響評価に係る提出資料について、住友化学株式会社、2023年、未公表